DEBACQ LIBRARY

15357/A

42314

L XLVIII

L'ART

DE DOSER LES MÉDICAMENS,

TANT ANCIENS QUE NOUVEAUX,

SELON LES DIFFÉRENS AGES.

IMPRIMERIE DE COSSON,
Rue Saint-Germain-des-Prés, n° 9.

42314

L'ART
DE DOSER LES MÉDICAMENS,
TANT ANCIENS QUE NOUVEAUX,
SELON LES DIFFÉRENS AGES,
OU
DICTIONNAIRE COMPLET
DE POSOLOGIE MÉDICALE
EN TABLEAUX SYNOPTIQUES;

PAR MM. BRICHETEAU,

Docteur en Médecine de la Faculté de Paris, Membre adjoint de l'Académie royale de Médecine, de la Société médicale d'Émulation, Médecin du quatrième dispensaire, etc., etc.;

A. CHEVALLIER,

Pharmacien-chimiste, Membre adjoint de l'Académie royale de Médecine, Correspondant de la Société médico-botanique de Londres, etc., etc.;

P.-L. COTTEREAU,

Docteur en médecine et agrégé à la Faculté de Médecine de Paris, Professeur particulier de matière médicale, de thérapeutique et de pharmacologie, Médecin du bureau de charité du cinquième arrondissement, etc., etc.

Un remède excellent par lui-même peut totalement manquer son effet, si on n'en proportionne pas la dose à l'effet qu'on veut produire. PINEL.

PARIS.

BÉCHET JEUNE, LIBRAIRE,

PLACE DE L'ÉCOLE DE MÉDECINE, N° 4.

1829.

WELLCOME
HISTORICAL
MEDICAL
LIBRARY

INTRODUCTION.

On entend par *dose* (1), en médecine pratique, la quantité déterminée, par poids ou mesure, d'un médicament administré en prise, ou bien la quantité proportionnelle de chacune des drogues simples qui entrent dans une prescription composée. La dose, quoique déterminée d'après l'expérience, est souvent très-différente de la quantité de médicament nécessaire à la guérison d'une maladie, parce que le plus communément cette maladie ne cède pas à une seule prescription médicale. On comprend facilement que les anciens, qui n'avaient presque aucune notion de chimie, et auxquels l'analyse était inconnue, durent éprouver de grandes difficultés dans la détermination des doses, n'administrant presque toujours que des médicamens composés, au milieu desquels les principes actifs étaient cachés sous un petit volume. Il était donc réservé aux modernes de créer en quelque sorte et de perfectionner, à l'aide de la chimie et de la pharmacologie, l'art de doser les médicamens, qui est véritablement, si l'on peut ainsi parler, le lévier de la thérapeutique.

Il semble au premier abord que rien ne soit plus facile que de composer une posologie médicale (2)

(1) Dose, en latin *dosis*, dérive du verbe grec διδωμι, *je donne*.
(2) Dérivé du mot ποσον, *quantité*.

ou détermination générale des doses ; qu'il doit suffire, pour atteindre ce but, de compiler quelques ouvrages de matière médicale et de médecine pratique, quelques recueils de formules et de pharmacologie. Toutefois, si l'on fait attention, que les doses de beaucoup de médicamens sont fort incertaines, que dans les ouvrages les plus renommés sur la matière médicale et la thérapeutique, tantôt ces doses ne sont même pas indiquées pour un assez grand nombre de substances médicamenteuses, que d'autres fois elles présentent des différences extrêmes, on pourra en conclure qu'une pareille tâche n'est pas sans difficulté. D'un autre côté, on jugera aussi que cette tâche n'est pas sans importance en remarquant que l'incertitude et la nullité des doses portent principalement sur les drogues les plus actives et les plus dangereuses.

Les auteurs ont dû chercher la détermination des doses les plus incertaines, dans la lecture et la comparaison des ouvrages les plus estimés sur la médecine pratique, et les vastes et nombreux recueils publiés de nos jours ; ils ont aussi consulté leur expérience et leurs souvenirs. Ils pensent qu'à cet égard, la réunion de deux médecins (1) et d'un pharmacien-chimiste, qui a procédé lui-même à l'examen et à l'analyse de plusieurs médicamens, et à la confection d'une multitude de formules, présente des conditions favorables pour la composition d'un travail tel que celui qu'ils offrent au public.

Pour la fixation des doses et leur décroissement suivant les âges, ils ont, à quelques modifications

(1) Dont l'un (M. Cottereau) a exercé la pharmacie et professe la pharmacologie.

près, adopté les divisions proposées par *Gaubius* (1). On conçoit bien qu'il n'y a rien d'absolu dans cette indication. Ce que les auteurs ont eu principalement en vue, c'est de désigner des quantités qu'on peut en général administrer de prime abord, sans courir le risque de nuire ; c'est au praticien qu'il appartient de les augmenter dans une proportion dont il est le seul juge.

Bien qu'il existe des individus extrêmement sensibles aux plus petites quantités de médicamens, il n'en est pas moins vrai que, dans la majorité des cas, l'élévation graduelle des doses est, dans la pratique de la médecine, un élément de succès, et que certains praticiens, heureux dans la cure des maladies chroniques, n'ont pas eu d'autre secret. L'un des auteurs (M. Bricheteau) a administré avec succès la térébenthine jusqu'à la dose d'une once et demie dans les catarrhes de la vessie ; la teinture d'iode jusqu'à un gros chez un enfant scrophuleux. Il a vu le kermès porté avec avantage jusqu'à la dose de 45 grains dans les catarrhes pulmonaires, et l'opium jusqu'à 100 grains chez un épileptique. *Pinel* dit avoir donné des soins à une femme atteinte de cancer de la matrice, chez laquelle il fut obligé d'élever ce narcotique graduellement jusqu'à la dose de 120 grains pour apaiser les douleurs atroces que cette infortunée éprouvait. D'un autre côté, il y a des médicamens pris dans la classe des poisons qui jouissent d'une si affreuse activité qu'on ne doit en faire usage que dans un état

(1) On les a placées à la tête de chaque tableau, afin de rendre s'il se peut l'erreur impossible.

de division extrême et avec la plus minutieuse circonspection : ainsi, sans parler du 800e de phosphore qu'on a proposé de faire entrer dans une potion, l'un des auteurs (M. Bricheteau) a vu un 23e de grain d'oxide d'arsenic administré sous forme de solution (1) étendue de quatre onces de liquide, causer des coliques et une vive irritation abdominale chez plusieurs malades. M. *Cottereau* a vu à l'hôpital de Tours un empoisonnement mortel produit par un 16e de grain d'émétique.

Aucun médecin n'ignore, du reste, qu'il faut proportionner la dose des médicamens à la sensibilité, aux idiosyncrasies et même aux tempéramens des malades. *Pinel*, à l'article Dose du Dictionnaire des Sciences Médicales, cite une dame d'un tempérament bilieux très-irritable, chez laquelle la moindre quantité d'émétique produisait des vomissemens pendant plusieurs jours, et une autre d'une constitution lymphatique pituiteuse, qui n'était sensible qu'à une forte dose du même médicament. Il parle aussi d'un autre individu qu'une prise ordinaire de poudre d'Ailhaud faillit faire périr. La considération des climats, des saisons même, doit aussi quelquefois influer sur la détermination des doses des médicamens.

L'ordre alphabétique et la forme de tableaux qui a été adoptée dans cet ouvrage ont des avantages incontestables dont il est superflu de faire l'éloge. Un seul auteur jusqu'à ce jour avait suivi une méthode analogue; mais son ouvrage, publié à Vienne (2) en 1761 avec une préface du célèbre *Gaubius*, comprend

(1) Celle de Pearson.

(2) Pauli Andreæ Parenti *De dosibus medicamentorum liber singularis, in ordinem alphabeticum digestus.* Viennæ, 1761.

beaucoup moins d'objets que celui-ci. Il se borne à trois colonnes, dans lesquelles sont indiquées et répétées à chaque ligne les diverses doses pour les enfans, les jeunes gens et les adultes. Les doses y sont déterminées d'après divers auteurs nommés dons l'ouvrage, ou fixées par la pratique. *Parenti* divise les médicamens en simples et composés, division inutile dans un ouvrage par ordre alphabétique. D'autres auteurs comme *Cadet de Gassicourt* (1), *Authenac* (2), les auteurs du Conspectus des pharmacopées (3), ont indiqué les doses des médicamens, mais leurs ouvrages n'ont qu'un rapport très-éloigné avec celui que nous publions.

On a cru qu'il était utile de mettre en regard les synonymies des poids anciens et nouveaux; les uns serviront de guide à ceux qui n'ont pas voulu s'initier dans la nouvelle nomenclature des poids et mesures, et les autres pourront engager les jeunes médecins à se familiariser avec le système métrique, trop négligé peut-être par les hommes de l'art.

Relativement à l'indication des propriétés des médicamens; comme cet ouvrage est exclusivement pratique, on a préféré les multiplier et commettre, aux yeux de quelques médecins, des inexactitudes de langage, que de laisser quelque chose à désirer à ce sujet. Du reste, on ne le sait que trop, l'action des médicamens n'est pas assez connue pour qu'en faisant

---

(1) Dictionnaire des Sciences médicales, art. *Posologie.*

(2) Manuel médico-chirurgical, etc., tome I, 1821.

(3) Conspectus des pharmacopées de Dublin, d'Édimbourg, de Londres et de Paris, 1820.

le procès avec plus ou moins d'esprit à certaines dénominations, on puisse les exclure formellement de la matière médicale ; nous nous sommes toutefois abstenus de celles qui, tombées en désuétude, sont devenues en quelque sorte ridicules.

On reprochera peut-être aux auteurs d'avoir indiqué des médicamens vieillis et abandonnés ; à cela ils répondent, que tels qui sont inusités à Paris et ailleurs sont employés dans d'autres contrées ; que certains médicamens condamnés par des auteurs recommandables ont été préconisés par des médecins qui ont aussi bien mérité de l'art ; qu'enfin, il y a des substances auxquelles on a renoncé sans motifs légitimes, et sur lesquelles il est utile de faire de nouvelles expériences. On pourrait faire la même réponse par rapport aux préparations assez nombreuses que nous avons souvent données du même remède.

On a cru devoir traiter avec un soin particulier des médicamens indigènes, surtout de ceux qu'on a proposés comme succédanés des substances exotiques les plus utiles. Ces moyens se trouvant sous la main du praticien, offrent à la fois promptitude dans le secours et économie dans la dépense.

Quant à la colonne des remarques, qui semble en quelque sorte sortir du plan de cet ouvrage, on n'a pas pensé, qu'en mettant ce plan à exécution, il fût interdit de faire quelques annotations utiles sur le choix des substances, leurs diverses préparations anciennes et nouvelles, celles qu'on doit préférer, et celles qu'on a abandonnées à tort. Ces notes offrent encore des réflexions sur les sophistications des drogues, sur la composition de certains électuaires officinaux, de certains remèdes bizarrement dénommés, sur d'autres

compositions dangereuses ; enfin on y trouve la désignation des antidotes correspondans aux indications des substances vénéneuses.

Quelques explications sont maintenant nécessaires pour l'intelligence de cet ouvrage. Les doses que nous avons indiquées sous les formes d'infusion, de décoction, de lavement, indiquent toujours un véhicule d'un kilogramme ou deux livres de liquide ; celles qui sont destinées aux loochs, potions purgatives ou autres, comportent quatre ou six onces (128 ou 192 grammes) de véhicule ; il en est de même pour les collyres, linimens, etc.

La dose indiquée doit, le plus souvent, être administrée dans les vingt-quatre heures, en plusieurs tasses, si c'est une infusion ou décoction ; en plusieurs cuillerées, s'il s'agit d'une potion ; en plusieurs bols, ou pilules ; en plusieurs prises, s'il est question de substances simples ou de poudres appropriées à ces formes pharmaceutiques. Ces règles sont d'ailleurs pour la généralité des cas ; elles souffrent un grand nombre d'exceptions que les circonstances et une expérience particulière des malades suggèrent aux praticiens.

On n'a, en général, indiqué dans les tableaux que les substances qui se mesurent ou se pèsent, sauf quelques agens impondérables comme les gaz, les diverses vapeurs, ou quelques agens qu'on applique en masse, tel est l'aimant, par exemple.

Dans certains cas toutefois, on a cru pouvoir se dispenser d'indiquer la quantité des médicamens solides ou liquides qu'on emploie en frictions ou autres applications extérieures sur la peau non dénudée; mais il convient de nouveau de faire observer que les parties

se trouvant dénudées, il faudrait restreindre de beaucoup la dose, attendu que l'absorption y est beaucoup plus prompte et plus active.

Relativement à certains médicamens, tels que les pilules, les poudres, les pommades, les tablettes, comme le nombre en est presque infini et qu'il fallait se resserrer dans d'étroites limites, nous avons dû prendre pour guide le codex de Paris.

Malgré tout le soin que les auteurs ont apporté dans la rédaction de cet ouvrage, il se compose de tant d'objets divers, qu'il leur sera probablement échappé quelques fautes autres que celles qui ont été signalées dans l'*errata*; ils réclament d'avance l'indulgence des lecteurs, et ils sauront gré à ceux qui leur signaleront les erreurs qui leur sont échappées. Ils pourront ainsi en purger l'ouvrage, si le public médical daigne accueillir un travail long et pénible, et dans lequel les auteurs n'ont été soutenus que par le désir d'être utiles principalement aux jeunes médecins qui entrent dans la carrière, et qui, soit manque de mémoire, soit défaut d'expérience, sont incertains sur les doses d'un grand nombre de médicamens.

TABLEAUX SYNOPTIQUES

DE

POSOLOGIE MÉDICALE.

Doses. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE. Poids anc.	Poids décim.	MODE D'ADMINISTRATION.
Absinthe (*grande*). *Artemisia absinthium.* Anthelmintique, éménagogue, stimulant, vermifuge et fébrifuge.	Sommités.	De 1 à 4 gros.	De 4 à 16 gramm.	En infusion aqueuse et vineuse.
	Poudre.	De 18 grains à 1 gros.	De 1 à 4 grammes.	En pilules ou en opium.
	Conserve.	De 1 à 2 gros.	De 4 à 8 grammes.	•
	Eau distillée.	De 2 gros à 1 once.	De 8 à 32 gramm.	Dans les potions.
	Extrait.	De 18 grains à 1 gros.	De 1 à 4 gramm.	En pilules. Dissous dans les potions.
	Huile fixe. (2).	•	»	»
	Huile volatile.	De 5 à 10 gouttes.	•	Dans les potions.
Absinthe (*petite*). *Artemisia pontica.* Elle jouit des propriétés de la précédente à un plus faible degré; elle n'est employée que très-rarement.	Sirop.	De 2 gros à 2 onces.	De 8 à 64 gramm.	Dans les potions ou tisanes.
	Suc.	De 2 à 4 onces.	De 64 à 128 gram.	•
	Teinture.	De 18 grains à 2 gros.	De 1 à 8 gramme.	Dans du vin ou dans des potions.
	Vin.	De 1 à 4 onces.	De 32 à 128 gram.	Pur ou mêlé à divers liquides.

à 7, 1/3; de 7 à 14, 1/2; de 14 à 20, 2/3; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINISTRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
De 1 à 2 onces.	De 32 à 64 gramm.	En lavement comme anthelmintiq., en topiques.	(1) On peut employer la poudre pour préparer des cataplasmes.
» (1)	»		
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
De 1 à 2 onces.	De 32 à 64 gramm.	En linim. ou en lavement.	(2) Préparée par macération.
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
De 4 gros à 1 once.	De 16 à 32 gramm.	En liniment.	
»	»	»	

Doses. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes) ; de 1 à 3, 1/6 ; de

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE. Poids anc.	Poids nouv.	MODE D'ADMINISTRATION.
ABSINTHE MARITIME. *Artemisia maritima.* Anthelmintique	La plante entière.	De 2 gros à 1 once.	De 8 à 32 gramm.	En infusion (1)
	En poudre.	De 18 grains à 1 gros.	De 1 à 4 gramm.	En pilules ou opiat.
ACACIA D'ÉGYPTE. Suc de la gousse verte du *Mimosa nilotica*, astringent tonique.	En substance.	De 18 à 54 grains.	De 1 à 3 gramm.	En poudre, en pilules, ou en opiat (2)
ACANTHE MOLLE. *Acanthus mollis.* Émollient mucilagineux.	La plante entière.	•	•	•

à 7, 1/3 ; de 7 à 14, 1/2 ; de 14 à 20, 2/3 ; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINISTRATION.	*REMARQUES.*
Poids anc.	Poids nouv.		
De 4 gros à 2 onces.	De 16 à 64 gramm.	En lavement contre les ascarides vermiculaires	(1) On prépare cette infusion avec 8 onces d'eau ; elle doit être prise en une fois.
•	•	•	
•	•	•	(2) On lui substitue, mais à tort, le suc d'acacia nostras. Voyez *Prunellier sauvage.*
Quantité indéterminée.	•	En lavement, fomentation et cataplasmes.	

DOSES. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 3

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE. Poids anc.	Poids nouv.	MODE D'ADMINISTRATION.
ACÉTATE D'AMMONIAQUE. *Acetas ammoniæ.* Stimulant diffusible, diurétique et sudorifique (1).	Liquide et marquant cinq degrés au pèse-sel.	De 2 gros à 2 onces.	De 8 à 64 gramm.	En potion ou dans des tisanes.
ACÉTATE DE CUIVRE SEC. *Acetas cupri.* Astringent, escharotique employé contre le cancer et l'épilepsie. VÉNÉNEUX (2).	En substance.	De 1/5 de gr. à 2 grains.	De 1 centigr. à 1 décigr.	En pilules.

à 7, 1/3 ; de 7 à 14, 1/2 ; de 14 à 20, 2/3 ; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINISTRATION.	*REMARQUES.*
Poids anc.	Poids nouv.		
»	»	En gargarisme, linim., onguens, lotions.	(1) Pour obtenir de bons effets de cet acétate, il faut l'administrer à très-haute dose. Cette dose a été portée jusqu'à 4 ou 6 onces en vingt-quatre heures dans certains typhus de mauvais caractère ; on l'a aussi donné avec succès contre l'ivresse, à la dose de 20 gouttes dans un verre d'eau sucrée.
»	»	En poudre sur les chairs fongueuses, les ulcères atoniques.	(2) La plupart des auteurs signalent ce sel comme très-dangereux, et conseillent de ne l'administrer à l'intérieur qu'avec les plus grandes précautions. A l'extérieur et sur les parties dénudées, il peut avoir une action vénéneuse. *Antidotes*, Vomitifs. Eau chargée de blancs d'œufs. (Albumine.)

Doses. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6 ; (

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE. Poids anc.	Poids nouv.	MODE D'ADMINI TRATIO
ACÉTATE DE CUIVRE ET D'AMMONIAQUE. *Acetas cupri et ammoniæ.* Jouit des mêmes propriétés que le *sous-acétate de cuivre.*	En substance.	De 1/5 de gr. à 2 grains.	De 1 centigr. à 1 décigr.	En pilule
ACETATE DE MERCURE. *Acetas hydrargiri.* Anti-syphilitique. VÉNÉNEUX.	En substance.	De 1/5 de gr. à 1 grain.	De 1 à 5 centigr.	En soluti et mêlé des sirop dits dépur tifs, en pi lules (1).
ACÉTATE DE MORPHINE. *Acetas morphinæ.* Calmant. VÉNÉNEUX (2).	En substance.	De 1/5 de gr. à 2 grains.	De 1 à 5 centigr.	Dissoute da des sirop en pilules en potions

à 7, 1/3 ; de 7 à 14, 1/2 ; de 14 à 20, 2/3 ; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINISTRATION.	*REMARQUES.*
Poids anc.	Poids nouv.		
•	•	En poudre sur les chairs fongueuses, les ulcères atoniques.	(1) On ne doit mêler le sel au sirop que lorqu'on veut l'employer. L'acétate de mercure fait la base des *dragées*, dites de *Keyser*, vantées comme anti-syphilitiques.
•	•	•	(2) L'acétate solide perd un peu de son acide pendant sa préparation. Lorsqu'on veut l'incorporer dans un véhicule, on doit ajouter une petite quantité d'acide acétique. L'acétate de morphine paraît dépourvu des propriétés âcres et narcotiques de l'opium, dont sa base est extraite
•	•	•	*Antidotes.* Vomitifs à haute dose, eau chargée de magnésie, saignées.

DOSES. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE. Poids anc.	Poids nouv.	MODE D'ADMINISTRATION.
ACÉTATE DE PLOMB SEC. *Acetas plumbi.* Astringent, calmant et résolutif. VÉNÉNEUX à haute dose (1).	En substance.	De 1 à 2 grains.	De 5 centigr. à 1 décigr.	En pilules; en solution dans l'eau distillée.
ACÉTATE DE PLOMB LIQUIDE. *Sous-acétate de plomb. Sub-acetas plumbi.* Astringent et sédatif.	»	»	»	»
ACÉTATE DE POTASSE. *Acetas potassæ.* Diurétique, excitant, employé contre les hydropisies.	En substance.	De 1 à 3 gros.	De 4 à 12 gramm.	Dans les potions et tisanes (2).

à 7, 1/3 ; de 7 à 14, 1/2 ; de 14 à 20, 2/3 ; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINISTRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
»	»	»	
De 1 à 2 gros pour 1 liv. d'eau.	De 4 à 8 gr. pour 500 gr. d'eau	En fomentation, en injections, en lotions ; il entre dans des cérats, des pommades, des collyres.	(1) La dose de l'acétate de plomb a été portée graduellement jusqu'à 15 grains dans la phthisie pulmonaire, dans l'intention de modérer les sueurs. *Antidotes.* Vomissement. Solution de sulfate de soude, de magnésie, eau hydrosulfurée.
»	»	»	(2) A plus haute dose, il agit quelquefois comme purgatif.

Doses. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes) ; de 1 à 3, 1/6; dee

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE. Poids anc.	Poids nouv.	MODE D'ADMINISTRATION.
ACÉTATE DE SOUDE. *Acetas sodæ.* Mêmes propriétés que le précédent.	En substance.	De 1 à 4 gros.	De 4 à 16 gramm.	Dans les pp tions et tisa nes.
ACHE DES MARAIS. *Apium graveolens.* Diuretique, excitant (1).	Conserve.	De 1 à 2 onces.	De 32 à 64 gramm	»
	Feuilles.	De 1 à 2 onces.	De 32 à 64 gramm.	En infusio
	Semences.	De 1 à 2 gros.	De 4 à 8 gramm.	*Idem.*
	Racine.	De 2 à 4 gros.	De 8 à 16 gramm.	En décocti
	Racine en poudre.	De 18 à 36 grains.	De 1 à 2 gramm.	En pilule ou opiat.
ACIDE ACÉTIQUE. *Voy.* Vinaigre radical.	»	»	»	»
ACIDE ARSÉNIEUX. *Voy.* Oxide l'arsenic.	»	»	»	»

à 7, 1/3 ; de 7 à 14, 1/2 ; de 14 à 20, 2/3 ; de 20 à 60, le dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINISTRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
•	•	•	
•	•		
•	Quantité indéterminée.	En cataplasmes.	(1) Les semences et la racine d'ache faisaient partie, les premières des quatre semences *chaudes majeures*, et les secondes des cinq *racines apéritives majeures*.
•	•	•	
•	•	•	
•	•	•	
•	•	•	
•	•	•	

Doses. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 33

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE. Poids anc.	Poids nouv.	MODE D'ADMINISTRATION.
Acide benzoïque. *Acidum benzoïcum.* Excitant, expectorant.	En substance.	De 6 à 18 grains.	De 3 décigr. à 1 gramm.	En pilules, en tablettes, potions.
Acide borique. *Acidum boracicum.* Sédatif, tempérant.	L'acide.	De 4 à 10 grains.	De 2 à 5 décigr.	En pilules, en potion.
Acide carbonique. *Acidum carbonicum.* Diurétique, rafraîchiss. (1), anti spasmodique.	L'acide dissous dans l'eau, les eaux acidules gazeuses, l'eau de Seltz.	Plusieurs verres par jour.	»	»

à 7, 1/8 ; à de 7 à 14, 1/2 ; de 14 20, 2/3 ; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINISTRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
De 1 à 2 gros.	De 4 à 8 gramm.	En fumigations.	
De 1 à 2 gros.	De 4 à 8 gramm.	En gargarismes, lotions.	(1) L'acide carbonique fait partie des eaux minérales acidules gazeuses. A l'état gazeux, on l'a proposé pour modifier les phénomènes chimiques de la respiration; mais on doit préférer les gaz hydrogène et azote. Cet acide est le principal agent de la potion anti-émétique de *Rivière*.
»	»	»	

Doses. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE. Poids anc.[1]	Poids nouv.	MODE D'ADMINISTRATIONS
ACIDE CITRIQUE. *Acidum citricum* (1). Rafraîchissant, délayant.	L'acide dissous.	De 18 à 36 grains.	De 1 à 2 gramm.	En limonade, pastilles.
ACIDE HYDROCHLORIQUE. *Acidum hydrochloricum* (2). Astringent, rubéfiant, escharotique, VÉNÉNEUX, suivant son degré de concentration.	L'acide pur.	Jusqu'à agréable acidité.	•	En limonade.
ACIDE HYDROCHLORO-NITRIQUE. Rubéfiant (3). Très-VÉNÉNEUX	•	•	•	•

à 7, 1/3 ; de 7 à 14, 1/2 ; de 14 à 20, 2/3 ; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINISTRATION.	*REMARQUES.*
Poids anc.	Poids nouv.		
•	•	•	
De 2 à 4 onces.	De 64 à 128 gramm.	En pédiluves.	(1) On emploie souvent l'acide citrique pour remplacer le suc de citron, lorsqu'on ne peut se procurer ce suc. A l'état de concentration, il pourrait causer des accidens.
De 1 à 2 gros.	De 4 à 8 gramm.	En gargarismes et en collutoires.	(2) Quatre onces d'acide hydrochlorique, et 1 gros de naphthe ou pétrole distillé étendu dans suffisante quantité d'eau (pour un manuluve ou un pédiluve), constitue le remède anti-goutteux de *Gondran*.
De 2 à 6 onces.	De 64 à 192 gramm.	En pédiluves.	(3) Cet acide est employé en pédiluves, spécialement dans les maladies de foie. Pour les *antidotes* de ces deux acides, *voy.* Acide nitrique.

DOSES. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes) ; de 1 à 3, 1/6 ; de 3

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE. Poids anc.	Poids nouv.	MODE D'ADMINISTRATION.
ACIDE HYDROCYANIQUE. *Voyez* Acide prussique médicinal.	»	»	»	»
ACIDE HYDROSULFURIQUE. *Acidum hydrosulfuricum.* Anti-herpétique.	Entre dans la composition des eaux minérales sulfureuses.	Plusieurs verres par jour des eaux de Barr., d'Enghien, etc.	»	»
ACIDE MURIATIQUE. *Voy.* Acide hydrochlorique.	»	»	»	»
ACIDE MURIATIQUE ALCOOLISÉ. *Voy.* Esprit de sel dulcifié, *ou* Alcool muriatique.	»	»	»	»

à 7, 1/3; de 7 à 14, 1/2; de 14 à 20, 2/3; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINISTRATION.	*REMARQUES.*
Poids anc.	Poids nouv.		
»	»	»	
Quantité indéterminée dissous dans l'eau.	»	En bains (1).	(1) MM. Rayer et Chevallier ont proposé d'employer les eaux hydrosulfurées en boisson pour combattre les accidens produits par la colique de plomb ou des peintres.
»	»	»	
»	»	»	

Doses. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE. Poids anc.	Poids nouv.	MODE D'ADMINISTRATION.
ACIDE MURIATIQUE OXIGÉNÉ. *Voy.* Chlore.	•	•	•	•
ACIDE NITREUX. *Acidum nitrosum.* Caustique. VÉNÉNEUX.	•	•	•	•
ACIDE NITRIQUE. *Acidum nitricum.* Étendu d'eau, diurétique et rafraîchissant; concentré, caustique, escharotique. VÉNÉNEUX.	L'acide pur.	De 36 grains à 2 gros.	De 2 à 8 gramm.	En limonade (1).
ACIDE NITRIQUE ALCOOLISÉ. *Voy.* Esprit de nitre dulcifié.	•	•	•	•

à 7, 1/3 ; de 7 à 14, 1/2 ; de 14 à 20, 2/3 ; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINISTRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
»	»	»	
En quantité indéterminée.	»	Pour cautériser.	
En quantité indéterminée.	»	*Idem*, En fumigation comme moyen désinfectant.	(1) Cette limonade est celle que le pharmacien Alyon a proposée contre les maladies syphilitiques. C'était, au reste, moins l'acide qu'il voulait employer, que l'oxigène qui s'y trouve en grande quantité. *Antidotes*. Eau chargée de magnésie, mucilagineux, saignées.
»	»	»	

Doses. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; d

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE. Poids anc.	Poids nouv.	MODE D'ADMINISTRATION
Acide oxalique. *Acidum oxalicum.* A petites doses dissous dans l'eau, rafraîchissant; à haute dose, il est Vénéneux (1).	L'acide jusqu'à agréable acidité.	»	»	En limonade, en tablettes.
Acide phosphorique. *Acidum phosphoricum.* Étendu d'eau, il est rafraîchissant et excitant; concentré, il est Vénéneux (2).	En substance.	De 12 à 36 grains.	De 6 décigr. à 2 gramm.	Dans l'eau sucrée pour faire une limonade.

à 7, 1/3; de 7 à 14, 1/2 ; de 14 à 20, 2/3; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINISTRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
»	»	»	
En quantité indéterminée.	»	Comme caustique.	(1) L'acide oxalique à haute dose (demi-once par exemple) est un poison. Par sa ressemblance avec le *sulfate de magnésie* , il a donné lieu à des méprises funestes. (*L. Perey* , *acidi oxalici de vi venenatâ*, (*Edinburg*.) (2) Les *antidotes* des acides oxalique et phosphorique sont les mêmes que pour les acides concentrés.

Doses. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6;

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PRO PRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et compo-és.	USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE. Poids anc	Poids nouv.	MODI D'ADMINI TRATIO
ACIDE PRUSSIQUE MÉDICINAL (DE MAGENDIE). *Acidum prussicum medicinale.* Acide préparé selon la méthode de Gay-Lussac, et étendu de huit fois et demie son poids d'eau.	L'acide médicinal.	5 gouttes par once de véhicule.	»	En potio
	Mélange pectoral. (*Magendie*,)	Dans les proportions de 1 gros sur 1 livre d'eau.		A prenr par cui rée à b che, une matin, le soir.
	Sirop cyanique. (*Magendie.*)	Sirop de sucre préparé avec sirop 1 livre, acide prussiq. médicinal 1 gros.	»	On se serv ce sirop p ajouter potions, remplaca les autres rops (1).
ACIDE PYROLIGNEUX. *Acidum pyrolignosum.* Tonique, excitant.	»	«		«

à 7, 1/3; de 7 à 14, 1/2; de 14 à 20. 2/3; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINISTRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
»	»	»	
»	»	»	
»	«	«	
En quantité indéterminée pour exciter et cautériser les plaies et ulcères atoniques, fongueux, carcinomateux etc.	»	»	(1) Il faut bien se garder de confondre ce sirop avec celui du *Codex de Paris*, qui, à raison de la concentration de l'acide hydrocianique qu'il contient et de sa quantité, ne peut guère être administré que par gouttes, ou à plus forte dose étendue dans des tisanes. L'emploi de ce dernier sirop a donné lieu à des accidens funestes.

DOSES. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 33

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE. Poids anc.	Poids nouv.	MODE D'ADMINISTRATION.
ACIDE SULFUREUX. *Acidum sulfurosum.* Anti-herpétique, sudorifique (1).	L'acide gazeux.	»	»	»
ACIDE SULFURIQUE. (Acide vitrioli que.) (*Acidum sulfuricum.* VÉNÉNEUX (2) Astringent, rafraîchissant caustique.	Étendu d'eau	Jusqu'à agréable acidité, et à plus forte dose quand on l'emploie comme astringent.	»	En limonade mêlé à l'eau sucrée.
ACIDE SULFURIQUE ALCOOLISÉ. Acide sulfurique dulcifié. *Voy.* Eau de Rabel.	»	»	»	»

à 7, 1/3; de 7 à 14, 1/2; de 14 à 20, 2/3; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINISTRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv		
A l'état gazeux, en fumigations sous forme de vapeurs.	»	»	(1) L'acide sulfureux fait la base des fumigations sulfureuses, très-employées contre les dartres, la gale, etc.; on s'en sert aussi comme désinfectant. Lorsqu'on en fait usage, il faut bien se garder de le respirer, car il causerait de graves accidens.
En quantité indéterminée.	»	Comme astringent et caustique.	(2) *Antidotes.* Eau chargée de magnésie, adoucissans, saignées.
»	»	»	

Doses. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes) ; de 1 à 3, 1/6 ; de

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE. Poids anc.	Poids nouv.	MODE D'ADMINISTRATION.
ACIDE TARTAREUX *ou* ACIDE TARTRIQUE. *Acidum tartaricum.* Étendu d'eau, rafraîchissant ; à haut. doses, il est VÉNÉNEUX.	Dissous dans l'eau.	Jusqu'à agréable acidité.	.	En limonade avec quantité suffisante de sucre en pastilles.
ACIER PORPHYRISÉ. *Chalybs levigatus.* Tonique puissant (1).	Entier.	De 18 à 36 grains.	De 1 à 2 gros.	En poudre, en pilules, en opiat.
ACONIT NAPEL. *Aconitum napellus.* Stimulant, âcre, narcotique et VÉNÉNEUX (2).	Feuilles en poudre.	De 1 à 4 grains.	De 5 centigr. à 2 décigr.	En pilules.
	Extrait.	De 1/5 à 1 grain.	De 1 à 5 centigr.	En pilules, en potion.
	Teinture.	De 5 à 40 gouttes.	.	En potion.

à 7, 1/3; de 7 à 14, 1/2; de 14 à 20, 2/3; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINISTRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
»	»	»	(1) On le recommande contre l'empoisonnement par les sels de cuivre.
»	»	»	(2) Les doses indiquées pour l'aconit peuvent être augmentées graduellement, et portées beaucoup plus loin que ne l'ont cru certains pharmacologistes, entre autres *Deshois de Rochefort*. Les autres espèces d'aconit usitées en pharmacie ont les mêmes propriétés que le *napel*, et se trouvent souvent mêlées avec lui. *Antidotes*. Vomitifs, adoucissans internes et externes.
De 4 gros à 1 once.	De 16 à 32 gramm.	Les feuilles en cataplasmes.	
»	»	»	
De 2 à 4 gros.	De 8 à 16 gramm.	En linim. contre la goutte, les rhumat., les névralgies. (*Stark*).	

Doses. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE. Poids anc.	Poids nouv.	MODE D'ADMINISTRATION.
ACORE ODORANT. *Acorus calamus.* Aromatique, stimulant, stomachique, sudorifique.	Racine concassée.	De 36 grains à 2 gros.	De 2 à 8 gramm.	En infusion.
	Poudre.	De 18 grains à 1 gros.	De 1 à 4 gramm.	En pilules, en opiat, etc.
	Extrait.	De 18 à 36 grains.	De 1 à 2 gramm.	En pilules, en potion.
ADIANTHE. *Voy.* Capillaire.	»	»	»	»
ADIPOCIRE. *Voy.* Blanc de baleine.	»	»	»	»
AGARIC BLANC. *Boletus laricis.* Purgatif drastique. Proposé contre les sueurs excessives.	Concassé.	De 36 grains à 1 gros.	De 2 à 4 gramm	En infusion vineuse.
	Poudre.	De 18 à 36 grains.	De 1 à 2 gramm	En pilules (1).
	Extrait.	De 1 à 4 grains.	De 5 centig à 2 décigr.	En pilules.
	Trochisques.	De 10 à 12 grains.	De 5 à 6 décigr.	En opiat.

à 7, 1/3 ; de 7 à 14, 1/2 ; de 14 à 20, 2/3 ; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINISTRATION.	*REMARQUES.*
Poids anc.	Poids nouv.		
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	(1) Les anciens conseillaient l'agaric comme *altérant* à une dose assez élevée. De Haën l'employait pour modérer les sueurs des phthisiques à la dose de 2 grains (1 décigramme) chaque soir.
»	»	»	
En quantité indéterminée	»	Pour saupoudrer les vieux ulcères	
»	»	»	
»	»	»	

DOSES. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de

NOMS FRANÇAIS, NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE. Poids anc.	Poids nouv.	MODE D'ADMINISTRATION.
AGARIC DE CHÊNE. *Boletus igna-rius.*	Entier.	»	»	»
»	»	»	»	»
AGRIPAUME CARDIAQUE. *Leonurus cardiaca.* Amer, antispasmodique.	Feuilles.	De 1 à 2 gros.	De 4 à 8 gramm	En infusion
AIGREMOINE. *Agrimonia Eupatoria,* Amer, astringent.	Feuilles.	De 2 à 4 gros.	De 8 à 16 gramm.	En infusion
	Poudre.	De 18 grains à 1 gros.	De 1 à 2 gramm.	En pilules

à 7, 1/3 ; de 7 à 14, 1/2 ; de 14 à 20, 2/3 ; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE		MODE D'ADMINISTRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
En quantité indéterminée pour arrêter les hémorragies externes (1).	»	»	
»	»	»	
»	»	»	(1) Cette substance n'est nullement astringente, et n'agit que mécaniquement à la manière des tampons.
En quantité indéterminée	»	En cataplasme, en gargarisme.	
»	»	»	

Doses. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE. Poids anc.	Poids nouv.	MODES D'ADMINISTRATION
AIL. *Allium sativum.* Excitant, anthelmintique, rubéfiant.	Ail entier.	De 1 à 2 gros.	De 4 à 8 gramm.	En décoction
AIMANT. *Oxidulum ferri magneticum.* Anti-névralgique (1).	Entier et en masse.	•	•	•
AIRELLE MYRTILLE. *Vaccinium myrtillus.* Rafraîchissant.	Sirop préparé avec le fruit.	De 2 à 4 onces.	De 64 à 128 gram.	Dans les tisanes
ALATERNE. *Rhamnus alaternus.* Excitant.	Feuilles.	De 2 à 4 gros.	De 8 à 16 gramm.	En décoction

à 7, 1/3; de 7 à 14, 1/2; de 14 à 20, 2/3; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADUETE.		MODE D'ADMINISTRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv,		
Quantité indéterminée.	•	En sinapisme.	
Idem.	•	En liniment.	(1) L'aimant a été appliqué à l'extérieur par le moyen de plaques, et en barreaux pour calmer les douleurs, A raison de sa faculté attractive pour le fer, on s'en estservi pour extraire des plaies des particules de ce métal. C'est dans le traitement des maladies nerveuses que l'aimant est spécialement employé. Klarich, médecin anglais, proposa l'un des premiers l'aimant pour la guérison de l'*odontalgie*, de la *paralysie*, de la *surdité*, du *rhumatisme*. Les expériences de l'abbé Lenoble, de Thouret, de Vicq-d'Azyr prouvent que cet agent n'est pas sans action sur l'économie animale, quoiqu'il soit aujourd'hui presque entièrement inusité.
•	•	•	
•	•	•	
De 4 gros à 1 once.	De 16 à 32 gramm.	En gargarisme.	

DOSES. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes) ; de 1 à 3, 1/6 ; de .

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE. Poids anc.	Poids nouv.	MODE D'ADMINISTRATION.
ALBUMINE. *Albumen.* Contrepoison du sublimé corrosif.	En substance.	De 2 à 3 onces.	De 64 à 96 gramm.	Mêlée et battue avec de l'eau (1).
ALCALI VOLATIL. *Voy.* Ammoniaque liquide.	»	»	»	»
ALCÉE ROSE. *Alcea rosea.* Adoucissant, émollient.	Racine.	De 4 gros à 1 once.	De 16 à 32 gramm.	En décoction, en tisane.
ALCHIMILLE. *Alchimilla vulgaris.* Astringent.	Feuilles.	De 2 à 4 gros.	De 8 à 16 gramm.	En décoction.
ALCOOL. *Alcool.* Stimulant.	A 33 degrés.	De 1 à 2 onces.	De 32 à 64 gramm.	Dans des tisanes, limonades, etc.

à 7, 1/3 ; de 7 à 14, 1/2 ; de 14 à 20, 2/3 ; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINISTRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
De 1 à 2 onces.	De 32 à 64 gramm.	Dans des collyres, des embrocations, des linim.	
»	»	»	(1) M. Thénard ayant avalé par mégarde une gorgée de solution concentrée de sublimé corrosif, prévint tous les accidens qu'on devait craindre de cet empoisonnement par l'usage des blancs d'œufs délayés dans l'eau.
De 2 à 4 onces.	De 64 à 128 gramm.	En fomentations, lavemens, etc.	
De 1 à 2 onces.	De 32 à 64 gramm.	En lotions, fomentat., lavemens.	
En quantité indéterminée.	»	En frictions et en lotions	

Doses. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 3

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE. Poids anc.	Poids nouv.	MODE D'ADMINISTRATION.
ALCOOLATS (1).				
ALCOOL CAMPHRÉ. *Alcool camphoratus.* Tonique, sédatif.	Pur ou étendu d'eau (2).	»	»	»
ALCOOLS DE CINCHONINE ET DE QUININE. *Voy.* Cinchonine et Quinine.	»	»	»	»
ALCORNOQUE (3). Tonique et astringent.	Entière.	De 1 à 2 onces.	De 32 à 64 gramm.	En infusion vineuse.
	Poudre.	De 1 à 2 gros.	De 4 à 8 gramm.	En pilules, opiat.
ALKEKENGE. *Physalis alkekengi.* Diurétique.	Baies.	De 2 gros à 1 once.	De 8 à 32 gramm.	En infusion.
	Suc.	De 1/2 once à 1 once.	De 16 à 32 gramm	

à 7, 1/3; de 7 à 14, 1/2; de 14 à 20, 2/3; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINISTRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
De 4 gros à 1 once.	De 16 à 32 gramm.	En embrocations, dans des linim.	(1) On donne le nom d'*alcoolat* à l'alcool chargé par macération et ensuite par distillation de quelques principes volatils d'une ou plusieurs substances. Ces produits diffèrent des teintures par leur nature et leur mode de préparation : les teintures, en effet, contiennent des principes très-variés, tandis que les alcoolats ne sont chargés que de substances volatiles. Cette dénomination est nouvelle et encore très-peu employée dans les ouvrages de matière médicale et de pharmacie.
»	»	»	
»	»	»	(2) On ne doit pas confondre l'alcool camphré avec l'eau-de-vie camphrée.
»	»	»	(3) Cette écorce, apportée d'Amérique en Espagne en 1804 pour la première fois, fut introduite en France en 1812 par le docteur Poudenx. Selon M. Virey, l'alcornoque n'est autre chose que l'écorce du *quercus suber*. On l'a vantée contre la phthisie pulmonaire,
»	»	»	

Doses. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 3

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE. Poids anc.	Poids nouv.	MODE D'ADMINISTRATION.
ALLELUIA. *Voy.* Oxalides.	»	»	»	»
ALLIAIRE. *Erysimum alliaria.* Diurétique et stimulant.	Sommités fleuries.	De 2 gros à 1 once.	De 8 à 32 gramm.	En décoction.
ALOÈS SOCCOTRIN. *Aloë soccotrina* (1). Purgatif, tonique et emménagogue.	Suc en poudre.	De 4 à 10 grains.	De 2 à 5 décigr.	En pilules. A cette dose, l'aloès agit comme purgatif.
	Idem.	De 2 à 3 grains.	De 10 à 15 centigr.	En pilules. A cette dose, l'aloès agit comme tonique.
	Extrait gommeux.	De 6 à 14 grains.	De 3 à 7 décigr.	En pilules.
	Teinture.	De 6 à 24 gouttes.	De 3 à 12 décigr.	En potion.

à 7, 1/3; de 7 à 14, 1/2; de 14 à 20, 2/3; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINISTRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
»	»	»	
»	»	»	
De 12 à 18 grains.	De 6 décigr. à 1 gramm.	En lavement, contre les ascarides.	(1) Nous n'indiquons que l'aloës soccotrin. Les aloës *hépatique* et *cabalinne* sont employés que dans la médecine vétérinaire. L'aloës entre dans une foule de préparations officinales, telles que l'*élixir de longue vie*, l'*hiera picra*, l'*opiat mésentérique*, les pilules de *Rufus*, de *Boatius*, de *Fuller*, et celles qu'on appelle *écossaises* ou du docteur *Anderson*.
»	»	»	
»	»	»	
En quantité indéterminée.	»	Portée dans l'anus à l'aide d'un tampon de coton, contre les ascarides.	

Doses. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 3

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MEDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE. Poids anc.	Poids nouv.	MODE D'ADMINISTRATION.
ALTHEA. *Voy.* Guimauve.	»	»	»	»
ALUN. *Voy.* Sulfate acide d'alumine et de potasse.	»	»	»	»
ALUN CALCINÉ. *Voy.* Sulfate d'alumine et de potasse calciné.	»	»	»	»
AMANDES DOUCES. *Amygdalæ dulces.* Adoucissantes, sédatives.	Entières.	De 4 gros à 2 onces.	De 16 à 64 gramm.	En émulsion, dans les potions, tisanes.
	Huile d'amandes.	De 2 gros à 1 once.	De 8 à 32 gramm.	Dans les potions, loochs.
	Sirop d'amandes ou d'orgeat,	De 1 à 4 onces.	De 32 à 128 gramm.	Dans les tisanes, potions et loochs.

à 7, 1/3 ; de 7 à 14, 1/2 ; de 14 à 20, 2/3 ; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINISTRATION.	*REMARQUES.*
Poids anc.	Poids nouv.		
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
Quantité indéterminée.	»	En linimens, embrocat., injections, etc.	
»	»	»	

Doses. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 3

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE. Poids anc.	Poids nouv.	MODE D'ADMINISTRATION.
AMANDES AMÈRES. *Amygdalæ amaræ.* A petites doses, antispasmodiques (1); à hautes doses, VÉNÉNEUSES.	Entières.	De 1 à 2 gros.	De 4 à 8 gramm.	Pour une émulsion de 4 onces.
	Huile d'amandes.	Comme l'huile d'amand. douc.	»	»
	Eau distillée.	De 10 à 24 grains.	De 5 à 12 décigr.	En potions
AMBRE GRIS. *Ambra cinerea.* Antispasmodique, aphrodisiaque.	En substance	De 10 à 16 grains.	De 5 à 8 décigr.	En pilules, opiat.
	Teinture.	De 18 à 36 grains.	De 1 à 2 gramm.	En potion
	Teinture éthérée.	De 18 à 36 grains.	De 1 à 2 gramm.	*Idem.*
AMBRE JAUNE *Voy.* Succin.	»	»	»	»

à 7, 1/3; de 7 à 14, 1/2; de 14 à 20, 2/3; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINISTRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
»	U	»	
Comme l'huile d'amand. douc.	»	»	
De 1 à 2 gros.	De 4 à 8 gramm.	En lotions.	(1) On a proposé les amandes amères comme fébrifuges. Quelques auteurs pensent qu'elles jouissent de la propriété de neutraliser les effets des liqueurs fermentées et de dissiper l'ivresse. Les propriétés vénéneuses des amandes amères ont été attribuées, 1° à l'acide prussique (Bohme); 2° à une huile essentielle (Vogel); 3° à un principe azoté indépendant de l'acide prussique (Robiquet).
»	»	»	
En quantité indétermin.	»	En lotions, en frictions, linimens.	
»	»	»	
»	»	»	

Doses. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 3

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE. Poids anc.	Poids nouv.	MODE D'ADMINISTRATION.
Amidon. *Amylum.* Adoucissant, émollient.	En substance.	De 1 à 4 gros.	De 4 à 16 gramm.	En décoction.
		»	»	»
Ammoniaque liquide. *Ammonia liquida.* Diaphorétique, stimulant, caustique, vésicant. Vénéneux (1).	*Idem.*	De 6 à 12 grains.	De 3 à 6 décigr.	Dans des potions de 4 onces.
	Idem.	»	»	»
	Idem.	»	»	
	Gazeux.	»	»	»
Ammoniure de cuivre. Antisiphilitique, cathérétique. Vénéneux.	Liquide.	De 6 à 10 grains.	De 3 à 5 décigr.	Dans une pinte de tisane.

à 7, 1/3 ; de 7 à 14, 1/2 ; de 14 à 20, 2/3 ; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINISTRATION.	*REMARQUES.*
Poids anc.	Poids nouv.		
De 4 gros à 1 once.	De 16 à 32 gramm.	En lavement.	
En quantité indéterminée.	»	En cataplasmes.	
De 1 à 2 gros.	De 4 à 8 gramm.	Pour 1 once d'huile (liniment), en pommade.	
En quantité indéterminée.	»	Pour produire une vésication rapide.	(1) On emploie le chlore gazeux, ou l'acide hydrochlorique mélangé avec l'air atmosphérique, pour calmer les accidens que cause l'inspiration de l'ammoniaque.
Idem.	»	Pour cautériser les plaies envenimées. (2)	(2) L'ammoniaque fait partie de la pommade de Gondret. On l'emploie pour combattre l'ivresse, à la dose de 6 à 12 gouttes dans un verre d'eau sucrée.
Pour le faire respirer.			
De 4 gros à 1 once.	De 16 à 32 gramm.	Dans une pinte d'eau de sureau, pour appliquer sur les ulcères.	

Doses. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE. Poids anc.	Poids nouv.	MODE D'ADMINISTRATION.
AMOME EN GRAPPES. *Amomum racemosum.*	Poudre.	De 6 à 24 grains.	De 3 à 12 décigr.	En pilules opiat.
Stomachique, éménag. Pour les autres amomes, *voy.* Cardamome, Gingembre et Zedoaire.	Teinture.	De 1 à 3 gros.	De 4 à 12 gramm.	Dans les potions
ANACARDE. *Voy.* Acajou.	»	»	»	»
ANCOLIE VULGAIRE. *Aquilegia vulgaris.*	Racine en poudre.	De 1 à 2 gros.	De 4 à 8 gramm.	En infusi dans du vi
Diurétique, sudorifique, VÉNÉNEUX (1).	Semence en poudre.	De 18 grains à 1 gros.	De 1 à 4 gramm.	En pilule

à 7, 1/3 ; de 7 à 14, 1/2 ; de 14 à 20, 2/3 ; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINISTRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
De 4 à 6 gros.	De 16 à 24 gramm.	En décoction pour gargarisme.	
»	»	»	(1) Cette plante est douée d'une certaine activité ; mais aujourd'hui elle est presque abandonnée. Il serait utile d'examiner plus attentivement ses propriétés.

DOSES. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE. Poids anc.	Poids nouv.	MODE D'ADMINI TRATIO
ANÉMONE PULSATILE. *Anemone pulsatilla* (1). Stimulant, rubéfiant, corrosif, âcre. VÉNÉNEUX.	Feuilles.	De 18 à 36 grains.	De 1 à 2 gramm.	En infus
	Extrait.	De 1 à 3 grains.	De 5 à 15 centigr.	En pilul
	Poudre.	De 1 à 4 grains.	De 5 à 20 centigr.	*Idem.*
ANETH. *Voy.* Fenouil.	«	»	»	»
ANGÉLIQUE. *Angelica archangelica.* Stimulant, diaphorétique.	Racine.	De 4 gros à 1 once.	De 16 à 32 gramm.	En infus
	Racine en poudre.	De 18 à 36 grains.	De 1 à 2 gramm.	En pilu opiat
	Tiges.	De 1 à 2 onces.	De 32 à 64 gramm.	En conse
	Semences.	De 1 à 2 gros.	De 4 à 8 gramm.	En infus
	Eau distillée.	De 1 à 2 onces.	De 32 à 64 gramm.	En poti
	Teinture.	De 36 grains à 2 gros.	De 2 à 8 gramm.	*Idem.*

à 7, 1/3 ; de 7 à 14, 1/2 ; de 14 à 20, 2/3 ; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINISTRATION.	*REMARQUES.*
Poids anc.	Poids nouv.		
De 1 à 2 onces.	De 32 à 64 gramm.	En épithème, en épicarpe.	
»	»	«	(1) L'anémone sylvie, *anemone nemorosa ;* l'anémone des prés, *anemone pratensis* ; l'anémone hépatique, *anemone hepatica*, sont considérées comme jouissant des mêmes propriétés et comme VÉNÉNEUSES.
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	

DOSES. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de

MOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE. Poids anc.	Poids nouv.	MODE D'ADMINI TRATION
ANGUSTURE. *Cortex angusturæ veræ. Cusparia angustura.* Tonique, fébrifuge.	Écorce concassée.	De 1 à 2 gros.	De 4 à 18 gramm.	En infusio
	Écorce en poudre.	De 12 à 18 grains.	De 6 décigr. à 1 gramm.	En pilule opiat.
	Teinture.	De 1 à 2 gros.	De 4 à 8 gramm.	Dans les potion
	Extrait.	De 6 à 12 grains.	De 3 à 6 décigr.	En pilule
ANGUSTURE (La fausse). VÉNÉNEUSE (1).	»	»	»	»
ANIS VERT. *Pimpinella anisum.* Stimulant.	Entier.	De 1 à 2 gros.	De 4 à 8 gramm.	En infusio
	Poudre.	De 18 à 36 grains.	De 1 à 2 gramm.	En pilule opiat.
	Eau distillée.	De 4 gros à 1 once.	De 16 à 32 gramm.	En potion
	Huile volatile.	De 2 à 6 gouttes.	»	*Idem* (2).
	Teinture.	De 18 grains à 1 gros.	De 1 à 8 gramm.	*Idem.*

à 7, 1/3 ; de 7 à 14, 1/2 ; de 14 à 20, 2/3 ; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINISTRATION.	*REMARQUES.*
Poids anc.	Poids nouv.		
De 2 à 4 gros.	De 8 à 16 gramm.	En lotions.	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
De 2 à 4 gros.	De 4 à 8 gramm.	En lavemens.	(1) Il ne faut pas confondre l'angusture vraie avec la fausse angusture ; l'une se trouve souvent mêlée avec l'autre dans le commerce. La fausse angusture est plus compacte, plus pesante que la vraie ; elle est comme racornie par la dessiccation ; à l'intérieur, elle est grise, et à l'extérieur, couleur rouille de fer, etc.
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	(2) Pour mêler les huiles volatiles aux potions, on a soin d'en faire un *oleo-sacharum*.

Doses. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 3

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE. Poids anc.	Poids nouv.	MODE D'ADMINISTRATION.
Anis étoilé. *Voy.* Badiane.	»	»	»	»
Anserine. *Voy.* Chenopode et Potentille.	»	»	»	»
Antimoine. *Stibium.* Expectorant, émétiq. et purgatif.	Chlorure d'antimoine (1).	»	»	»
	Hydrosulfure jaune, *Soufre doré.*	De 1 à 4 grains.	De 5 centig. à 2 décigr.	Dans des potions.
	Hydrosulfure rouge, *Kermès minéral.*	De 1 à 4 grains (2).	De 5 centigr. à 2 décigr.	*Idem.*
	Oxide d'antimoine.	De 18 à 36 grains.	De 1 à 2 gramm.	En potion, opiat, poudre par doses fractionnées.
	Sulfure.	De 4 à 8 grains.	De 2 à 4 décigr.	En poudre, pastilles, extraits (3).
Antimoine diaphorétique *Voy.* Oxide d'antimoine.	»	»	»	»

à 7, 1/3 ; de 7 à 14, 1/2 ; de 14 à 20, 2/3 ; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINISTRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
»	»	»	
»	»	»	
Dose indéterminée.	»	Pour cautériser profondément (3).	(1) Violent poison. *Antidotes*. L'émétiq. comme évacuant, l'eau albumineuse, les antiphlogistiques.
»	»	»	
»	»	»	(2) A la dose de 6 ou 8 gr., il excite le vomissement, mais son action est incertaine ; on ne l'emploie plus comme vomitif.
»	»	»	
»	»	»	(3) Le sulfure d'antimoine entre dans la tisane de *Feltz*. Ce sulfure, à l'état naturel, contient le plus souvent de l'oxide et du sulfure d'arsenic ; il est convenable, pour éviter les accidens, de porphyriser et de laver avant de l'employer à la confection de cette tisane. *Voy*. Tisane.
»	»	»	

Doses. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; d

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE. Poids anc.	Poids nouv.	MODES D'ADMINISTRATIONN
ARBOUSIER (Raisin d'ours) *Arbutus uva ursi.* Astringent.	Entier.	De 1 à 4 gros.	De 4 à 16 gramm.	En infusi ou décoctio
	Poudre.	De 24 grains à 1 gros.	De 12 décigr. à 4 gramm.	En pilule opiat, e (1).
ARGENT. *Argentum.*	Nitrate d'argent cristallisé (2)	D'un 8e de grain à 1/2 grain.	»	Dissous dà l'eau dist lée, ou e veloppé dà le pain azim etc.
	Nitrate d'argent fondu. *Pierre infernale.*	»	»	»
ARISTOLOCHE LONGUE. *Aristolochia longa.* Tonique et éménagogue.	Incisée.	De 2 à 4 gros.	De 4 à 8 gramm.	En infusio
	Poudre.	De 18 à 36 grains.	De 1 à 2 gramm.	En opiat, p lules.

à 7, 1/3 ; de 7 à 14, 1/2 ; de 14 à 20, 2/3 ; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR D'ADULTE.		MODE D'ADMINISTRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
»	»	»	(1) La tige et l'écorce de l'arbousier ont un astringence plus marquée que les feuilles qui ont été très-vantées contre les affections calculeuses des reins. Les feuilles sèches sont souvent, dans le commerce, mêlées aux feuilles d'*airelle ponctuée*.
»	»	»	
En quantité indéterminée.	»	Caustique, employé en dissolution et à l'état solide.	(2) Le nitrate d'argent est un des plus violens poisons. *Antidotes*. L'eau chargée de muriate de soude, l'eau chargée d'albumine, les adoucissans et antiphlogistiques. Ce sel entre dans la composition des pilules anti-épileptiques anglaises ; chaque pilule en contient 1/20 de gr., dose qui diffère beaucoup de celle que nous venons d'indiquer. En général, il y a une énorme différence entre les diverses doses de nitrate d'argent que les praticiens ont prescrites. Il est probable que lorsqu'on administre ce sel, il est en partie décomposé par le mucus qui tapisse l'intérieur des voies digestives.
»	»	Caustique.	
»	»	»	
En quantité indéterminée.	»	Sur les ulcères atoniq. et scorbutiques.	

Doses. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE. Poids anc.	Poids nouv.	MODE D'ADMINISTRATION.
Aristoloche ronde. *Aristolochia rotunda.* Tonique et éménagogue.	Incisée.	De 2 à 4 gros.	De 4 à 8 gramm.	En infusion
	Poudre.	De 18 à 36 grains.	De 1 à 2 gramm.	En opiat, pilules.
Armoise. *Artemisia vulgaris.* Tonique et éménagogue.	Feuilles.	De 1 à 4 gros.	De 4 à 8 gramm.	En infusion
	Poudre.	De 18 grains à 1 gros.	De 1 à 4 gramm.	En poudre.
	Vin d'armoise.	De 1 à 2 onces.	De 32 à 64 gramm.	»
	Sirop d'armoise.	De 1 à 2 onces.	De 32 à 64 gramm.	Dans les potions, tisanes.
Arnique. *Arnica montana.* Tonique, stimulant, astringent.	Fleurs.	De 1 à 2 gros.	De 4 à 8 gramm.	En infusion.
	Fleurs en poudre.	De 18 à 36 grains.	De 1 à 2 gramm.	En pilules, opiat.
	Extrait fait avec les fleurs	De 1 à 2 gros.	De 4 à 8 gramm.	En pilules.
	Poudre de racine.	De 1 à 2 gros,	De 4 à 8 gramm.	En pilules, opiat.

à 7, 1/3 ; de 7 à 14, 1/2 ; de 14 à 20, 2/3 ; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINISTRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
»	»	»	
En quantité indéterminée.	»	Sua les ulcères atoniq. et scorbutiques.	
De 1 à 2 onces.	De 32 à 64 gramm.	En décoction pour lavement.	
»	»	»	
«	»	«	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
En quantité indétermin.	»	Sur les ulcères atoniq.	

DOSES. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE. Poids anc.	Poids nouv.	MODE D'ADMINISTRATION.
ARRÊTE-BOEUF. *Ononis spinosa.* Diurétiq. (1), astringent.	Entière.	De 4 gros à 1 once.	De 16 à 32 gramm.	En infusion aqueuse ou vineuse.
	Poudre.	De 36 grains à 1 gros.	De 2 à 4 gramm.	En pilules.
ARSÉNIATE DE SOUDE. *Arsenias sodæ.* Fébrifuge, stimulant, VÉNÉNEUX.	Solution (2).	1 gros de solution (contenant un 8e de grain d'arseniate).	4 grammes.	En potion, en tisane.
ARSÉNIATE DE POTASSE. *Arsenias potassæ.* Fébrifuge, stimulant, VÉNÉNEUX.	Solution (3).	*Idem.*	»	»
ARSENIC. L'arsenic métal n'est pas employé. *Voyez* Oxide d'arsenic	»	»	»	»

à 7, 1/3; de 7 à 14, 1/2; de 14 à 20, 2/3; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINISTRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
»	»	»	
»	»	»	(1) Cette plante, qui porte aussi le nom de Bugrane, faisait partie des cinq racines dites apéritives.
»	»	»	
»	»	»	(2) M. le docteur Foderé fait dissoudre 1 grain d'arséniate de soude dans 1 once d'eau distillée, et il donne 1 gros de cette solution dans un verre de tisane. L'arséniate de soude est un poison violent. *Antidotes.* Le vomissement, l'eau de chaux, l'eau chargée d'albumine.
»	»	»	(3) L'arséniate de potasse est aussi un poison. (Mêmes antidotes que pour le sel précédent.)

DOSES. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; dé

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE. Poids anc.	Poids nouv.	MODE D'ADMINISTRATION.
ARSENITE DE SOUDE. *Voy.* Solution de Fowler et de Pearson.	»	»	»	»
ASARET (Cabaret). *Asarum Europeum.* Emétique, sternutatoire.	Feuilles et racines.	De 1 à 2 gros.	De 4 à 8 gramm.	En infusion ou décoction.
	Feuilles et racines en poudre (1).	De 18 à 36 grains.	De 9 à 12 décigr.	Délayés dans l'eau.
	Extrait.	De 12 à 24 grains.	De 6 à 12 décigr.	En pilules.
ASCLÉPIADE. *Asclepias vincetoxicum.* *Voy.* Dompte-Vénin.				
ASPERGE. *Asparagus officinalis.* Diurétique.	Racine.	De 4 gros à 1 once.	De 16 à 32 gramm.	En décoction.
	Extrait.	De 36 grains à 1 gros.	De 2 à 4 gramm.	En pilules.
	Poudre.	De 36 grains à 1 gros.	De 2 à 4 gramm.	En pilules; opiat.

à 7, 1/3; de 7 à 14, 1/2; de 14 à 20, 2/3; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINISTRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
»	»	»	
»	»	»	
De 3 à 4 grains.	De 15 à 20 centigr.	Mêlée à du sucre et inspirée.	(1) Le cabaret entre dans les poudres sternutatoires composées. Cette plante a été indiquée par divers auteurs comme le meilleur des succédanés de l'ipacuécanha.
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	

Doses. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE. Poids anc.	Poids nouv.	MODE D'ADMINISTRATION.
ASPERULE ODORANTE (Muguet des bois). *Aspurala odorata.* Diurétique (1).	Entière.	De 2 à 4 gros.	De 8 à 16 gramm.	En infusion théiforme.
ASSA-FOETIDA. *Asa-fœtida.* Antispasmodique.	En substance.	De 6 à 24 grains.	De 3 à 12 décigr.	En pilules.
	Teinture alcoholique.	De 18 grains à 1 gros.	De 2 à 4 gramm.	En potion.
	Teinture éthérée.	De 18 grains à 1 gros.	De 2 à 4 gramm.	En potion.
ASTRAGALE SANS TIGE. *Astragala exscapus.* Amère et sudorifique (3).	Racine.	De 4 gros à 1 once.	De 16 à 32 gramm.	En décoction.
AUNE VULGAIRE. *Betula alnus.* Astringent et fébrifuge.	Écorce en poudre.	De 1 à 2 gros.	De 4 à 8 gramm.	Délayé dans un liquide.

à 7, 1/3; de 7 à 14, 1/2; de 14 à 20, 2/3; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINISTRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
»	»	»	
			(1) L'asperule, appelée *cynanchica*, très-employée autrefois comme astringente dans des gargarismes, n'est plus usitée.
De 1 à 2 gros.	De 4 à 8 gramm.	En lavement (2).	
De 1 à 2 gros.	De 4 à 8 gramm.	*Idem.*	(2) On amène l'assa-fœtida à l'état d'émulsion en le réduisant en poudre, et en l'incorporant aux liquides en prenant un jaune d'œuf pour intermède. On applique aussi l'assa-fœtida sous forme de topiques, et comme antispasmodique.
De 1 à 2 gros.	De 4 à 8 gramm.	*Idem.*	
»	»	»	
De 2 à 4 onces.	De 64 à 128 gram.	En décoction.	(3) Cette plante est très-usitée en Hongrie et en Allemagne comme antisyphilitique. Les Hongrois des confins de la Turquie en font usage par tradition, et comme d'un remède populaire.

Doses. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 3

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE. Poids anc.	Poids nouv.	MODE D'ADMINISTRATION.
AUNÉE. *Inula helenium.* Tonique, stimulante.	Racine entière.	De 4 gros à 1 once.	De 16 à 32 gramm.	En décoction.
	Racine en poudre.	De 18 à 36 grains.	De 1 à 2 gramm.	En pilules, opiat.
	Conserve.	De 1 à 2 gros.	De 4 à 8 gramm.	»
	Extrait.	De 18 à 36 grains.	De 1 à 2 gramm.	En pilules.
	Teinture.	De 18 à 36 grains.	De 1 à 2 gramm.	Dans les potions.
AURONE. *Artemisia abrotanum.* Tonique, emménagogue.	Feuilles.	De 1 à 2 gros.	De 4 à 8 gramm.	En infusion.
AURONE FEMELLE. *Voy.* Santoline.	»	»	»	»

à 7, 1/3; de 7 à 14, 1/2; de 14 à 20, 2/3; de 20 a 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINISTRATION.	*REMARQUES.*
Poids anc.	Poids nouv.		
De 1 à 2 onces.	De 32 à 64 gramm.	En décoction.	
De 1 à 2 gros.	De 4 à 8 gramm.	Incorporée avec de l'axonge.	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
De 2 à 4 gros.	De 8 à 16 gramm.	En lavement, en lotions.	
»	»	»	

Doses. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 3

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE. Poids anc.	Poids nouv.	MODE D'ADMINISTRATION.
AVOINE. *Avena satira.* Délayant, mucilagineuse.	Semences.	De 2 à 4 gros.	De 6 à 16 gramm.	En décoction.
AYA-PANA. *Eupatorium aya-pana.* Stimulant.	Feuilles.	De 4 à 6 gros.	De 16 à 24 gramm.	En infusion.
AZEDARACH. *Melia azedarach.*	Racine.	De 2 à 4 gros.	De 8 à 16 gramm.	En décoction.
AZEROLIER. *Cratægus azarolus.* Astringent.	Fruits confits.	De 2 à 4 onces.	De 64 à 128 gram.	»

à 7, 1/3; de 7 a 14, 1/2; de 14 à 20, 2/3; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINISTRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
De 1 à 2 onces.	De 32 à 64 gramm.	En gargarismes, en lavemens (1),	(1) Les semences d'avoine bouillies dans le vinaigre sont employées pour composer des topiques irritans.
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	

Doses. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 3

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE. Poids anc.	Poids nouv.	MODE D'ADMINISTRATION.
BADIANE. *Illicium anisatum.* Stimulant.	Semences entières.	De 1 à 2 gros.	De 4 à 8 gramm.	En infusion.
	Poudre.	De 18 à 36 grains.	De 1 à 2 gramm.	En pilules et en opiat.
	Eau distillée.	De 4 à 8 gros.	De 16 à 32 gramm.	En potion.
BAGNAUDIER. *Cotutea arborescens.* Faiblement purgatif.	Feuilles.	De 1 à 3 onces.	De 32 à 96 gramm.	En décoction, en potion.
BALLOTE NOIRE. *Ballota nigra.* Stimulant.	Feuilles.	De 1 à 2 gros.	De 4 à 8 gramm.	En infusion.
BALSAMITE SUAVE. *Balsamita suaveolens.* Stimulant, vermifuge.	Feuilles.	De 1 à 4 gros.	De 4 à 16 gramm.	*Idem.*
	Poudre.	De 18 à 36 grains.	De 1 à 2 gramm.	En pilules, en opiat.
	Eau distillée.	De 4 à 8 gros.	De 16 à 32 gramm.	En potion.

à 7, 1/3; de 7 à 14, 1/2; de 14 à 20, 2/3; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINISTRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
De 2 à 4 onces.	De 64 à 128 gram.	En lavement (1).	(1) Cette plante, qu'on trouve dans beaucoup de jardins, peut offrir une ressource utile au praticien, à défaut d'autres purgatifs qu'on peut donner sous un plus petit volume.
»	»	»	
De 4 gros à 2 onces.	De 16 à 64 gram.	En fomentation.	
»	»	»	
»	»	»	

Doses. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE. Poids anc.	Poids nouv.	MODE D'ADMINISTRATION.
BARDANE. *Arctium lappa.* Sudorifique, diurétique (1).	Racine.	De 1 à 2 onces.	De 32 à 64 gramm.	En décoction.
	Poudre.	De 36 grains à 1 gros.	De 2 à 4 gramm.	En bol, en opiat.
	Extrait.	De 36 grains à 1 gros.	De 2 à 4 gramm.	En pilules; opiat et en potion.
	Suc.	De 3 à 6 onces.	De 96 à 192 gram.	»
BARYTE. *Voy.* Hydrochlorate.	»	»	»	»
BASILIC. *Ocymum basilicum.* Stimulant, antispasmodique.	Sommités fleuries.	De 1 à 2 gros.	De 4 à 8 gramm.	En infusion.
	Poudre.	De 18 à 36 grains.	De 1 à 2 gramm.	En pilules, en opiat.
BAUME D'ACIER *ou* D'AIGUILLES. Stimulant.	»	»	»	»

à 7, 1/3; de 7 à 14, 1/2; de 14 à 20, 2/3; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINISTRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	(1) Quoi qu'en ait dit Cullen, cette plante possède une propriété diurétique très-prononcée, qui doit engager les praticiens à en faire usage. Percy regardait les feuilles de bardane comme très-efficaces dans les plaies et les ulcères invétérés; il composait une espèce de pommade avec le suc de cette plante, mêlé avec parties égales d'huile d'olive et d'amandes douces.
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
Quantité indéterminée.	»	En frictions.	

Doses. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 a 3, 1/6; de

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE		MODE D'ADMINISTRATION.
		Poids anc.	Poids nouv.	
BAUME ACÉTIQUE. Résolutif.	En substance.	»	»	»
BAUME APOPLECTIQUE. Stimulant.	*Idem.*	»	»	»
BAUME D'ARCOEUS. Stimulant.	*Idem.*	»	»	»
BAUME DU CANADA. *Balsamum Canadense.* Stimulant.	*Idem.*	De 18 grains à 1 gros.	De 1 à 4 gramm.	En bols, émulsion.
BAUME DU COMMANDEUR. Stimulant.	*Idem.*	De 10 à 36 grains.	De 5 décigr. à 2 gramm.	En potion.

à 7, 1/3; de 7 à 14, 1/2; de 14 à 20, 2/3; de 20 à 60, la dose des adultes

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINISTRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
Quantité indéterminée.	»	En frictions (1)	(1) En ajoutant du camphre, on a le baume acétique camphré.
Idem.	»	*Idem* (2).	(2) On fait quelquefois respirer ce baume, qui alors passe pour antispasmodique.
Idem.	»	Dans le pansement des plaies.	
De 4 à 5 gros.	De 16 à 20 gramm.	En lavement.	
Quantité indéterminée.	»	Dans le pansement des plaies.	

Doses. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 3

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE. Poids anc.	Poids nouv.	MODE D'ADMINISTRATION.
BAUME DE COPAHU. *Balsamum copahiba.* Stimulant (1) employé spécialement contre la blennorrhagie.	En substance.	De 18 grains à 2 gros.	De 1 à 8 gramm.	En potion.
BAUME DE FIORAVENTI. Stimulant, diurétique.	*Idem.*	De 6 à 12 grains.	De 3 à 6 décigr.	En potion.
BAUME DE GENEVIÈVE. Stimulant.	*Idem.*	»	»	»
BAUME HYPNOTIQUE. Calmant, narcotique.	*Idem.*	»	»	»
BAUME HYSTÉRIQUE. Antispasmodique.	*Idem.*	De 12 à 54 grains.	De 6 décigr. à 3 gramm.	En potion.

à 7, 1/3; de 9 à 14, 1/2; de 14 à 20, 2/3; de 20, à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINISTRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
De 2 gros à 1 once.	De 8 à 32 gramm.	En lavement.	
Quantité indéterminée.	»	En frictions (2).	(1) Quelquefois le baume de copahu agit comme vomitif; presque toujours il est purgatif. On peut solidifier ce baume pour le mettre en pilules, en mêlant seize parties de copahu avec une partie de magnésie fortement calcinée; la solidification n'a lieu qu'au bout de quelques jours.
Idem.	»	Employé dans le pansement des plaies.	(2) Il y avait autrefois, dans les officines, trois espèces de baume de fioraventi, le baume de fioraventi *spiritueux*, le baume de fioraventi *huileux*, et le baume de fioraventi *noir*. Le spiritueux est le seul employé aujourd'hui.
Idem.	»	En frictions.	
Idem.	»	*Idem.*	

DOSES. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 3

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE. Poids anc.	Poids nouv.	MODE D'ADMINISTRATION.
BAUME DE LABORDE *ou* DE FOURCROY. Calmant.	En substance.	»	»	»
BAUME DE LECTOURE, DE CONDOM *ou* DE VINCEGUERRE. Stimulant.	*Idem.*	De 2 à 12 grains.	De 1 à 6 décigr.	En bols, sur du sucre, ou en potions.
BAUME DE LUCATEL. Stimulant.	*Idem.*	De 36 grains à 2 gros.	De 2 à 8 gramm.	En bols, en émulsion.
BAUME DE LA MECQUE. Stimulant.	*Idem.*	De 18 grains à 2 gros.	De 1 à 8 gramm.	En émulsion ou en pilules.
BAUME NERVAL. Stimulant, résolutif.	*Idem.*	»	»	»
BAUME OPODELDOCH. Stimulant.	*Idem.*	»	»	»

à 7, 1/3; de 7 à 14, 1/2; de 14 à 20, 2/3; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINISTRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
Quantité indéterminée.	»	Dans le pansement des plaies, et particulièrement des gerçures du sein et de la peau.	
Idem.	»	En frictions.	
Idem.	»	Dans le pansement des plaies.	
»	»	»	
Quantité indéterminée.	»	En frictions.	
Idem.	»	*Idem.*	

Doses. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 4

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE. Poids anc.	Poids nouv.	MODE D'ADMINISTRATION.
BAUME DU PÉROU (1). Stimulant.	En substance.	De 6 à 12 grains.	De 3 à 6 décigr.	En poudre ou en tablettes.
	Sirop.	De 4 gros à 1 once.	De 16 à 32 gramm.	En potion.
BAUME DE SANCHÈS *ou* ANTI-ARTHRITIQUE.	En substance.	»	»	»
BAUME DE SOUFRE. Stimulant.	*Idem.*	De 10 à 36 grains.	De 5 décigr. à 2 gramm.	En émulsion, en potion.
BAUME DE SOUFRE ANISÉ. Stimulant.	*Idem.*	De 12 à 24 grains.	De 6 à 12 décigr.	*Idem.*
BAUME DE SOUFRE JUNIPÉRINÉ. Stimulant.	*Idem.*	De 12 à 24 grains.	De 6 à 12 décigr.	*Idem.*
BAUME DE SOUFRE SUCCINÉ Stimulant.	*Idem.*	De 12 à 24 grains.	De 6 à 12 décigr	*Idem.*

à 7, 1/3; de 7 à 14, 1/2; de 14 à 20, 2/3; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINISTRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
»	»	»	
»	»	»	(1) On connaît trois variétés de baume du Pérou, 1° le blanc, qui est liquide et transparent; 2° le roux, qui est solide *; 3° le noir, qui est beaucoup plus commun que les deux autres. Il est liquide et de consistance sirupeuse.
Quantité indéterminée.	»	En frictions.	
Idem.	»	Pour modifier et faire cicatriser les ulcères atoniques.	
»	»	»	* Ces deux variétés sont encore appelées *baume en coques*, parce qu'elles nous arrivent dans les fruits du calebassier.
»	»	»	
»	«	«	

Doses. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 3

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE. Poids anc.	Poids nouv.	MODE D'ADMINISTRATION.
BAUME DE SOUFRE TÉRÉBENTHINÉ. Stimulant.	En substance.	De 12 à 24 grains.	De 6 à 12 décigr.	En émulsion, en potion.
BAUME DE TOLU. *Balsamum Tolutanum.* Excitant.	En substance.	De 6 à 12 grains.	De 3 à 6 décigr.	En poudre ou en tablettes.
	Sirop.	De 4 gros à 1 once.	De 16 à 32 gramm.	En potion, dans des tisanes, ou par cuillerées.
	Teinture.	De 36 grains à 2 gros.	De 2 à 8 gramm.	En potion.
BAUME TRANQUILLE. Calmant, narcotique.	En substance.	»	»	»
BAUME VERT DE METZ *ou* DE FEUILLET. Stimulant, catherétique.	*Idem.*	»	»	»
BAUME DE VIE D'HOFFMANN. Stimulant.	*Idem.*	De 18 à 36 grains.	De 1 à 2 gramm.	En potions.

à 7, 1/3; de 7 à 14, 1/2; de 14 à 20, 2/3; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINISTRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
Quantité indéterminée.	»	En frictions.	
Quantité indéterminée.	»	Dans le pansement des plaies et des ulcères atoniques.	
Idem.	»	En frictions.	

Doses. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 33

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE. Poids anc.	Poids nouv.	MODE D'ADMINISTRATION.
Baume de vie de Lelièvre *Voy.* Élixir de longue vie.	»	»	»	»
Beccabunga. *Voy.* Véronique.	»	»	»	»
Belladone. *Atropa belladona.* Antispasmodique, narcotique. Vénéneux (1).	Feuilles et racines en poudre.	De 1/2 grain à 2 grains.	De 3 à 10 centigr.	En substance mêlée avec du sucre, en pilules,
	Feuilles et racines entières.	»	»	En potion.
	Extrait.	De 1 à 5 grains.	De 5 à 25 centigr.	En pilules.
	Sirop.	De 4 à 8 gros.	De 16 à 32 gramm.	En potion.
	Teinture.	De 1 à 6 grains.	De 1 à 3 décigr.	*Idem.*

à 7, 1/3; de 7 à 14, 1/2; de 14 à 20, 2/3; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINISTRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
De 8 à 16 onces.	De 250 à 500 gram.	En bain local.	
De 1 à 2 gros.	De 4 à 8 gramm.	En pommade.	(1) La belladone est une plante très-active dont il faut surveiller l'administration. A très-petite dose, elle cause souvent une cécité momentanée plus ou moins complète qui n'a aucun danger. Dix grains d'extrait de belladone donnés en lavement ont produit un empoisonnement. *Antidotes*. Les vomitifs, purgatifs, les boissons acidulées, la saignée.
»	»	»	
Quantité indéterminée.	»	En application extérieure.	

Doses. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6;

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE. Poids anc.	Poids nouv.	MODE D'ADMINISTRATIO
BENJOIN. *Balsamum benzoë.* Stimulant.	En substance.	De 6 à 12 grains.	De 3 à 6 décigr.	En pilu en pasti en opia
	Sirop.	De 4 à 8 gros.	De 16 à 32 gramm.	En potio en tisan
	Teinture.	De 36 grains à 2 gros.	De 2 à 8 grammes.	En potio
BENOITE. *Geum urbanum* et *Geum rivale* (Benoite commune et aquatique). Tonique et fébrifuge (3).	Racine en substance.	De 4 à 8 gros.	De 16 à 32 gramm.	En infu aqueuse macérati vineuse.
	Poudre.	De 1 à 3 gros.	De 4 à 12 gramm.	En bol, opiat, ou layée.
	Teinture.	De 2 à 4 gros.	De 8 à 16 gramm.	En potio
BERBERIS. *Voy.* Épine-Vinette.	»	»	»	»
BERLE. *Sium angustifolium.* Antiscorbutique, diurétique.	Suc.	De 2 à 4 onces.	De 64 à 128 gram.	»

à 7, 1/3 ; de 7 à 14, 1/2 ; de 14 à 20, 2/3 ; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINISTRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
Quantité indéterminée.	»	En fumigation (1).	
»	»	Étendu d'eau	(1) On en jette quelques pincées sur des charbons ardens.
De 2 à 4 gros.	De 8 à 16 gramm.	Pour lotions (2).	
De 1 à 2 onces.	De 32 à 64 gramm,	En lavement, gargarisme, fomentation.	(2) La teinture de benjoin fait la base de la préparation appelée *lait virginal*.
»	»	»	
De 4 à 8 gros.	De 16 à 32 gramm.	En lavement.	(3) On a proposé la benoite comme succédanée du quinquina ; des praticiens ont donné la macération vineuse et la teinture de cette plante un peu avant l'accès des fièvres intermittentes.
»	»	»	
»	»	»	

Doses. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; dès

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE. Poids anc.	Poids nouv.	MODES D'ADMINISTRATIONS.
BÉTOINE OFFICINALE. *Betonica officinalis.* Sternutatoire (1).	Feuilles en poudre.	»	»	»
BEURRE D'ANTIMOINE. *Voy.* Chlorure d'antim.	»	»	»	»
BEURRE DE CACAO. *Butyrum è cacao.* Adoucissant.	En substance.	De 1 à 2 gros.	De 4 à 8 gramm.	En pastilles, potion.
BEURRE DE MUSCADES. *Voy.* Muscades.	»	»	»	»
BIÈRE ANTISCORBUTIQUE. (Bière sapinette) *Cerevisia antiscorbutica.* Antiscorbutique.	»	De 8 onces à 1 livre.	De 250 à 500 gram.	En boisson.

à 7, 1/3; de 7 à 14, 1/2; de 14 à 20, 2/3; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINISTRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
Quantité indéterminée.	»	Comme sternutatoire.	
»	»	»	(1) Autrefois, on a employé la racine de bétoine comme émétique et purgative; mais on l'a abandonnée à cause de l'incertitude de son action.
Quantité indéterminée.	»	En pommade, liniment et en suppositoire (2).	
»	«	»	(2) C'est le beurre de cacao qui fait la base d'une fameuse pommade connue sous le nom de pommade *Mexicaine*.
»	»	»	

Doses. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 3

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE. Poids anc.	Poids nouv.	MODE D'ADMINISTRATION.
BIÈRE DE QUINQUINA. *Cerevisia de kinakinâ.* Tonique, apéritif.	»	De 4 à 8 onces.	De 125 à 250 gram.	En 2 fois.
BISMUTH. *Bismuthum.* Antispamodique, anti-émétique (1).	Le sous-nitrate.	De 2 à 24 grains.	De 1 à 12 décigr.	En pilules ou en poudre, 2 à 3 fois le jour.
BISTORTE. *Polygonum bistorta.* Astringent, tonique.	Racine.	De 2 gros à 1 once.	De 8 à 32 gramm.	En décoction.
	Poudre.	De 1 à 3 gros.	De 4 à 12 gramm.	En pilules, en opiat, ou délayée.
	Extrait.	De 18 à 36 grains.	De 1 à 2 gramm.	En pilules.
BLANC DE BALEINE. *Sperma ceti.* Émollient, adoucissant.	En substance.	De 1 à 2 gros.	De 4 à 8 gramm.	Dans les loochs, potions.

à 7, 1/3 ; de 7 à 14, 1/2 ; de 14 à 20, 2/3 ; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINISTRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
Quantité indéterminée.	»	En lotion, dans le pansement des ulcères atoniques.	
»	»	»	(1) Ce médicament, même à haute dose, ne détermine point d'accidens comme on l'a prétendu, et n'est point vénéneux, comme cela a été également avancé.
De 4 gros à 2 onces.	De 16 à 64 gramm.	En injection, gargarisme, lotion.	
Quantité indéterminée.	»	Pour saupoudrer les vieux ulcères	
»	»	»	
De 2 à 4 gros.	De 8 à 16 gramm.	En pommade.	

Doses. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINISTRATION.
		Poids anc.	Poids nouv.	
Blanc d'oeuf. *Albumen.* Contrepoison du sublimé corosif.	En substance.	De 2 à 3 onces.	De 64 à 96 gramm.	Délayée dans l'eau (1).
Blanc rhasis (Blanc raisin.) *Voy.* Onguent rhasis.	»	»	»	»
Bleuet (Barbeau). *Centaurea cyanus.*	Eau distillée des fleurs.	»	»	»
Bois de campêche. *Hematoxylum campechianum.* Astringent.	Extrait.	De 18 grains à 1 gros.	De 1 à 4 gramm.	En pilules, potion.
Bois sudorifiques (3).	En substance.	2 onces.	64 gramm.	En décoction.

à 7, 1/3; de 7 à 14, 1/2; de 14 à 20, 2/3; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINISTRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
»	»	»	(1) Les blancs d'œufs étant inoffensifs, on peut sans inconvénient en mêler à l'eau une quantité plus ou moins grande.
»	»	»	(2) L'eau distillée de bleuet était jadis appelée *eau de casse-lunettes*, tant on la croyait efficace contre les ophtalmies.
En quantité indéterminée.	»	En collyre (2).	(3) On entend par cette dénomination le melange fait à parties égales de *gayac*, de *salsepareille*, de *squine* et de *sassafras*. On emploie encore quelquefois ces substances réunies; mais comme elles contiennent des principes très-différens sur lesquels l'eau agit diversement, il en résulte une préparation sur laquelle on doit peu compter. Il est donc préférable de les administrer isolément.
»	»	»	
»	»	»	

Doses. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 33

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE. Poids anc.	Poids nouv.	MODE D'ADMINISTRATION.
Bol d'Arménie. *Bolus Armeniæ.* Astringent.	En poudre.	De 1 à 2 gros.	De 4 à 8 gramm.	En poudre, en pilules, en opiat, etc.
Bolet amadouvier. *Voy.* Agaric.	»	»	»	»
Borate de soude. *Boras sodæ.* Excitant.	En substance.	De 12 grains à 1 gros.	De 6 décigr. à 4 gramm.	En potion.
Botrys. *Chenopodium botrys.* Excitant, antihystérique.	Feuilles.	De 2 à 4 gros.	De 8 à 16 gramm.	En infusion théiforme.
	Eau distillée.	De 2 à 3 onces.	De 64 à 96 gramm.	En potion.
Bouillon blanc. *Verbascum thapsus.* Émollient.	Feuilles.	»	»	»
	Fleurs.	De 2 à 4 gros.	De 8 à 16 gramm.	En infusion.
Boules de Mars. *Voy.* Tartrate de fer.	»	»	»	»

à 7, 1/3 ; à de 7 à 14, 1/2 ; de 14 à 20, 2/3 ; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINISTRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
Quantité indéterminée.	»	Pour saupoudrer les vieux ulcères	
»	»	»	
De 1 à 2 gros.	De 4 à 8 gramm.	En collutoire, en gargarisme, en lotion (1).	(1) Pour les lotions, on dissout une partie de borax dans 16 parties d'eau de roses. Huffeland conseille cette dissolution contre les dartres farineuses.
»	»	»	
»	»	»	
Quantité indéterminée.	»	En cataplasme, décoct. et lavement.	
»	»	»	
»	»	»	

Doses. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes) ; de 1 à 3, 1/6; de 3

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE. Poids anc.	Poids nouv.	MODE D'ADMINISTRATION.
Bourrache. *Borrago officinalis.* Diurétique (1).	Feuilles.	De 2 à 4 gros.	De 8 à 16 gramm.	En infusion et en décoction.
	Fleurs.	De 1 à 2 gros.	De 4 à 8 gramm.	En infusion.
	Conserve de fleurs.	De 1 à 2 gros.	De 4 à 8 gramm.	»
	Eau distillée.	De 2 à 3 onces.	De 64 à 96 gramm.	Dans les potions.
	Extrait.	De 1/2 gros à 1 gros.	De 2 à 4 gramm.	En pilules, potion.
	Poudre.	De 1/2 gros à 1 gros.	De 2 à 4 gramm.	En pilules.
	Sirop.	De 1 à 2 onces.	De 32 à 64 gramm.	Dans les potions.
	Suc.	De 4 à 6 onces.	De 128 à 192 gram.	En substance.
Brou de noix. (Ecorce verte de la noix.) Astringent (2).	L'extrait.	De 36 grains à 1 gros.	De 2 à 4 gramm.	En pilules.

à 7, 1/3; de 7 à 14, 1/2; de 14 à 20, 2/3; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINISTRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	(1) La bourrache, qu'on emploie de temps immémorial comme sudorifique, jouit d'une propriété diurétique plus certaine, à raison du nitrate de potasse qu'elle contient.
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
De 1 à 2 gros.	De 4 à 8 gramm.	En gargarisme.	(2) La décoction et le suc de brou de noix, ont été employés comme antisyphilitiques. Fischer ordonnait, comme vermifuge, 2 gros d'extrait dissous dans une 1/2 once d'eau de cannelle; il administrait ce mélange à la dose de 20 à 50 gouttes, selon l'âge des enfans.

Doses. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE. Poids anc.	Poids nouv.	MODE D'ADMINISTRATION.
Brucine (1). Stimulant. Vénéneuse.	En substance.	De 1/2 grain à 2 grains.	De 2 à 10 centigr.	En pilules ou en solution.
	Alcool.	De 6 à 24 gouttes.	»	En potion.
Bryone. *Bryonia alba.* Purgatif, rubéfiant. Vénéneuse à haute dose.	Entière.	De 1 à 2 gros.	De 4 à 8 gramm.	En infusion aqueuse et vineuse.
	En poudre.	De 18 à 36 grains.	De 1 à 2 gramm.	En pilules ... opiat.
Buglosse. *Anchusa officinalis.* Légèrement diurétique.	Feuilles.	De 2 à 4 gros.	De 8 à 16 gramm.	En infusion et décoction.
	Eau distillée.	De 2 à 3 onces.	De 64 à 96 gramm.	Dans les potions.
	Extrait.	De 36 grains à 1 gros.	De 2 à 4 gramm.	En pilules.
	Sirop.	De 1 à 2 onces.	De 32 à 64 gramm.	Dans les potions.
	Suc.	De 4 à 6 onces.	De 128 à 192 gram.	»

à 7, 1/3; de 7 à 14, 1/2; de 14 à 20, 2/3; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINISTRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
»	»	»	(1) On ne doit employer la brucine comme médicament, que lorsqu''elle a été extraite de l'écorce de fausse angusture, par la raison que celle qu'on retire de la noix vomique pourrait contenir une certaine quantité de strychnine. Lorsqu'on administre la brucine, on doit commencer par des doses minimes, et aller successivement en augmentant avec une extrême circonspection.
»	»	»	
En quantité indéterminée.	»	En cataplasme rubéfiant et stimulant.	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	

Doses. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE. Poids anc.	Poids nouv.	MODE D'ADMINISTRATION.
BUGRANE. *Voy.* Arrête-Bœuf.	»	»	»	»
BUIS. *Buxus semper virens.* Purgatif et sudorifique.	Bois et racine râpés.	De 1 à 2 onces.	De 32 à 64 gramm.	En infusion aqueuse ou vineuse.
	Feuilles.	De 36 grains à 1 gros.	De 2 à 4 gramm.	Purgatif.

à 7, 1/3 ; de 7 à 14, 1/2 ; de 14 à 20, 2/3 ; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINISTRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	

DOSES. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 3

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE. Poids anc.	Poids nouv.	MODE D'ADMINISTRATION.
CABARET. *Voy.* Azaret.	»	»	»	»
CACAO. *Theobroma cacao* (1). Analeptique.	Écorce de l'amande.	De 2 gros à 1 once.	De 8 à 32 gramm.	En infusion.
CACHOU. *Catechu.* Astringent, tonique (2).	En substance.	De 36 grains à 2 gros.	De 2 à 8 gramm.	En décoction.
	Poudre.	De 18 à 36 grains.	De 1 à 2 gramm.	En pilules, en pastilles, en pâte, en opiat.
	Teinture.	De 18 grains à 1 gros.	De 1 à 4 gramm.	En potion, en tisane,
CACIS. *Ribes nigrum.* Aromatique, styptique.	Feuilles.	De 2 à 4 gros.	De 8 à 16 gramm.	En infusion.
	Rob des baies.	De 1 à 4 gros.	De 4 à 16 gramm.	En potion, en tisane, en opiat.
	Sirop des baies.	De 1 à 2 onces.	De 32 à 64 gramm.	En potion, en tisane.

à 7, 1/3; de 7 à 14, 1/2; de 14 à 20, 2/3; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINISTRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
»	»	»	
»	»	»	(1) Le principe huileux que renferme l'amande du cacao, est connu sous le nom de beurre de cacao. *Voy.* ce mot. L'amande entière ne sert qu'à préparer le chocolat employé comme aliment.
De 1 à 4 gros.	De 4 à 16 gramm.	En gargarisme, collutoire, lavement, injection.	
»	»		(2) On fait avec le cachou, associé à la cannelle et au baume du Pérou, une teinture très-agréable, que l'on emploie beaucoup dans les affections scorbutiques de la bouche. Les pastilles dites *de cachou* sont composées d'ambre, de gomme adragante et de cachou.
e 36 grains à 2 gros.	De 2 à 8 gramm.	En gargar., collutoire, lavem., en injection.	
De 1 à 2 onces.	De 32 à 64 gramm.	En lotion.	
»	»	»	
»	»	»	

Doses. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; d'

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE. Poids anc.	Poids nouv.	MODE D'ADMINISTRATION
CAFÉ. *Coffea arabica.* Stimulant, aromatique, fébrifuge (1).	Semences non torréfiées.	De 1 à 2 onces.	De 32 à 64 gramm.	En décoction
	Poudre.	De 18 à 54 grains.	De 1 à 3 gram.	En opiat, délayé dans l'eau (tout les 3 heures)
	Extrait.	De 10 à 36 grains.	De 5 à 18 décigr.	En pilules en opiat, potion.
	Semences torréfiées et pulvérisées.	De 2 à 4 onces.	De 64 à 128 gram.	En infusion
CAILLELAIT. *Gallium luteum.* Sudorifique.	Sommités fleuries.	De 1 à 2 onces.	De 32 à 64 gramm.	*Idem.*
	Suc.	De 3 à 6 onces.	De 96 à 192 gram.	En substance
CAJEPUT. *Voy.* Huile de cajeput.	»	»	»	»
CALAGUALA. *Polypodium calaguala.* Anti-syphilitique, sudorifique.	Racine entière.	De 2 gros à 1 once.	De 8 à 32 gramm	En décoction
	Poudre.	De 36 grains à 1 gros.	De 2 à 4 gramm.	En bols, opiat.

à 7, 1/3 ; de 7 à 14, 1/2 ; de 14 à 20, 2/3 ; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINISTRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
»	»	»	
»	»	»	(1) Le docteur *Amati* a conseillé les vapeurs de café torréfié dans les ophtalmies chroniques, concurremment avec la décoction de café crû en lotions.
»	»	»	C'est *Grindel* qui a recommandé le café non torréfié comme succédané du quinquina. Il le faisait macérer, puis sécher au four sans le torréfier, avant de le réduire en poudre ; il faisait bouillir 1 once de café dans 18 onces d'eau, et réduire à 6 onces. Peu de fièvres intermittentes ont résisté soit à la décoction, soit à l'extrait de café non torréfié.
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	

Doses. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes) ; de 1 à 3, 1/6 ; de

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE. Poids anc.	Poids nouv.	MODE D'ADMINISTRATION.
CALAMENT. *Voy.* Mélisse.	»	»	»	»
CALAMUS AROMATICUS. *Voy.* Roseau aromatique.	»	»	»	»
CALEBASSIER. *Crescentia cujete.* Expectorant.	Sirop du fruit.	De 2 à 4 onces.	De 64 à 128 gram.	En potion en tisane.
CALOMÉLAS. *Voy.* Chlorure de mercure.	»	»	»	»
CAMÉLÉE. *Cneorum tricoccon.* Drastique, rubéfiant. VÉNÉNEUX (1).	Feuilles.	»	»	»
	Extrait préparé avec le suc.	De 2 à 4 grains.	De 1 à 2 décigr.	En pilules en potion en opiat, ou pulvérisée avec du sucre.

à 7, 1/3 ; de 7 à 14, 1/2 ; de 14 à 20, 2/3 ; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINISTRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
Quantité indéterminée	»	Écrasées et appliquées comme rubéfiant.	*Antidotes.* Les mêmes que pour les plantes âcres.
»	»	»	

Doses. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE. Poids anc.	Poids nouv.	MODE D'ADMINISTRATION.
CAMOMILLE COMMUNE. *Voyez* Matricaire camomille.	»	»	»	»
CAMOMILLE DES CHAMPS. *Anthemis arvensis.* Aromatique amer, stimulant.	Fleurs.	De 2 à 4 gros.	De 8 à 16 gramm.	En infusion
CAMOMILLE PUANTE. *Anthemis cotula.* Anti-spasmodique, stimulant.	*Idem.*	De 1 à 2 gros.	De 4 à 8 gramm.	*Idem.*

à 7, 1/3; de 7 à 14, 1/2; de 14 à 20, 2/3; de 20 à 60, le dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINISTRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
»	»	»	
De 4 gros à 1 once.	De 16 à 32 gramm.	En lavement, en embrocation.	
De 2 à 4 gros.	De 8 à 16 gramm.	*Idem.*	

DOSES. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes) ; de 1 à 3, 1/6 ; de

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE. Poids anc.	Poids nouv.	MODE D'ADMINISTRATION.
CAMOMILLE ROMAINE. *Anthemis nobilis.* Amer, aromatique, fébrifuge (1).	Fleurs.	De 1 à 2 gros.	De 4 à 8 gramm.	En infusion
	Poudre.	De 18 grains à 1 gros.	De 1 à 4 gramm.	En bol, en opiat, ou délayée dans l'eau.
	Eau distillée.	De 1 à 2 onces.	De 32 à 64 gramm.	En potion.
	Extrait.	De 10 à 36 grains.	De 5 à 18 décigr.	En pilules ; en opiat, en potion.
	Huile essentielle.	De 2 à 6 grains.	De 1 à 3 décigr.	En opiat, ou sur du sucre.
	Huile par macération.	»	»	»
CAMOMILLE DES TEINTURIERS. *Anthemis tinctoria.* Amer, aromatique, stimulant.	Fleurs.	De 2 à 4 gros.	De 8 à 16 gramm.	En infusion

à 7, 1/3 ; de 7 à 14, 1/2 ; de 14 à 20, 2/3 ; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINISTRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
De 2 à 4 gros.	De 8 à 16 gramm.	En lavement, en embrocation.	
»	»	»	
»	»	»	(1) On confond souvent la *Matricaire*, appelée *Camomille commune*, avec la *Camomille romaine*; et on emploie plus souvent, mais à tort, la première que la seconde, qui est beaucoup plus active. Chaumeton assure avoir guéri des fièvres intermittentes avec l'infusion vineuse de camomille romaine ; le même auteur, et *Peyrilhe*, ont employé avec succès, dans le même cas, la camomille puante (*cotula*), qui est très-commune et aussi active que la précédente.
»	»	»	
De 18 grains à 1 gros.	De 1 à 4 gramm.	En liniment.	
De 1 à 2 onces.	De 32 à 64 gramm.	*Idem.*	
De 4 gros à 1 once.	De 16 à 32 gramm.	En lavement, en embrocation.	

DOSES. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de :

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE. Poids anc	Poids nouv.	MODE D'ADMINISTRATION.
CAMPANULE GANTELÉE. *Campanulæ trachelium.* Astringent.	Feuilles.	»	»	»
CAMPHRE. *Camphora.* Antispasmodique et stimulant diffusible, réputé anti-aphrodisiaque. VÉNÉNEUX (1).	En substance.	De 3 à 15 grains.	De 15 à 75 centig.	En pilules en potion en opiat, en poudre. Dans le cour rant de journée toutes les ou 3 heure
CAMPHRÉE DE MONTPELLIER. *Camphorosma Monspeliaca.* Anti-spasmodique, stimulant.	Herbe.	De 1 à 2 onces.	De 32 à 64 gramm.	En infusio

à 7, 1/3; de 7 à 14, 1/2; de 14 à 20, 2/3; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINISTRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
De 4 gros a 1 once.	De 16 à 32 gramm.	En gargarisme.	(1) Outre le camphre qui provient du *laurus camphora* et d'un autre arbre peu connu qui croît à Sumatra, à Bornéo, etc., suivant Proust, le camphre existe dans les huiles essentielles de plusieurs plantes indigènes de la famille des labiées, comme la sauge, le romarin, la lavande, le thym et la marjolaine. Ces huiles fournissent les unes un 16e, les autres un 9e, les autres un 7e, les autres 1/4 de leur poids de camphre. On connaît sous le nom de *camphre artificiel* un composé qui résulte de l'union du gaz acide hydrochlorique et de l'essence de térébenthine. Ce produit mériterait d'être examiné. *Antidotes.* Vomitifs, potions mucilagineuses avec l'éther, l'essence de térébenthine.
De 18 grains à 1 gros. Dissous dans l'huile, l'éther, l'alcool ou le jaune d'œuf.	De 1 à 4 gramm.	En collyre, en gargarisme, en lavement, en embrocation, en pommade, en liniment. Ajouté aux vésicatoires, pour atténuer l'effet des cantharides.	
»	»	»	

Doses. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 3

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE. Poids anc.	Poids nouv.	MODE D'ADMINISTRATION.
CANNE DE PROVENCE. *Arundo donax.* Diaphorétique, réputé anti-laiteux.	Racine.	De 2 gros à 1 once.	De 8 à 32 gramm.	En décoction.
CANNELLE (Écorce de). *Cortex cinamomi.* Excitant, tonique (1).	Entière.	De 1 à 2 gros.	De 4 à 8 gramm.	En infusion dans l'eau ou le vin.
	Po udre	De 12 à 36 grains.	De 6 à 18 décigr.	En opiat, pilules; ou associé au quinquina, etc.
	Eau distillée.	De 4 gros à 2 onces.	De 16 à 64 gramm.	Dans les potions.
	Huile volatile.	»	»	»
	Sirop.	De 1 à 2 onces.	De 32 à 64 gramm.	Dans les potions.
	Teinture.	De 2 à 4 gros.	De 8 à 16 gramm.	*Idem.*

à 7, 1/3 ; de 7 à 14, 1/2 ; de 14 à 20, 2/3 ; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINISTRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	(1) La cannelle de Ceylan est celle qui doit entrer dans la préparation des médicamens, la cannelle de Chine ayant une odeur désagréable analogue à celle de la punaise. On doit aussi rejeter le produit connu sous le nom de *cannelle mate*, qui est l'écorce du tronc de l'arbre ; elle a peu d'odeur et de saveur.
En quantité indéterminée	»	Pour cautériser les nerfs dentaires.	
»	»	»	
»	»	»	

Doses. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes) ; de 1 à 3, 1/6 ; dé

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE. Poids anc.	Poids nouv.	MODE D'ADMINISTRATIONS.
CANNELLE BLANCHE (Écorce de). *Cannella alba.*	Écorce concassée.	De 1 à 2 gros.	De 4 à 8 gramm.	En infusioo
Excitant, tonique.	Poudre.	De 10 à 24 grains	De 5 à 12 décigr.	En pilules co en opiat.
CANTHARIDES. *Meloe vesicatorius L.*	Poudre.	De 1 à 2 grains.	De 5 centigr. à 1 décigr.	En pilules dans des émulsions
Stimulant, épispatique, excitant particulier des organes génitaux et urinaires. VÉNÉNEUX (1).	Teinture.	De 10 à 20 gouttes.	»	En potion
	Huile par macération.	»	»	»
CAPILLAIRE DU CANADA. *Adianthum pedatum.*	Entier.	De 2 à 4 gros.	De 8 à 16 gramm.	En infusion
Mucilagineux, pectoral.	Sirop.	De 1 à 3 onces.	De 32 à 96 gramm.	Dans les potions, tisanes.

à 7, 1/3 ; de 7 à 14, 1/2 ; de 14 à 20, 2/3 ; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINISTRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
»	»	»	
»	»	»	(1) Le principe vésicant de la cantharide, séparé par M. Robiquet, a été appelé *cantharidine*. M. Orfila a aussi découvert dans la cantharide un principe volatil huileux qui est très-actif. L'usage intérieur des cantharides a été préconisé dans une foule de maladies, comme la rage, l'épilepsie, les paralysies, principalement celle de la vessie. Ce médicament faisait la base de la poudre *anti-épileptique* de *Mercurialis*. La *teinture* est la préparation qu'on doit employer le plus souvent, attendu que l'alcool affaiblit un peu l'activité corrosive du médicament.
A doses variables.	»	Dans les onguens, les pommades, les linimens	
De 18 à 36 grains.	De 1 à 2 gramm.	Dans les linimens, en frictions.	
De 1 à 2 gros.	De 4 à 8 gramm.	En linimens	
»	»	»	
»	»	»	*Antidotes*. Boissons et lavemens mucilagineux, émulsion, lait, huiles fixes, saignées.

Doses. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE. Poids anc.	Poids nouv.	MODE D'ADMINISTRATION.
Capillaire de Montpellier. *Adianthum capillus Veneris* Mucilagineux, pectoral.	Entier.	De 2 à 4 gros.	De 8 à 16 gramm.	En infusion
	Sirop.	De 1 à 3 onces.	De 32 à 96 gramm.	Dans les potions et tisanes.
Caprier. *Capparis spinosa.* Tonique, excitant.	Écorce.	De 1 à 2 onces.	De 32 à 64 gramm.	En infusion aqueuse ou vineuse.
	Poudre.	De 36 grains à 1 gros.	De 2 à 4 gramm.	En pilules, opiat, etc.
Carbonate d'ammoniaque (Sous-) *Sub-carbonas ammoniæ.* (Sel volatil d'Angleterre.) Stimulant, regardé comme anti-syphilitique (1).	En substance.	De 10 à 36 grains.	De 5 décigr. à 2 gramm.	Dans les tisanes.

à 7, 1/3; de 7 à 14, 1/2; de 14 à 20, 2/3; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINISTRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	(1) Le carbonate d'ammoniaque fait la base du *remède anti-syphilitique* proposé et vanté par Peyrilhe, et donné sous forme sirupeuse. On l'a aussi administré dans le croup intérieurement et extérieurement, comme propre à dissoudre la fausse membrane. C'est encore ce sel qui fait la base du sirop végétal de *Velnos*.
1 gros dans 2 onces de cérat.	4 gramm.	En pommade.	
En quantité indéterminée.	»	Pour faire respirer et aussi pour déterminer la rubéfaction et la vésication.	

Doses. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; d

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE. Poids anc.	Poids nouv.	MODE D'ADMINISTRATIONS.
CARBONATE DE CHAUX (Sous-). *Creta preparata.* Absorbant.	Poudre.	De 1 à 2 gros.	De 4 à 8 gramm.	Délayé dans l'eau.
CARBONATE DE CUIVRE (Sous-). *Sub-carbonas cupri.* Vert de gris, caustique. VÉNÉNEUX (1).	*Idem*,	De 1 à 2 grains.	De 5 à 10 centigr.	En pilules
CARBONATE DE FER (Sous-). *Sub-carbonas feri.* Tonique, astringent.	*Idem.*	De 12 à 24 grains.	De 6 à 12 décigr.	En pilules opiat; associé à la poudre de quinquina, de cannelle, de rhubarbe.
CARBONATE DE MAGNÉSIE (Sous-). *Sub-carbonas magnesiæ.* Absorbant.	*Idem.*	De 18 à 36 grains.	De 1 à 2 gramm.	Comme absorbant.
	Idem.	De 1 à 2 gros.	De 4 à 8 gramm.	Comme purgatif.

à 7, 1/3 ; de 7 à 14, 1/2 ; de 14 à 20, 2/3 ; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINISTRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
»	»	»	
»	»	Il entre dans le collyre de Lanfranc, l'onguent égyptiac, le baume vert de Metz, etc.	(1) On a employé quelquefois le carbonate de cuivre dans les affections cancéreuses ; mais on l'a abandonné à raison de ses propriétés vénéneuses.
»	»	»	*Antidotes.* Vomitifs, purgatifs, adoucissans. MM. Chevallier et Payen proposent la limaille de fer suspendue dans l'eau.
»	»	»	
»	»	»	

Doses. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; dee

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE. Poids anc.	Poids nouv.	MODE D'ADMINISTRATION.
CARBONATE DE MAGNÉSIE (Bi-). *Carbonas magnesiæ.* Absorbant, laxatif.	En substance.	De 1 à 2 gros.	De 4 à 8 gramm.	Dissous dan 8 onc. d'eau Il entre dan les eaux mm gnésienne gazeuses.
CARBONATE DE PLOMB (Sous-). *Sub-carbonas plumbi.* Astringent. VÉNÉNEUX (1).	»	»	»	»
CARBONATE DE POTASSE (Sous-). *Sub-carbonas potassæ.* Excitant, proposé pour dissoudre les calculs de la vessie. VÉNÉNEUX et caustique lorsqu'il est administré à haute dose (2).	En substance.	De 18 grains à 1 gros.	De 2 à 4 gramm.	Dans 10 o ces de l quide.

à 7, 1/3; de 7 à 14, 1/2; de 14 à 20, 2/3; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINISTRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
»	»	»	
»	»	Il entre dans des cérats; il fait la base de l'onguent blanc-rhasis.	
De 1 à 2 onces.	De 32 à 64 gramm.	En pédiluve, en lotion.	(1) *Antidotes.* Vomitifs, eau chargée de sulfate de soude et de magnésie; le traitement de *la Charité*, l'eau sulfureuse en bains. (2) *Antidotes.* Les huiles d'olives, d'amandes; les acides sulfurique, tartrique, citrique, acétique, étendus d'eau de manière à former une solution acidulée agréable.

DOSES. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 3

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE. Poids anc.	Poids nouv.	MODE D'ADMINISTRATION.
CARBONATE DE POTASSE (Bi-). *Carbonas potassæ.* Proposé pour dissoudre les calculs de la vessie.	En substance.	De 18 grains à 1 gros.	De 1 à 4 gramm.	Dissous dans l'eau, dans les potions (1).
CARBONATE DE SOUDE (Sous-). *Sub-carbonas sodæ.* Mêmes propriétés et même usage que les précédens. VÉNÉNEUX à haute dose (2).	*Idem.*	De 18 grains à 1 gros.	De 1 à 4 gramm.	En dissolution dans onces de quide.
CARBONATE DE SOUDE (Bi-). *Carbonas sodæ.* Mêmes propriétés que le bi-carbonate de potasse.	*Idem.*	De 18 grains à 2 gros.	De 1 à 4 gramm.	En pastilles pilules potion.

à 7, 1/3; de 7 à 14, 1/2; de 14 à 20, 2/3; de 20 à 60, la dose d s adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINISTRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
»	»	»	
De 1 à 2 onces.	De 32 à 64 gramm.	En pédiluve et lotion.	(1) Ce sel entre dans la potion de Rivière, où il se trouve décomposé par l'acide du citron, lequel met à nu l'acide carbonique qui se dégage dans les premières voies.
»	»	»	(2) Les antidotes du carbonate de soude sont les même que ceux prescrits pour le sous-carbonate de potasse.

Doses. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 3

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE. Poids anc.	Poids nouv.	MODE D'ADMINISTRATION.
CARBONATE DE ZINC. *Carbonas zinci.* Anthelmintique et antispasmodique.	En substance.	De 8 à 10 grains.	De 4 à 5 décigr.	En pilules.
CARDAMINE. *Cardamine pratensis.* Antiscorbutique.	Feuilles.	De 4 gros à 1 once.	De 16 à 32 gramm.	En infusion.
	Poudre.	De 24 grains à 1 gros.	De 12 décigr. à 4 gramm.	En pilules.
CARDAMOME (Fruit). *Amomum cardamomum.* Stimulant (1).	Poudre.	De 18 à 36 grains.	De 1 à 2 gramm	En pilules en opiat.
	Huile essentielle.	De 6 à 12 gouttes.	»	Comme aromate dans les potions.
	Teinture.	De 15 à 30 gouttes.	»	En potion.
CARLINE. *Carlina acaulis.* Diurétique (2).	Racine.	De 4 gros à 2 onces.	De 16 à 64 gramm.	En décoction.
	Poudre.	De 1 à 2 gros.	De 4 à 8 gramm.	En pilules.

à 7, 1/3; de 7 à 14, 1/2; de 14 à 20, 2/3; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINISTRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	(1) Les autres cardamomes jouissent des mêmes propriétés. Ces cardamomes sont le *C. minus*, le *C. medium*.
»	»	»	
»	»	»	(2) La carline à feuilles d'acanthe, *carlina acanthifolia*, jouit des mêmes propriétés, et est employée dans les mêmes cas et aux mêmes doses.

Doses. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 3

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE. Poids anc.	Poids nouv.	MODE D'ADMINISTRATION.
CAROTTE. *Daucus carota.* La racine est alimentaire et adoucissante, les feuilles et les semences excitantes.	Racine.	Quantité indéterminée.	»	En décoction.
	Sirop.	De 1 à 2 onces.	De 32 à 64 gramm.	Dans les potions, les tisanes.
	Feuilles.	De 4 gros à 1 once.	De 16 à 32 gramm.	En infusion.
	Semences (1).	De 1 à 2 gros.	De 4 à 8 gramm.	*Idem.*
CAROUBIER. *Ceratonia siliqua.* Laxatif.	Pulpe.	De 4 gros à 2 onces.	De 16 à 64 gramm.	En décoction.
CARTHAME. *Carthamus tinctorius.* Laxatif.	Semences.	De 4 gros à 1 once 1/2.	De 16 à 48 gramm.	En émulsion.

à 7, 1/3; de 7 à 14, 1/2; de 14 à 20, 2/3 ; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINISTRATION.	*REMARQUES.*
Poids anc.	Poids nouv.		
Râpée, en quantité indéterminée.	»	En cataplasme.	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	(1) Ces semences faisaient partie des quatre semences chaudes mineures.
»	»	»	

Doses. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 3

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE. Poids anc.	Poids nouv.	MODE D'ADMINISTRATION.
CARVI. *Carum carvi.* Stimulant.	Semences.	De 1 à 2 gros.	De 4 à 8 gramm.	En infusion.
	Semences en poudre.	De 18 à 36 grains.	De 1 à 2 gramm.	En pilules, en opiat.
	Eau distillée.	De 1 à 3 onces.	De 32 à 96 gramm.	En potion.
	Huile essentielle.	De 2 à 8 gouttes.	»	*Idem.*
	Teinture.	De 36 grains à 1 gros.	De 2 à 4 gramm.	*Idem.*
CASCARILLE. *Croton cascarilla.* Stimulant et fébrifuge (1).	Écorce concassée.	De 2 à 3 gros.	De 8 à 12 gramm.	En infusion ou décoction.
	Poudre de l'écorce.	De 36 grains à 1 gros.	De 2 à 4 gramm.	En pilul., ou délayée dans un liquide.
	Extrait.	De 36 grains à 1 gros.	De 2 à 4 gramm.	En pilules.
	Sirop aqueux.	De 1 à 2 onces.	De 32 à 64 gramm.	Dans les potions ou tisanes.
	Sirop vineux.	De 2 à 4 gros.	De 8 à 16 gramm.	*Idem.*
	Teinture.	De 36 grains à 1 gros.	De 2 à 4 gramm.	Dans les potions.

à 7, 1/3 ; de 7 à 14, 1/2 ; de 14 à 20, 2/3 ; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINISTRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
De 2 à 4 gros.	De 8 à 16 gramm.	En lavement, en embrocation.	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	(1) La cascarille est souvent employée pour ajouter à l'énergie du quinquina. Les fumeurs se servent de la cascarille pour aromatiser leur tabac ; elle brûle en répandant une odeur très-agréable.
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	

Doses. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 3

MOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS medicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE. Poids anc.	Poids nouv.	MODE D'ADMINISTRATION.
CASSE. *Fruit du cassia fistula.* Laxatif (1).	Gousses concassées.	De 2 à 6 onces.	De 64 à 192 gramm.	En décoction.
	Pulpe.	De 4 gros à 2 onces.	De 16 à 64 gramm.	Délayée dans un liquide approprié.
	Extrait.	De 4 gros à 1 once.	De 16 à 32 gramm.	En opiat.
	Casse cuite.	De 2 gros à 1 once.	De 8 à 32 gramm.	En opiat, en potion, en tisane.
CASTORÉUM. *Castoreum Canadense.* Sédatif, antispasmodique.	Poudre.	De 12 à 36 grains.	De 6 à 18 décigr.	En pilules.
	Teinture alcoolique.	De 12 à 36 grains.	De 6 à 18 décigr.	Dans des potions.
	Teinture éthérée.	De 12 à 36 grains.	De 6 à 18 décigr.	*Idem.*

à 7, 1/3 ; de 7 à 14, 1/2 ; de 14 à 20, 2/3 ; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR D'ADULTE.		MODE D'ADMINISTRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
»	»	»	
»	»	»	(1) La pulpe qu'on rencontre dans le commerce contient un peu de cuivre qui cause des coliques. C'est au pharmacien de s'assurer de la pureté de la casse qu'il achète et qu'il livre au public.
»	»	»	
»	»	»	
De 36 grains à 1 gros.	De 2 à 4 gramm.	En lavement, tenu en suspension à l'aide d'un jaune d'œuf.	
De 36 grains à 1 gros.	De 2 à 4 gramm.	*Idem.*	
De 36 grains à 1 gros.	De 2 à 4 gramm.	*Idem.*	

Doses. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 3

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDIC AMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE. Poids anc.	Poids nouv.	MODE D'ADMINISTRATION.
CATAIRE. *Nepeta cataria.* Excitant, anti-spasmodique.	Sommités.	De 2 à 4 gros.	De 8 à 16 gramm.	En infusion.
CATHOLICON DOUBLE. *Catholicum duplicatum.* Minoratif.	En substance.	De 6 à 8 gros.	De 24 à 32 gramm.	Délayé dans un véhicule approprié.
CENTAURÉE (Petite). *Erythræa centaurium.* Amère, tonique, fébrifuge (1).	Sommités fleuries.	De 4 gros à 1 once.	De 16 à 32 gramm.	En infusion aqueuse ou vineuse.
	Poudre.	De 36 grains à 1 gros.	De 2 à 4 gramm.	En pilules ou opiat.
	Extrait.	De 36 grains à 1 gros.	De 2 à 4 gramm.	*Idem.*
	Suc.	De 3 à 4 onces.	De 96 à 128 gram.	»
	Teinture.	De 36 grains à 1 gros.	De 2 à 4 gramm.	En potion.

à 7, 1/3 ; de 7 à 14, 1/2 ; de 14 à 20, 2/3 ; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINISTRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
De 4 gros à 1 once.	De 16 à 32 gramm.	En lavement, en embrocation.	
De 1 once à 12 gros.	De 32 à 48 gramm.	En lavement.	
De 1 à 2 onces.	De 32 à 64 gramm.	En lotion.	
»	»	»	(1) La petite centaurée est un fébrifuge très-utile et très efficace, dans lequel il y a peut-être quelques principes analogues à ceux du quinquina. L'un de nous, M. Chevallier, s'occupe de faire des recherches à ce sujet.
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	

Doses. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 3

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE. Poids anc.	Poids nouv.	MODE D'ADMINISTRATION.
CENTAURÉE (Grande). *Centaurea centaurium.* Amer.	Racine.	De 1 à 2 onces.	De 32 à 64 gramm.	En décoction.
CERFEUIL. *Chærophillum sativum.* Stimulant, diurétique (1).	*Idem.*	De 4 gros à 1 once.	De 16 à 32 gramm.	En infusion.
	Herbe.	De 4 gros à 1 once.	De 16 à 32 gramm.	En décoction.
	Extrait.	De 1 à 2 gros.	De 4 à 8 gramm.	En infusion.
	Eau distillée.	De 2 à 4 onces.	De 64 à 128 gram.	En potion.
	Suc.	De 2 à 4 onces.	De 64 à 128 gram.	»
CÉRUSE. *Voy.* Carbonate de plomb.	»	»	»	»
CÉTÉRACH. *Ceterach officinarum.* Diurétique.	Plante entière.	De 4 à 8 gros.	De 16 à 32 gramm.	En infusion.

à 7, 1/3 ; de 7 à 14, 1/2 ; de 14 à 20, 2/3 ; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINISTRATION.	*REMARQUES.*
Poids anc.	Poids nouv.		
»	»	»	
»	»	»	
En quantité indéterminée.	»	En cataplasme.	(1) Le cerfeuil fait partie de la plupart des sucs d'herbes. Le *cerfeuil musqué*, le *cerfeuil odorant*, ont des propriétés analogues à celles du précédent.
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	

Doses. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 3

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE. Poids anc.	Poids nouv.	MODE D'ADMINISTRATION.
CÉVADILLE. *Veratrum sabadilla.* Anthelmintique. VÉNÉNEUX (1).	Poudre de la semence.	De 18 à 36 grains.	De 1 à 2 gramm.	En pilules, opiat.
CHAMOEDRIS. *Voy.* Germandrée.	»	»	»	»
CHAMOEPITIS. *Voy.* Ivette.	»	»	»	»
CHANVRE. *Cannabis sativa.* Adoucissant.	Semences (le chenevis).	De 1 à 2 onces.	De 32 à 64 gramm.	En émulsion.
	Huile.	De 4 à 6 gros.	De 16 à 24 gramm.	*Idem.*
CHARBON. *Carbo.* Tonique, absorbant.	Poudre.	De 18 à 36 grains.	De 1 à 2 gramm.	En pilules, pastilles.

à 7, 1/3; de 7 à 14, 1/2; de 14 à 20, 2/3; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINISTRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
En quantité indéterminée.		Pour la destruction des poux (2).	(1) Brewer a administré avec succès la cévadille contre le *tænia lata;* il en donnait douze grains par jour, en pilules, pendant neuf jours, puis il terminait le traitement par un purgatif composé de gomme gutte (3 gr.) associée à 12 gr. de valériane sauvage. L'action vénéneuse de la cévadille est due à un alcali nommé *vératrine* qu'on a extrait de cette plante. Ses antidotes sont les adoucissans.
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	(2) L'usage extérieur de la cévadille exige des précautions. Cette substance cause des céphalalgies qui sont le résultat de son action vénéneuse.
En quantité indéterminée.	»	Comme dentifrice; sur les ulcères fétides; en onguent, contre la teigne, etc.	

Doses. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 3

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE. Poids anc.	Poids nouv.	MODE D'ADMINISTRATION.
CHARBON D'ÉPONGE. *Carbo spongiæ* (1).	En substance.	De 2 à 5 grains.	De 10 à 25 centigr.	En pastilles.
CHARDON BÉNIT. *Centaurea benedicta.* Tonique.	Racine.	De 4 gros à 1 once.	De 16 à 32 gramm.	En décoct., en infusion vineuse.
	Poudre.	De 36 grains à 1 gros.	De 2 à 4 gramm.	En pilules, opiat.
	Extrait.	De 36 grains à 1 gros.	De 2 à 4 gramm.	En pilules.
	Suc.	De 2 à 4 onces.	De 64 à 128 gram.	»
	Teinture.	De 1 à 2 gros.	De 4 à 8 gramm.	Dans les potions.
CHARDON ROLAND *ou* ROULAND. *Eringium campestre.* Amer, diurétique.	Racine.	De 1 à 2 onces.	De 32 à 64 gramm.	En décoction.

à 7, 1/3 ; de 7 à 14, 1/2 ; de 14 à 20, 2/3 ; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINISTRATION.	*REMARQUES.*
Poids anc.	Poids nouv.		
»	»	»	
»	»	»	(1) Les éponges calcinées doivent leur vertu curative à la présence d'une certaine quantité d'iode qu'elles contiennent. On les a beaucoup employés contre le goître, mais associées à plusieurs autres substances. *Voy.* la Pharmacopée de *Spielmann.*
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	

DOSES. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 3

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE. Poids anc.	Poids nouv.	MODE D'ADMINISTRATION.
CHAUSSE-TRAPPE. *Centaurea calcitrappa.* Amer, tonique.	Racine.	De 1 à 2 onces.	De 32 à 64 gramm.	En décoction.
	Extrait.	De 1 à 2 gros.	De 4 à 8 gramm.	En pilules.
CHAUX. *Calx.* Stimulant, âcre et VÉNÉNÉNEUX (1).	Eau de chaux.	De 4 onces à 1 livre.	De 128 à 500 gram.	Coupée avec du lait.
CHÉLIDOINE. *Chelidonium majus.* Stimulant. VÉNÉNEUX (2).	Racine.	De 2 à 4 gros.	De 8 à 16 gramm.	En décoction.
	Suc exprimé.	De 1 à 2 gros.	De 4 à 8 gramm.	Dans les potions.
	Extrait de toute la plante.	De 2 à 4 grains.	De 10 à 20 centigr.	En pilules.
CHÉLIDOINE JAUNE, *ou* PAVOT CORNU. *Chelidonium luteum.* Stimulant.	Feuilles pilées.	»	»	»

à 7, 1/3 ; de 7 à 14, 1/2 ; de 14 à 20, 2/3 ; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINISTRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
»	»	»	
»	»	»	
En quantité indéterminée.	»	En gargarisme, en injection, en lavement en lotion, en liniment,	(1) La chaux, associée à l'oxide de *plomb*, sert à composer une poudre propre à teindre les cheveux. Unie au sulfure d'*arsenic*, elle entre dans la composition de certaines pommades épilatoires. *Antidotes.* Boissons acidulées, avec le vinaigre, le suc de citron; adoucissans.
Idem.	»	Pour stimuler les plaies et ulcér. aton.	
Idem.	»	»	(2) M. Wendt, de Erlangen, a employé avec succès le suc de chélidoine comme anti-syphilitique; il en donnait une cuillerée à café mêlée à du miel, puis augmentait successivement la dose; en hiver il donnait l'extrait de toute la plante à la dose de 4 grains en pilules, qu'il portait jusqu'à 20, et continuait cette dose jusqu'à la guérison. *Antidotes.* Adoucissans.
Idem.	»	Comme caustique.	
Quantité indéterminée.	»	Mêlées avec un peu d'huile d'olives.	

Doses. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 3

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE. Poids anc.	Poids nouv.	MODE D'ADMINISTRATION.
Chêne. *Quercus robur.* Tonique (1).	Écorce concassée.	De 4 gros à 1 once.	De 16 à 32 gramm.	En décoction.
	Écorce en poudre.	De 4 gros à 1 once.	De 16 à 32 gramm.	En opiat, ou délayée dans l'eau.
	Extrait.	De 1 à 2 gros.	De 4 à 8 gramm.	En pilules.
	«	»	»	»
Chêne (Petit). *Voy.* Germandrée.				
	Fleurs.	De 2 à 4 gros.	De 8 à 16 gramm.	En infusion.
Chèvre-feuille. *Loniceza caprifolium.* Béchique, pectoral.	Feuilles.	»	»	»
	Sirop.	De 2 à 3 onces.	De 64 à 96 gramm.	Dans les potions.

7, 1/3 ; de 7 à 14, 1/2 ; de 14 à 20, 2/3 ; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINISTRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
De 2 4 onces.	De 64 à 128 gram.	En lotion, en injection, en lavement, en gargarisme.	(1) L'écorce de chêne, qui contient du tannin et une matière extractive, jouit de propriétés médicales très-énergiques : c'est un moyen indigène qu'on peut se procurer facilement à très-bas prix. On l'emploie comme tonique, astringent et comme fébrifuge. M Barbier a remarqué que les ouvriers employés à réduire en poudre l'écorce de chêne pour les tanneurs, ne sont jamais atteints de fièvres intermittentes (*Mat. médic.*, tom. I. pag. 328.)
uantité indéterminée.	»	Pour saupoudrer les plaies.	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
De 4 gros 1 once.	De 16 à 32 gramm.	En gargarisme.	

Doses. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE. Poids anc.	Poids nouv.	MODE D'ADMINISTRATION.
Chicorée sauvage. *Cichorium intybus.* Amer, tonique (1).	Feuilles.	De 1 à 2 onces.	De 32 à 64 gramm.	En infusi et décoctio
	Racine.	De 4 gros à 1 once.	De 16 à 32 gramm.	*Idem.*
	Poudre.	De 12 à 36 grains.	De 6 à 18 décigr.	En pilulee opiat.
	Extrait.	De 2 à 3 gros.	De 8 à 12 gramm.	*Idem.*
	Suc.	De 2 à 4 onces.	De 64 à 128 gramm.	En natu
Chiendent. *Triticum repens.* Adoucissant et diurétique (2).	Racine.	De 1 à 2 onces.	De 32 à 64 gramm.	En infus et en déc tion.
	Extrait.	De 2 à 4 gros.	De 8 à 16 gramm.	En pilul
Chlorate de potasse. *Chloras potassæ.* Excitant.	En substance	De 18 à 36 grains.	De 1 à 2 gramm.	En disso tion d l'eau.

à 7, 1/3 ; de 7 à 14, 1/2 ; de 14 à 20, 2/3 ; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINISTRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
»	»	»	
»	»	»	(1) Les semences de la chicorée sauvage font partie des quatre semences froides mineures.
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
e 36 grains à 1 gros.	De 2 à 4 gramm.	En gargarisme.	(2) Le chiendent pied de poule, *Cynodon dactylon*, est employé comme succédané de *triticum repens*, dans les mêmes cas et aux mêmes doses.

Doses. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE. Poids anc.	Poids nouv.	MODES D'ADMINISTRATIONS.
CHLORE. *Chlorum.* Tonique, excitant (1).	En substance.	»	»	»
CHLORURE D'ANTIMOINE. *Chloruretum stibii* Caustique, VÉNÉNEUX (2).	»	»	»	»
CHLORURE DE CHAUX. *Chloruretum calcis.* Stimulant, désinfectant.	»	»	»	»
CHLORURE DE SOUDE. *Chloruretum sodæ.* Stimulant, désinfectant.	»	»	»	»

à 7, 1/3; de 7 à 14, 1/2; de 14 à 20, 2/3; de 20 à 60, la dose des adultes

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINISTRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
En quantité indéterminée.	»	En lotions contre la gale.	(1) On donne le chlore à la dose de 10 à 12 gouttes dans un verre d'eau pour combattre l'asphyxie par l'hydrogène sulfuré; on l'a récemment proposé à l'état gazeux contre la phthisie pulmonaire. C'est en dégageant le chlore de l'hydrochlorate de soude, à l'aide des acides, qu'on fait les fumigations *guytoniennes*, remplacées aujourd'hui par les chlorures.
Idem.	»	Pour cautériser.	
Depuis 1/48e jusqu'à 1/10e dissous dans l'eau, en poudre ou en solution pour panser les plaies, les engelures, les brûlures, etc.	»	Pour désinfecter.	(2) *Antidotes.* Eau sucrée pour favoriser le vomissement; petites doses d'opium dans l'eau, ou décoction de pavot. Forte décoction de chêne, de quinquina, ou mieux de noix de galle, si le poison n'a pas été évacué; évacuations sanguines.
Mêmes usages.	»	»	

Doses. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes) ; de 1 à 3, 1/6 ; de 3

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE. Poids anc.	Poids nouv.	MODE D'ADMINISTRATION.
CHLORURE DE MERCURE (Proto-). *Voy.* Mercure doux (1).	»	»	»	»
CHLORURE DE MERCURE (Deuto *ou* Per-) *Chloruretum hydrargyri.* *Voy.* Sublimé corrosif.	»	»	»	»
CHLORURE D'OR. *Voy.* Hydrochlorate d'or.	»	»	»	»
CHLORURE D'OR ET DE SOUDE. *Voy.* Muriate d'or et de soude.	»	«	»	»
CHOU ROUGE. *Brassica rubra.* Tonique, antiscorbutique (2).	Feuilles.	De 2 à 4 onces.	De 64 à 128 gramm.	En infusion.
	Sirop.	De 4 gros à 2 onces.	De 16 à 64 gramm.	Pur ou en potion, en tisane.

à 7, 1/3 ; de 7 à 14, 1/2 ; de 14 à 20, 2/3 ; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINISTRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
»	»	»	
»	»	»	(1) Nous avons renvoyé à l'article *Mercure doux*, pour éviter qu'on ne confondît le chlorure avec le per-chlorure.
»	»	»	
»	»	»	
En quantité indéterminée.	»	En cataplasmes.	(2) Le chou, relégué maintenant dans les cuisines, était chez les anciens, une espèce de *panacée*. *Caton* l'ancien, *Chrysippe*, *Pline* et *Galien* lui-même ne tarissent point d'éloges sur ce végétal.
»	»	»	

Doses. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 3

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE. Poids anc.	Poids nouv.	MODE D'ADMINISTRATION.
CIGUE (Grande). *Conium maculatum* Acre, narcotiq. VÉNÉNEUX (1). Les plantes connues sous le nom de *Ciguë petite* et de *Ciguë aquatique* ne sont presque jamais employées; elles sont VÉNÉNEUSES (2).	Feuilles fraîches.	De 2 à 4 gros.	De 8 à 16 gramm.	En infusio
	Poudre.	De 1 à 6 grains.	De 5 à 30 centigr.	En pilules.
	Extrait sans fécule.	De 1 à 6 grains.	De 5 à 30 centigr.	*Idem.*
	Extrait avec fécule.	De 1 à 6 grains.	De 5 à 30 centigr.	*Idem.*
	Huile.	»	»	»
	Suc.	De 12 à 24 gouttes.	»	En potions
CINABRE. *Voy.* Sulfure de mercure.	»	»	»	»
CINCHONINE. *Cinchonina.* Tonique, fébrifuge.	Alcool.	Est employé pour faire le vin de cinchonine	»	»
	Sirop.	De 4 gros à 1 once.	De 16 à 32 gramm.	Plusieurs fois par jou
	Sulfate.	De 6 à 8 grains.	De 3 à 4 décigr.	En pilules.
	Vin.	De 2 à 4 onces.	De 64 à 128 gram.	»

à 7, 1/3; de 7 à 14, 1/2; de 14 à 20, 2/3; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINISTRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
En quantité indéterminée.	»	En cataplasme.	
»	»	»	
»	»	»	(1) *Antidotes.* Émétiques, purgatifs, suivant le temps qui s'est écoulé depuis l'empoisonnement; saignée, acides, adoucissans.
»	»	»	
De 1 à 2 onces.	De 32 à 64 gram.	En liniment, frictions.	
«	»	»	(2) La racine de ciguë aquatique (*Cicuta virosa*) est employée depuis long-temps dans le nord à l'extérieur, pour combattre les dartres compliquées de syphilis; on en fait des cataplasmes.
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	

Doses. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 33

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE. Poids anc.	Poids nouv.	MODE D'ADMINISTRATION.
CITRON. *Citrus medica.* Tonique, stimulant.	Alcool.	De 1 à 4 gros.	De 4 à 16 gramm.	Dans les potions.
	Huile essentielle.	De 2 à 6 gouttes.	»	Pour aromatiser les potions.
	Poudre de l'écorce.	De 18 grains à 1 gros.	De 1 à 4 gramm.	En pilules.
	Sirop.	De 2 à 4 onces.	De 64 à 128 gram.	En tisane, potion.
	Suc.	De 1 à 3 onces.	De 32 à 96 gramm.	En tisane (1).
CITROUILLE. *Cucurbita pepo.* Adoucissant.	Semences.	De 1 à 4 onces.	De 32 à 128 gram.	En émulsion.
	Pulpe.	»	»	»
CLÉMATITE. *Clematis vitalba.* Acre, caustique. VÉNÉNEUX (2).	Feuilles.	»	»	»
	Huile par macération.	»	»	»
	Poudre.	»	»	»

à 7, 1/3; de 7 à 14, 1/2; de 14 à 20, 2/3; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINISTRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	(1) Le suc de citron entre dans la potion anti-émétique de Rivière. L'acide citrique qu'il contient se combine avec la potasse du carbonate, et en dégage l'acide carbonique.
»	»	»	
Quantité indéterminée	»	En cataplasme.	
Idem.	»	*Idem.*	(2) C'est cette plante qu'on appelle *Herbe aux gueux*, parce que les mendians se servent de ses feuilles très-âcres pour s'ulcérer la peau. *Storck* a fait des essais sur l'usage interne de la clématite, mais cette plante n'est plus usitée.
Idem.	»	En frictions.	
Idem.	»	En liniment contre la gale.	

Doses. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 3

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE. Poids anc.	Poids nouv.	MODE D'ADMINISTRATION.
Cloporte. *Oniscus asellus.* Diurétique (1).	Poudre.	De 1 à 2 gros.	De 4 à 8 gramm.	En infusion dans du vin ou en pilules.
Clous de girofle. *Voy.* Girofle.	»	»	»	»
Cochléaria officinal *Cochlearia officinalis.* Stimulant, antiscorbutique.	Plante.	De 1 à 2 onces.	De 32 à 64 gramm.	En infusion.
	Alcoolat.	De 36 grains à 1 gros.	De 2 à 4 gramm.	En potion.
	Sirop.	De 1 à 2 onces.	De 32 à 64 gramm.	En potion en tisane.
	Suc.	De 3 à 4 onces.	De 96 à 128 gram.	En nature.

7, 1/3 ; de 7 à 14, 1/2 ; de 14 à 20, 2/3 ; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINISTRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
»	»	«	
»	»	»	(1) Les cloportes, qu'on faisait autrefois entrer dans une multitude de préparations officinales, n'ont par eux-mêmes aucune propriété médicamenteuse active ; M. *Guibourt* a fait observer que la vertu diurétique qu'on leur attribue provient de particules salpêtrées au milieu desquelles ces animaux vivent et qui s'attachent à leur corps.
quantité indéterminée.	»	Pour frictionner les gencives.	
De 2 à 4 gros.	De 8 à 16 gramm.	En gargarisme.	
»	»	»	
»	»	»	

Doses. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes) ; de 1 à 3, 1/6 ; de

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE. Poids anc.	Poids nouv.	MODE D'ADMINISTRATION.
Coing. *Malum cydonium.* Le fruit astringent, semences mucilagineuses, adoucissantes (1).	Fruit en gelée.	De 1 à 2 onces.	De 32 à 64 gramm.	
	Sirop.	De 1 à 2 onces.	De 32 à 64 gramm.	En potio
	Suc.	De 3 à 4 onces.	De 96 à 128 gram	Pur, ap avoir été éc coré, ou tisane.
	Semences.	De 4 à 5 gros.	De 16 à 20 gramm.	En décoction
	Mucilage des semences (2).	»	»	»

à 7, 1/3 ; de 7 à 14, 1/2 ; de 14 à 20, 2/3 ; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINISTRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
a pulpe du fruit, quantité indéterminée.	»	En cataplasme.	
»	»	»	(1) On donne le nom de *Cotignac* à une marmelade de coings, qu'on emploie quelquefois à la dose de 2 à 4 onces par jour, pour modérer les diarrhées atoniques.
»	»	»	
n quantité indéterminée.	»	En collyres, lotions, fomentations	
Idem.	»	En gargarisme, en collyre.	(2) On emploie le mucilage de coings pour tenir en suspension et à un état de division extrême, certains médicamens huileux et résineux.

Doses. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 3

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE. Poids anc.	Poids nouv.	MODE D'ADMINISTRATION.
Colchique d'automne. *Colchicum autumnale.* Purgatif, diurétiq., âcre. Vénéneux (1).	Bulbes en poudre.	De 1 à 4 grains.	De 5 à 20 centigr.	En pilules.
	Miel.	De 1 à 3 gros.	De 4 à 12 gramm.	Dans les pp tions, tis nes.
	Oximel.	De 2 à 4 gros.	De 4 à 8 gramm.	Plusieurs fo par jour, e potiou.
	Sirop.	De 2 à 4 gros.	De 8 à 16 gramm.	En potion
	Teinture.	De 9 à 36 gouttes.	»	En potion en mixtur
	Vin.	De 1 à 2 gros.	De 4 à 8 gramm.	*Idem.*
	Vinaigre.	De 36 grains à 1 gros.	De 2 à 4 gramm.	Mêlé à u petite qua tité de l quide.
Colle de poisson. *Ichtyocolla.* Adoucissant.	En quantité indéterminée.	»	»	En looch, électuaire en marmelade.

à 7, 1/3 ; de 7 à 14, 1/2 ; de 14 à 20, 2/3 ; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINISTRATION.	*REMARQUES.*
Poids anc.	Poids nouv.		
»	»	»	
»	»	»	(1) Le bulbe du colchique doit ses propriétés énergiques au principe végétal alcoloïde nommé *veratrine*, qu'il contient. On a beaucoup vanté dans ces derniers temps le vin de colchique contre le rhumatisme chronique.
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	*Antidotes.* Le vomissement provoqué par l'eau tiède ou la barbe d'une plume ; adoucissans, saignées.
»	»	»	
»	»	»	
Quantité indéterminée.	»	En pommade.	

DOSSE. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes) ; de 1 à 3, 1/6 ; de 3

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE. Poids anc.	Poids nouv.	MODE D'ADMINISTRATION.
COLLYRE DE LANFRANC. *Voy.* Mixture cathérétique.	»	»	»	»
COLOMBO. *Menispermum palmatum.* Tonique, mucilagineux (1).	Racine.	De 1 à 2 gros.	De 4 à 8 gramm.	En décoction.
	Poudre.	De 18 à 36 grains.	De 1 à 2 gramm.	En pilules, ou délayée.
	Extrait.	De 18 à 36 grains.	De 1 à 2 gramm.	*Idem.*
	Teinture.	De 18 à 36 grains.	De 1 à 2 gramm.	En potion.
	Vin.	De 4 gros à 1 once.	De 16 à 32 gramm.	»

à 7, 1/3; de 7 à 14, 1/2 ; de 14 à 20, 2/3 ; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINISTRATION.	*REMARQUES.*
Poids anc.	Poids nouv.		
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	(1) La racine de colombo contient environ le tiers de son poids *d'amidon*, ce qui explique les succès qu'on dit en avoir obtenus dans les diarrhées chroniques, etc. Comme cette racine contient aussi un *principe amer* uni à l'amidon, on doit la donner en *infusion* quand on veut l'employer comme tonique, et en retirer l'extractif amer ; on la prescrira, au contraire, en *décoction*, lorsqu'on voudra en extraire la fécule, et faire une tisane mucilagineuse.
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	

Doses. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE. Poids anc.	Poids nouv.	MODE D'ADMINISTRATION.
COLOQUINTE. *Cucumis colocynthis.* Acre, drastique violent. VÉNÉNEUX (1).	Pulpe du fruit.	De 10 à 24 grains.	De 6 à 12 décigr.	En potions purgatives.
	Poudre du fruit.	De 2 à 10 grains.	De 1 à 5 décigr.	En pilules.
	Extrait de la pulpe.	De 2 à 10 grains.	De 1 à 5 décigr.	En pilules en potion.
	Teinture de la pulpe.	De 9 à 36 gouttes.	»	En potions.
CONCOMBRE. *Cucumis sativus.* Rafraîchissant.	Pulpe.	»	»	»
	Suc.	»	»	»
	Semences (2).	De 2 à 4 onces.	De 64 à 128 gram.	En émulsion.
CONCOMBRE SAUVAGE. *Momordica elaterium.* Drastique violent. VÉNÉNEUX (3).	Poudre de la racine.	De 10 à 20 grains.	De 5 à 10 décigr.	En pilules
	Extrait, *ou* Suc épaissi du fruit.	De 2 à 6 grains.	De 1 à 3 décigr.	*Idem.*

à 7, 1/3; de 7 à 14, 1/2; de 14 à 20, 2/3; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINISTRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
De 36 grains à 1 gros.	De 2 à 4 gramm.	En lavement.	(1) On a recommandé la coloquinte associée au camphre contre le tœnia : ce médicament est employé en orient pour combattre les maladies vénériennes. La coloquinte entre dans une foule de préparations vieillies et peu usitées, telles que la confection *Hamech*, les trochisques *Alhandal*, les pilules de *Rudius*, l'extrait panchymagogue de *Crollius*.
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
Quantité indéterminée.	»	En cataplasmes.	*Antidotes.* Adoucissans, en boisson, en lavement, applications émollientes; saignées.
Idem.	»	En lotions.	
»	»	»	(2) Les semences de concombre font partie des 4 semences froides majeures.
»	»	»	(3) Ce médicament est plus généralement connu sous le nom latin d'*elaterium*.
»	»	»	

Doses. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 3

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE. Poids anc.	Poids nouv.	MODE D'ADMINISTRATION.
CONFECTIONS (1).				
CONFECTION ALCHERMÈS. Stimulant.	En substance.	De 18 grains à 1 gros.	De 1 à 4 gramm.	En potion, opiat.
CONFECTION HAMECH. Stimulant.	*Idem.*	De 1 gros à 1 once.	De 4 à 32 gramm.	En bols.
CONFECTION DE HYACINTHE. Stimulant.	*Idem.*	De 18 grains à 2 gros.	De 1 à 8 gramm.	En bols, potion.
CONFECTION JAPONAISE. Stimulant.	*Idem.*	De 18 grains à 1 gros.	De 1 à 4 gramm.	*Idem.*
CONSERVES (2).	»	»	»	»
CONSOUDE (Grande). *Symphitum officinale.* Mucilagineux, légèrement astringent.	Racine.	De 4 gros à 1 once.	De 16 à 32 gramm.	En décoction.
	Feuilles.	»	»	»
	Sirop.	De 4 gros à 2 onces.	De 16 à 64 gramm.	En potion, tisane.

à 7, 1/3; de 7 à 14, 1/2; de 14 à 20, 2/3; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'AD MINIS-TRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
»	»	»	(1) Les *confections* sont des espèces d'électuaire de consistance *molle*.
»	»	«	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	(2) La *conserve* est également un électuaire *mou*; nous renvoyons pour les conserves aux substances avec lesquelles on les prépare. Ex, *Conserve de Cynorrhodon. Voy. Cynorrhodon.*
La pulpe de la racine.	»	En cataplasme.	
Quantité indéterminée.	»	En lotion, fomentation et cataplasme	
»	»	»	

Doses. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 3

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE. Poids anc.	Poids nouv.	MODE D'ADMINISTRATION.
CONTRAYERVA. *Dorstenia contrayerva.* Tonique, stimulant.	Racine.	De 1 à 4 gros.	De 4 à 16 gramm.	En décoction.
	Poudre.	De 18 grains à 1 gros.	De 1 à 4 gramm.	En pilules, opiat.
	Teinture.	De 1 à 2 gros.	De 4 à 8 gramm.	En potion.
COQUE DU LEVANT. *Menispermum cocculus.* VÉNÉNEUX(1).	»	»	»	»
COQUELICOT. *Papaver rhœas.* Somnifère.	Fleurs.	De 1 à 4 gros.	De 4 à 16 gramm.	En infusion.
	Extrait.	De 4 à 8 grains.	De 2 à 4 décigr.	En pilules.
	Teinture.	De 18 grains à 1 gros.	De 1 à 4 gramm.	En potion.
	Sirop.	De 4 gros à 2 onces.	De 16 à 64 gramm.	En potions, tisanes.
COQUELOURDE. *Voy.* Anémone pulsatille	»	»	»	»

à 7, 1/3 ; de 7 à 14, 1/2 ; de 14 à 20, 2/3 ; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINISTRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
De 4 gros à 1 once.	De 16 à 32 gramm.	En gargarisme.	
»	»	»	
»	»	»	
A la dose de quelques grains.	»	En substance, pour tuer les poux.	
»	»	»	(1) La coque du Levant est vénéneuse : il n'est même pas sans danger de manger la chair des poissons qu'on a pris avec cette substance. *Antidotes.* Vomitifs, potions éthérées, adoucissans, saignées.
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	

Doses. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 3

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE. Poids anc.	Poids nouv.	MODE D'ADMINISTRATION.
Coqueret. *Voy.* Alkékenge.	»	»	»	»
Coquilles d'huîtres et Corail (1).	»	»	»	»
Coraline de Corse. (Mousse de Corse.) *Fucus helmintocorton.* Fébrifuge (2),	En substance.	De 4 gros à 2 onces.	De 16 à 64 gramm.	En décoction.
	Poudre.	De 18 grains à 1 gros.	De 1 à 4 gramm.	En pilules opiat.
	Gelée.	De 1 à 2 onces.	De 32 à 64 gramm,	En substance.
Coraline officinale. *Coralina officinalis.* Vermifuge.	En substance.	De 4 gros à 1 once.	De 16 à 32 gramm.	En infusio ou décoct.
	Poudre.	De 36 grains à 1 gros.	De 2 à 4 gramm.	En opiat o pilules.
	Sirop.	De 4 gros à 1 once.	De 16 à 32 gramm.	Pur ou e potion.

à 7, 1/3 ; de 7 à 14, 1/2 ; de 14 à 20, 2/3 ; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE		MODE D'ADMINISTRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
»	»	»	
»	»	»	(1) Ces substances sont employées dans les mêmes cas et aux mêmes doses que le carbonate de chaux. (*Voyez* ce mot.)
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	(2) Ce qu'on désigne dans les pharmacies, sous le nom de *Mousse de Corse*, est un mélange de plantes marines: le *fucus helminthocorton* n'en forme à peu près qu'un tiers, d'après M. *Decandolle*; d'autres *fucus* des *conferves*, des *ulves*, forment les deux autres tiers.
»	»	»	

Doses. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 3

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE. Poids anc.	Poids nouv.	MODE D'ADMINISTRATION.
CORIANDRE. *Coriandrum sativum.* Stimulant.	Semences (1).	De 1 à 2 gros.	De 4 à 8 gramm.	En infusion
	Poudre.	De 36 grains à 1 gros.	De 2 à 4 gramm.	En pilules opiat.
	Huile volatile.	De 2 à 5 gouttes.	»	Comme correctif.
CORNE DE CERF. *Cornu cervi.* Adoucissant et nutritif.	En substance.	De 1 à 2 onces.	De 32 à 64 gramm.	En décoction.
	Gelée.	De 2 à 4 onces.	De 64 à 128 gram.	En substance.
	Huile volatile.	De 5 à 6 gouttes.	»	Dans l'eau en potion.
COULEUVRÉE. *Voy.* Bryone.	»	»	»	»
COSTUS ARABIQUE. *Costus arabicus.* Stimulant.	La racine et l'écorce en poudre.	De 4 gros à 1 once.	De 16 à 32 gramm	En infusion
	»	De 18 à 36 grains.	De 1 à 2 gramm.	En pilules opiat.

à 7, 1/3; de 7 à 14, 1/2; de 14 à 20, 2/3; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINISTRATION.	*REMARQUES.*
Poids anc.	Poids nouv.		
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	(1) La coriandre est employée pour masquer la saveur désagréable du séné; on la fait entrer dans les potions purgatives, et suivant Cullen elle prévient les coliques qui pourraient être causées par ce médicament. Les fruits de la *coriandre*, remarquables par leur odeur et leur saveur agréables, entrent dans l'eau de Mélisse composée.
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	

Doses. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 3

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE. Poids anc.	Poids nouv.	MODE D'ADMINISTRATION.
COUPEROSE BLANCHE. *Voy.* Sulfate de zinc.	»	»	»	»
COUPEROSE BLEUE. *Voy.* Sulfate de cuivre.	»	»	»	»
COUPEROSE VERTE. *Voy* Sulfate de fer.	»	»	»	»
COURGE. *Voy.* Citrouille.	»	»	»	»
CRAIE. *Voy.* Carbonate de chaux.	»	»	»	»
CRÈME DE TARTRE. (Surtartrate de potasse.) Laxatif (1).	En substance.	De 2 gros à 1 once.	De 8 à 16 gramm	Dissoute dans l'eau, en limonade

à 7, 1/3; de 7 à 14, 1/2; de 14 à 20, 2/3; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINISTRATION.	*REMARQUES.*
Poids anc.	Poids nouv.		
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	(1) Nous avons traité de ce médicament sous le nom vulgaire de crême de tartre pour ne point le séparer du suivant (la crême de tartre soluble) qui ne diffère de celui-ci que par l'addition d'une certaine quantité d'acide borique.

Doses. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de à à 3, 1/6; de

NOMS FRANCAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE		MODE D'ADMINISTRATION.
		Poids anc.	Poids nouv.	
CRÈME DE TARTRE SOLUBLE.	Poudre.	De 2 gros à 1 once.	De 8 à 32 gramm.	Dissoute dans l'eau, en limonade
CRESSON DE FONTAINE. *Sisymbrium nasturtium officinale.* Tonique, antiscorbutique (1).	Feuilles.	De 1 à 2 onces.	De 32 à 64 gramm.	En infusion à vase clos.
	Suc.	De 2 à 4 onces.	De 64 à 128 gram.	»
	Conserve.	De 1 à 2 onces.	De 32 à 64 gramm.	En substance.
CRESSON ALENOIS. *Lepidium sativum.* Antiscorbutique.	Suc.	De 2 à 4 onces.	De 64 à 128 gram.	*Idem.*
CRESSON DE PARA. *Spilanthus oleraceus.* Antiscorbutique (2).	Teinture.	De 2 à 4 gros.	De 8 à 16 gramm.	En potions ou pris avec du sucre.

à 7, 1/3; de 7 à 14, 1/2; de 14 à 20, 2/3; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINISTRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
»	»	»	(1) Cette espèce de cresson, qu'on fait croître artificiellement dans des lieux inondés, qu'on appelle *essonnières*, en est la plus employée en pharmacie dans les nombreuses préparations appelées anti-corbutiques.
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	(2) On prétend, que le médicament connu sous le nom de *Paraguay roux* n'est autre chose qu'une *teinture de cresson de Para*.

Doses. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 3

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE. Poids anc.	Poids nouv.	MODE D'ADMINISTRATION.
CRISTAL MINÉRAL. *V.* Nitrate de potasse, pour les propriétés et pour les doses.	»	»	»	»
CROTON TIGLIUM. *Crotontiglium.* Purgatif, drastique. VÉNÉNEUX (1).	Huile.	De 1 à 3 gouttes.	»	En pilules, potions, ou mêlée à du sirop de gomme.
	Savon.	De 2 à 3 grains.	De 5 à 15 décigr.	Divisé dans de l'eau, ou en pilules, ou avec du sucre.
CUBÉBE. (Poivre à queue.) *Pipercubeba.* Stimulant.	Poudre.	De 2 gros à 1 once.	De 8 à 32 gramm.	En opiat.
	Extrait oléo-résineux.	De 1 à 4 gros.	De 4 à 16 gramm.	En pilules.
	Huile volatile.	De 12 à 15 gouttes.	»	En émulsion, sur du sucre.
CUIVRE. N'est pas usité; *Voy.* Acétate et sulfate (2).	»	»	»	»

à 7, 1/3; de 7 à 14, 1/2; de 14 à 20, 2/3; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINISTRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
»	»	»	(1) Les fruits du *croton tiglium*, dont on extrait l'huile, sont encore connus sous le nom de *graines de Tilly*. Cette huile d'une activité extrême, contient sur 100, 45 parties d'un principe *âcre*, soluble dans l'éther et les huiles volatibles. Quelques auteurs ont regardé ce principe comme immédiat, et ont proposé de l'appeler *tiglin*.
De 5 15 gouttes.	»	En frictions autour de l'ombilic.	
»	»	»	
De 4 gros à 1 once.	De 16 à 32 gramm.	En lavement.	
De 4 gros 2 onces.	De 16 à 64 gramm.	*Idem.*	(2) Le cuivre a été employé comme moyen thérapeutique; on l'a administré contre l'hydrophobie, dans le commencement de la maladie, à la dose de 3 à 4 grains, en limaille, mélange à du miel et avec du beurre; à l'extérieur on l'applique sur les ulcères atoniques rebelles.
»	»	»	
»	»	«	

Doses. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; dé

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE. Poids anc.	Poids nouv.	MODE D'ADMINIS TRATION.
CUMIN. *Cuminum cyminum.* Aromatique. stimulant (1).	Semences.	De 1 à 2 gros.	De 4 à 8 gramm	En infusi
	Poudre.	De 18 à 36 grains.	De 1 à 2 gramm.	En pilul opiat.
	Huile volatile.	De 2 à 5 gouttes.	»	Sur du suc
CURCUMA. *Curcuma longa.* Tonique (2).	Racine.	De 2 à 4 gros.	De 8 à 16 gramm.	En infusi
	Poudre.	De 36 grains à 1 gros.	De 2 à 4 gramm.	En bol opiat.
CYANURE DE MERCURE. *Voy.* Prussiate de mercure.	»	»	»	»
CYANURE DE ZINC. Antispasmodique.	Poudre.	De 4 à 6 grains.	De 2 à 3 décigr.	Mêlée à magnésie à la can le, etc.

à 7, 1/3; de 7 à 14, 1/2; de 14 à 20, 2/3; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINISTRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
De 4 gros à 1 once.	De 16 à 32 gramm.	En lotions.	
»	»	»	(1) Les frui ts du cumin contiennent une grande quantité d'huile volatile, et jouissent de propriétés plus énergiques que ceux des autres ombellifères.
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	(2) On emploie le curcuma pour colorer les onguens et les huiles; on l'associe à l'indigo pour donner une couleur verte à l'onguent populeum, au baume tranquille.
»	»	»	
»	»	»	

Doses. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE. Poids anc.	Poids nouv.	MODE D'ADMINISTRATION.
CYNOGLOSSE. *Cynoglossum officinale.* Mucilagineux (1).	Feuilles et racines.	De 4 gros à 2 onces.	De 16 à 64 gramm	En décoction
	Poudre.	De 36 grains à 1 gros.	De 2 à 4 gramm.	En pilules opiat.
CYNORRHODON (Fruits de l'églantier). Astringent.	Conserve.	De 1 à 4 gros.	De 4 à 16 gramm.	En substance
	Pulpe.	De 4 gros à 1 once.	De 16 à 32 gramm.	*Idem.*
DAPHNÉ. *Voy.* Garou.	»	»	»	»
DATTES. *Dactyli.* (Fruit du dattier). Analeptique adoucissant (2).	En substance.	De 1 à 2 onces.	De 32 à 64 gramm.	En décoction, en sane.
DÉCOCTION BLANCHE DE SYDENHAM. *Décoctum album.* Mucilagineuse.	En substance.	«	»	A prendre par verres quantité déterminée

à 7, 1/3; de 7 à 14, 1/2; de 14 à 20, 2/3; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINISTRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
Quantité indéterminée.	»	En cataplasmes.	
»	»	»	(1) Les propriétés de la cynoglosse résident surtout dans l'écorce de la racine; on doit rejeter le centre qui est inerte. Les pilules de *cynoglosse* composées avec cette plante, ne doivent leur action qu'à l'opium qu'elles contiennent.
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
			(2) Les dattes font partie des 4 fruits pectoraux.
»	»	»	

DOSES. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 3

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE. Poids anc.	Poids nouv.	MODE D'ADMINISTRATION.
DENTELAIRE D'EUROPE. *Plumbago europæa.* Acre, corrosif. VÉNÉNEUX.	Racine entière.	De 6 à 8 grains.	De 3 à 4 décigr.	En infusion.
	Racine en poudre.	De 2 à 4 grains.	De 1 à 2 décigr.	En pilules.
DIAGRÈDE. *Voy.* Scammonée.	»	»	»	»
DIASCORDIUM. *Electuarium diascordium.* Astringent, calmant.	En substance.	De 36 grains à 2 gros.	De 2 à 8 gramm.	En bols, en potion, en tisane, etc.
DICTAME DE CRÈTE. *Origanum dictamnus.* Aromatique, stimulant (2).	Sommités fleuries.	De 2 à 4 gros.	De 8 à 16 gramm.	En infusion.
	Sirop.	De 1 à 2 onces.	De 32 à 64 grains.	En potion, tisane.

à 7, 1/3; de 7 à 14, 1/2; de 14 à 20, 2/3; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINISTRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
De 2 à 3 onces.	De 64 à 96 gramm.	En décoction dans 1 liv. d'huile. Employé comme liniment contre la gale (1).	
»	»		
»	»	»	(1) La dentelaire n'est presque plus usitée à l'intérieur, à raison de ses propriétés âcres et vénéneuses.... *Les antidotes* de la dentelaire sont les mêmes que ceux des autres plantes âcres et corrosives, telles que le garou, la gomme-gutte, le concombre sauvage.
»	»	«	
De 2 à 4 onces.	De 64 à 128 gram.	En lotions.	(2) Le *dictame*, autant oublié aujourd'hui qu'il a été vanté autrefois, entre dans la composition de plusieurs préparations officinales pharmaceutiques, comme le *diascordium*, la confection *hyacinthe*, etc.
»	»	»	

Doses. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 3

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE. Poids anc.	Poids nouv.	MODE D'ADMINISTRATION.
Digitale pourprée. *Digitalis purpurea.* Regardée comme sédatif, diurétique. Vénéneux (1).	Feuilles.	De 1 à 2 gros.	De 4 à 8 gramm.	En infusion
	Poudre.	De 6 à 12 grains.	De 3 à 6 décigr.	Par pilules, ou doses de 3 grains.
	Extrait.	De 6 à 12 grains	De 3 à 6 décigr.	En pilules.
	Teinture alcoolique.	De 12 à 36 gouttes.	»	En potion.
	Teinture éthérée.	De 10 à 20 gouttes.	»	*Idem.*
Dompte-Venin. *Asclepias vincetoxicum.* Diaphorétique, émétique.	Racine entière.	De 4 gros à 1 once.	De 16 à 32 gramm.	En décoction aqueuse ou vineuse.
	Racine pulvérisée.	De 18 grains à 1 gros.	De 1 à 4 gramm.	En bols.
	Feuilles en poudre.	De 24 à 36 grains.	De 12 à 18 décigr.	En pilules, ou délayée dans l'eau.

à 7, 1/3; de 7 à 14, 1/2; de 14 à 20, 2/3; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINISTRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
De 2 à 4 gros.	De 8 à 16 gramm.	En lotion, injection.	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	(1) La digitale est un poison très-actif dont on combat les effets par les évacuans, si le poison n'a pas été rejeté; on donne ensuite les boissons acidulées, et on a même recours à la saignée dans les cas les plus graves. Malgré ses propriétés vénéneuses, la digitale est un médicament dont le médecin retire de grands avantages; il a une action puissante sur le système circulatoire.
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	

Doses. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; déc

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE. Poids anc.	Poids nouv.	MODES D'ADMINISTRATION
Doradille, *ou* Rhue des murailles. *Asplenium ruta muraria* (1).	»	»	»	»
Douce-Amère. *Solanum dulcamara.* Diaphorétique, narcotique.	Tiges.	De 2 gros à 1 once.	De 8 à 32 gramm.	En décoction.
	Poudre.	De 36 grains à 1 gros.	De 2 à 4 gramm.	En bols, délayée dans l'eau.
	Extrait.	De 36 grains à 1 gros.	De 2 à 4 gramm.	En pilules.
	Suc des feuilles.	De 2 à 4 onces.	De 64 à 128 gram.	En substance.
Dragées de Keyser. Antisyphilitique (2).	»	De 2 à 6 dragées.	»	Administrée matin et soir
Eau d'Alibour. Tonique, excitant.	En substance.	»	»	»
Eau d'arquebusade. *Voy.* Eau vulnéraire spirit.	»	»	»	»

à 7, 1/3 ; de 7 à 14, 1/2 ; de 14 à 20, 2/3 ; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINISTRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
»	»	»	
»	»	»	(1) Cette plante, comme son nom l'indique, est une espèce de *capillaire* qu'on a autrefois, par suite d'une ridicule exagération, vantée comme *anti-phthisique*; elle n'est plus employée.
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	(2) Les dragées dites de Keyser ne sont que des *pilules* qui contiennent de l'*acétate* de mercure, de la *manne* et de la *gomme adragante*.
n quantité indéterminée.	»	En lotions.	
»	»	»	

DOSES. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 4

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE. Poids anc.	Poids nouv.	MODE D'ADMINISTRATION.
EAU BLANCHE. *Voy.* Eau végéto-minérale.	»	»	»	»
EAU CAMPHRÉE. *Aqua camphorata.* Stimulant.	En substance.	De 2 à 4 onces.	De 64 à 128 gram.	En potion, en tisane.
EAU DES CARMES. *Voy.* Mélisse.	»	»	»	»
EAU DE CHAUX COMPOSÉE. *Aqua calcis composita.* Stimulant.	En substance.	De 6 onces à 1 livre.	De 192 à 500 gram.	Par demi-verres dans le courant du jour.
EAU DE DIPPEL. Stimulant (2)	*Idem.*	De 2 gros à 1 once.	De 8 à 32 gramm.	En potion.
EAU ÉTHÉRÉE CAMPHRÉE.	*Idem.*	De 4 à 6 gros.	De 16 à 24 gramm.	Mêlée à du sirop.

à 7, 1/3; de 7 à 14, 1/2; de 14 à 20, 2/3; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINISTRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
»	»	»	
Quantité indéterminée.	»	En lotions (1).	(1) Cette composition entre aussi dans des collyres, étendue d'une assez grande quantité d'eau.
»	»	»	
»	»	»	(2) Cette eau est une dissolution d'huile animale de Dippel, dans les proportions de 32 grammes d'huile et 2 litres d'eau distillée; on a administré cette solution contre les convulsions des enfans.
Quantité indéterminée.	»	En fomentation.	
»	»	»	

DOSES. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE. Poids anc.	Poids nouv.	MODE D'ADMINISTRATION.
EAU FONDANTE DE TRÉVEZ. Purgatif (1).	En substance.	2 livres.	1000 gram.	En tisane.
EAU DE GOULARD. *Voy.* Eau végéto-minérale.	»	»	»	»
EAU DE LUCE. *Aqua Lucia.* Stimulant, caustique (2).	En substance.	De 15 à 20 gouttes.	»	En potion.
EAU MINÉRALE FACTICE D'AIX-LA-CHAPELLE Hydro-sulfureuse; purgative à haute dose.	*Idem.*	De 8 onces à 2 livres.	De 250 à 1000 gram.	Par verre dans le cou rant de la journée.
EAU MINÉRALE FACTICE D'AIX EN SAVOIE. Hydrosulfureuse (3).	*Idem.*	De 1 à 4 livres.	De 500 à 2000 gram.	*Idem.*

à 7, 1/3; de 7 à 14, 1/2; de 14 à 20, 2/3; de 20 à 60, la dose de adultess.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINISTRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
»	»	»	
»	»	»	(1) L'eau fondante de Trévez est composée d'une once de sulfate de magnésie, d'un 1/2 grain d'émétique dissous dans 2 livres d'eau.
uantité inéterminée.	»	En application sur les plaies envenimées.	(2) L'eau de *Luce* est une mixture faite avec de l'huile volatile de succin dans l'alcool et seize fois son poids d'ammoniaque.
»	»	»	
»	»	»	(3) Nous n'avons fait mention que des eaux minérales factices indiquées dans le catalogue, qui se trouve à la fin du traité des eaux minérales du docteur *Patissier*. La dose des eaux naturelles ransportées est la même que celle des eaux artificielles, puisque les unes ont servi de base aux autres pour la fabrication.

Doses. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; dée

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE. Poids anc.	Poids nouv.	MODE D'ADMINISTRATION.
EAU MINÉRALE FACTICE DE BAGNÈRES. Hydrosulfureuse, saline.	En substance.	De 1 à 2 livres.	De 500 à 1000 gram.	Par verre dans le coo rant de journée.
EAU MINÉRALE FACTICE DE BALARUC. Saline, tonique; purgative à haute dose(1).	*Idem.*	2 livres.	1000 gram.	Par verre dans le coo rant de journ., comme tonique.
	»	6 livres.	3000 gram.	Comme purgatif.
EAU MINÉRALE FACTICE DE BARRÈGES. Hydrosulfureuse.	*Idem.*	De 1 livre à 1 livre 1/2.	De 500 à 750 gram.	Par verre dans le coo rant de journée.
EAU MINÉRALE FACTICE DE BONNES. Hydrosulfureuse.	*Idem.*	De 1 à 6 livres.	De 500 à 3000 gram.	*Idem.*
EAU MINÉRALE DE BOURBONNE-LES-BAINS. Saline.	*Idem.*	De 1 à 1 livre 1/2.	De 500 à 750 gram.	*Idem.*

à 7, 1/3; de 7 à 14, 1/2; de 14 à 20, 2/3; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINISTRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
»	«	»	
»	»	»	
»	»	»	(1) Suivant M. *Baumes*, les eaux de Balaruc ne sont pas appréciées à leur juste valeur. D'autres médecins de Montpellier, et bien avant eux *Chirac*, avaient regardé les eaux de Balaruc comme très-efficaces contre les maladies de la peau ; pour produire un effet purgatif, il faut en porter la dose jusqu'à 5 ou 6 livres par jour.
Quantité indéterminée.	»	En lotions, bains, injections.	
Idem.	»	*Idem.*	
»	»	»	

DOSES. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE. Poids anc.	Poids nouv.	MODE D'ADMINISTRATION.
EAU MINÉRALE DE BUSSANG. Ferrugineuse, acidule.	En substance.	De 1 à 4 livres.	De 500 à 2000 gram.	Par verres dans le courant de la journée.
EAU MINÉRALE DE CAUTERETS. Hydrosulfureuse.	*Idem.*	De 1 à 2 livres.	De 500 à 1000 gram.	*Idem* (1).
EAU MINÉRALE DE CHATELDON. Acidule, saline.	*Idem.*	De 2 à 6 livres.	De 1000 à 3000 gram.	Par verres dans le courant de la journée, pure ou coupée avec le vin (2).
EAU MINÉRALE DE CONTREXEVILLE. Ferrugineuse, acidule.	*Idem.*	De 8 onces à 1 livre.	De 250 à 500 gram.	Par verres dans le courant de la journée (3).
EAU MINÉRALE D'ENGHIEN. Hydrosulfureuse.	*Idem.*	De 8 onces à 1 livre.	De 250 à 500 gram.	Par verres dans le courant de la journée.
EAU MINÉRALE DE FORGES. Ferrugineuse, acidule.	*Idem.*	De 8 onces à 3 livres.	De 250 à 1500 gram.	Par verres dans le courant du jour.

à 7, 1/3 ; de 7 à 14, 1/2 ; de 14 à 20, 2/3 ; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINISTRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
»	»	»	
Quantité indéterminée.	»	En lotion, en injection.	(1) Les eaux de Cauterets causent quelquefois des vomissemens ; il faut alors les couper avec le lait ou une eau mucilagineuse.
»	»	»	(2) Les eaux de Châteldon doivent être bues froides parce que la chaleur les altère en en dégageant l'acide carbonique.
»	»	»	(3) Les eaux de Contrexeville doivent être prises froides, afin d'éviter la décomposition des carbonates qu'elles contiennent.
»	»	»	
»	»	»	

Doses. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 3

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE. Poids anc.	Poids nouv.	MODE D'ADMINISTRATION.
EAU MINÉRALE DE LAMOTTE. Saline.	En substance.	De 1 à 2 livres.	De 500 à 1000 gram.	Par verres le matin à jeun.
EAU MINÉRALE DE LOÉCHE. Hydrosulfureuse.	*Idem.*	De 1 à 2 livres.	De 500 à 1000 gram.	*Idem.*
EAU MINÉRALE DE MONT-D'OR. Acidule, saline (1).	*Idem.*	De 1 à 2 livres.	De 500 à 1000 gram.	*Idem.*
EAU MINÉRALE DE PASSY. Acidule, saline, ferrugineuse (2).	*Idem.*	De 1 à 4 livres.	De 500 à 1000 gram.	Par verres dans la journée.
EAU MINÉRALE DE PLOMBIÈRES. Saline.	*Idem.*	De 2 à 6 livres,	De 1000 à 3 000 gram.	*Idem* (3).

à 7, 1/3 ; de 7 à 14, 1/2 ; de 14 à 20, 2/3 ; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINISTRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
»	»	»	
»	»	»	(1) L'activité des eaux du Mont-d'Or est modérée avec le lait, l'infusion de tilleul, la décoction de riz, etc.
Quantité indéterminée.	»	En lotions.	
»	»	»	(2) L'eau de Passy doit être prise froide ou presque froide, parce qu'elle se décompose promptement par la chaleur On peut la couper avec du vin.
»	»	»	(3) Les auteurs disent qu'on peut porter la dose de l'eau de Plombières jusqu'à vingt verres par jour. On peut la couper avec du lait, pour diminuer sa trop grande activité.

DOSES. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; dé

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE. Poids anc.	Poids nouv.	MODES D'ADMINISTRATIONS.
EAU MINÉRALE DE PYRMONT. Saline, froide.	En substance.	De 2 à 6 livres.	De 1000 à 3000 gram.	Par verre dans le cou rant de l journée.
EAU MINÉRALE DE SELTZ. Eau acidule, froide (1).	*Idem.*	De 2 à 4 livres.	De 1000 à 2000 gram.	Par verres seule ou coo pée avec de lait ou de vin,
EAU MINÉRALE DE SEDLITZ. Eau saline, purgative (2).	*Idem.*	De 4 onces à 1 livre.	De 128 à 500 gram.	Par verres et après l'a voir fait tiè dir.
EAU MINÉRALE DE SPA. Eau ferrugineuse, acidule, froide.	*Idem.*	De 1 à 6 livres.	De 500 à 3000 gram.	Par verres dans la journée.
EAU MINÉRALE DE VICHY. Eau alcaline.	*Idem.*	De 1 à 2 livres.	De 1000 à 2000 gram.	Seule ou cou pée avec du petit-lait.

à 7, 1/3; de 7 à 14, 1/2; de 15 à 20, 2/3; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINISTRATION.	*REMARQUES.*
Poids anc.	Poids nouv.		
»	»	»	
»	»	»	(1) Il ne faut point faire chauffer l'eau de Seltz, parce qu'elle perdrait son acide carbonique et par conséquent ses propriétés; on doit aussi boire le mélange de cette eau avec un autre liquide aussitôt qu'il est fait, et tenir exactement fermées les bouteilles qui contiennent cette eau.
»	»	»	
»	»	»	(2) Les eaux de Selditz artificielles se préparent avec 2, 4, 6 ou 8 gros de sulfate de magnésie par pinte de liquide; nous n'avons voulu parler que de l'eau préparée avec 8 gros et qui est employée comme laxative.
»	»	»	

Doses. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes) ; de 1 à 3, 1/6 ; de

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE. Poids anc.	Poids nouv.	MODE D'ADMINISTRATION.
EAU PHAGÉDÉNIQUE. Caustique. VÉNÉNEUSE (1).	En substance.	»	»	»
EAU DE RABEL. *Voy.* Acide sulfurique alcoolisé.	»	»	»	»
EAU RÉGALE. *Voy.* Acide hydro-chloro-nitrique.	»	»	»	»
EAU ROUGE. *Voy.* Eau vulnéraire.	»	»	»	»
EAU THÉRIACALE. *Aqua theriacalis.* Stimulant (2).	En substance.	De 2 gros à 1 once.	De 8 à 32 gramm.	Dans les potions.

à 7, 1/3; de 7 à 14, 1/2; de 14 à 20, 2/3; de 20 à 60, la dose des adulte

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINISTRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
En quantité indéterminée.	»	Pour lotionner les ulcères.	
»	»	»	(1) L'eau phagédénique est un mélange de *sublimé corrosif* et d'eau de *chaux*, dans les proportions de 24 grains de sel mercuriel dissous, dans une livre d'eau de chaux. Les *antidotes* de l'eau phagédénique sont ceux du sublimé.
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	(2) L'eau thériacale peut être employée comme succédanée de l'*eau générale* et de l'*eau impériale*.

DOSES. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 4, 1/6 ; de 3

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE. Poids anc.	Poids nouv.	MODE D'ADMINISTRATION.
EAU VÉGÉTO-MINÉRALE. *Aqua vegeto mineralis.* Résolutif.	En substance.	»	»	»
EAU VULNÉRAIRE SPIRITUEUSE. Stimulante.	*Idem.*	De 2 à 4 gros.	De 8 à 16 gramm.	En potion ou étendue d'eau sucrée.
EAU VULNÉRAIRE SPIRITUEUSE COLORÉE. (Eau rouge (1).	*Idem.*	»	»	»
EAU-DE-VIE. *Aqua vitæ.* Tonique, stimulant.	*Idem.*	De 1 à 2 onces.	De 32 à 64 gramm.	Dans des tisanes.
EAU-DE-VIE ALLEMANDE. *Tinctura purgans.* Purgatif (2).	*Idem.*	De 8 gros à 1 once.	De 8 à 32 gramm.	En substance ou étendue d'eau.

à 7, 1/3; de 7 à 14, 1/2; de 14 à 20, 2/3; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINISTRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
Quantité indéterminée.	»	Pour lotions.	
Idem.	»	En lotions.	(1) Toutes les eaux connues sous le nom vulgaire d'*eaux rouges*, ne sont qu'une infusion à froid de plantes aromatiques indigènes dans l'eau-de-vie.
Idem.	»	*Idem.*	
Idem.	»	Étendue d'eau, en gargarisme, en lotions.	(1) L'eau-de-vie allemande qui a pour base les résines de scammonée et de jalap dissoutes dans l'alcool, paraît avoir suggéré l'idée funeste de préparer des médicamens purgatifs spiritueux; de ce nombre sont le *remède* de Leroy, *les élixirs purgatifs*, etc.
»	»	»	

Doses. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 3

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE, Poids anc.	Poids nouv.	MODE D'ADMINISTRATION.
Eau-de-vie camphrée. *Aqua vitæ camphorata.* Résolutif, sédatif.	En substance.	»	»	»
Eau-de-vie de Gayac *Voy.* Gayac.	»	»	»	»
ÉCORCES (1).				
Écorce de Winter. *Cortex Winteranus.* Aromatique, âcre, stimulant.	Écorce concassée.	De 2 à 4 gros.	De 8 à 16 gramm.	En infusion vineuse.
	Poudre.	De 18 à 36 grains.	De 1 à 2 gramm.	En pilules, ou mêlée avec du sucre.
	Teinture.	De 1 à 2 gros.	De 4 à 8 gramm.	Dans les potions.
Écrevisse. *Voy.* Yeux d'écrevisse.	»	»	»	»

à 7, 1/3; de 7 à 14, 1/2; de 14 à 20, 2/3; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINISTRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
Quantité indéterminée.	»	En lotions, fomentations, injections.	
»	»	»	
»	»	»	(1) Nous avons traité des diverses écorces employées en médecine aux divers articles des substances médicamenteuses dont ces écorces font partie. Il faut en excepter l'écorce *du drymis Winteri*, connue dans la matière médicale sous le nom d'*écorce de Winter*.
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	

Doses. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes) ; de 1 à 3, 1/6 ; de 3

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MODE D'ADMINISTRATION.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE. Poids anc.	Poids nouv.	MODE D'ADMINISTRATION.
ÉLECTUAIRES (1).				
ÉLECTUAIRE DIAPHENIX. Purgatif.	En substance.	De 2 gros à 1 once.	De 8 à 32 gramm.	En substance, ou délayé dans du vin.
ELECTUAIRE DIAPRUN SIMPLE. Purgatif, minoratif.	*Idem.*	De 4 gros à 2 onces.	De 16 à 64 gramm	En substance, ou délayé convenablement.
ÉLECTUAIRE DIAPRUN SOLUTIF. Purgatif.	*Idem.*	De 2 gros à 1 once.	De 8 à 32 gramm.	*Idem.*
ÉLECTUAIRE HIERA-DIACOLOCYNTHIDOS. Purgatif.	*Idem.*	De 1 à 4 gros.	De 4 à 16 gramm.	*Idem.*
ÉLECTUAIRE HIERA PICRA. Tonique, purgatif.	*Idem.*	De 1 à 2 gros.	De 4 à 8 gramm.	*Idem.*

à 7, 1/3; de 7 à 14, 1/2; de 14 à 20, 2/3; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINISTRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
De 4 gros à 2 onces.	De 16 à 64 gramm.	En lavement.	(1) On comprend sous le nom d'électuaire les médicamens officinaux formés de substances organiques, quelquelquefois de substances minérales incorporées dans du miel ou dans du sucre dissous; on les a divisé en électuaires *solides* (tablettes, pastilles), et en électuaires *mous* (conserves, pâtes). Il y a des électuaires simples et composés.
De 2 à 3 onces.	De 64 à 96 gramm.	*Idem.*	
»	»	»	
De 4 gros à 1 once.	De 16 à 32 gramm.	En lavement.	
De 3 à 6 gros.	De 12 à 24 gramm.	*Idem.*	

Doses. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 3

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE. Poids anc.	Poids nouv.	MODE D'ADMINISTRATION.
ÉLECTUAIRE LÉNITIF. Purgatif.	En substance.	De 4 gros à 1 once.	De 16 à 32 gramm	En substance, ou délayé convenablement.
ÉLIXIRS (1).				
ÉLIXIR AMÉRICAIN DE COURCELLES. Aromatique.	*Idem.*	De 2 à 4 gros.	De 8 à 16 gram.	Dans une tasse de tisane appropriée.
ÉLIXIR ANTI-SCROPHULEUX DE PEYRHILLE.	*Idem.*	De 2 gros à 1 once.	De 8 à 32 gramm.	Pur, ou dans des tisanes
ÉLIXIR DE GARUS. Stimulant.	*Idem.*	De 1 à 2 onces.	De 32 à 64 gramm.	Pur, ou potion.
ÉLIXIR DE LONGUE VIE. Purgatif (2).	*Idem.*	De 2 à 6 gros.	De 8 à 24 gramm.	Pur, ou été du d'e sucrée.
ÉLIXIR PARÉGORIQUE. Anodin.	*Idem.*	De 36 grains à 1 gros.	De 2 à 4 gramm.	En potion

à 7, 1/3; de 7 à 14, 1/2; de 14 à 20, 2/3; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINISTRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
De 1 à 2 onces.	De 32 à 64 gramm.	En lavement.	
»	»	»	(1) Les *élixirs* sont des espèces de teintures qui s'obtiennent en traitant les substances médicamenteuses par l'alcool.
»	»	»	(2) L'élixir de longue vie est aussi connu sous les noms d'*élixir de Spina*, *baume de vie de Lelièvre*, d'*essence de vie*, etc.
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	

Doses. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes) ; de 1 à 3, 1/6; de 33

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE. Poids anc.	Poids nouv.	MODE D'ADMINISTRATION.
ÉLIXIR STOMACHIQUE DE STOUGHTON.	En substance.	De 1 à 2 gros.	De 4 à 8 gramm.	Dans une tasse de tisane appropriée.
ÉLIXIR VISCÉRAL D'HOFFMANN. Stomachique, tonique.	*Idem.*	De 1 à 2 gros.	De 4 à 8 gramm.	*Idem.*
ÉLIXIR VITRIOLIQUE DE MYNSICHT. Stomachique (1).	*Idem.*	De 18 à 36 gouttes.	»	*Idem.*
ELLÉBORE BLANC. *Veratrum album.* Sternutatoire, purgatif très-âcre. VÉNÉNEUX (2).	Racine.	De 1 à 2 gros.	De 4 à 8 gramm.	En infusion, à prendre par cuillerées.
	Poudre.	De 2 à 6 grains.	De 1 à 3 décigr.	En pilules.

à 7, 1/3; de 7 à 14, 1/2; de 14 à 20, 2/3; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINISTRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	(1) Cet élixir pourrait être donné à plus forte dose ; cependant on doit avoir égard à l'acide sulfurique qu'il contient, et qui à de hautes doses est vénéneux.
»	»	»	(2) *Antidotes*. Vomissemens excités par l'eau tiède, les barbes d'une plume. Adoucissans, bains, saignées.
De 2 à grains.	De 1 à 2 décigr.	Comme sternutatoire.	

DOSES. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS. medicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE. Poids anc.	Poids nouv.	MODE D'ADMINISTRATION.
ELLÉBORE NOIR. *Helleborus niger.* Purgatif, drastique, sternutatoire. VÉNÉNEUX (1).	Racine.	De 1 à 2 gros.	De 4 à 8 gramm.	En décoction.
	Poudre.	De 12 à 24 grains.	De 6 à 12 décigr.	En pilules.
	Extrait.	De 12 à 24 grains.	De 6 à 12 décigr.	*Idem.*
	Teinture.	De 36 grains à 1 gros.	De 2 à 4 gramm.	En potion.
ÉMÉTINE COLORÉE. *Emetina.* Emétique. VÉNÉNEUSE (2).	En substance.	De 4 à 6 grains.	De 2 à 3 décigr.	Dans des potions vomitives.
	Pastilles pectorales. (*Magendie.*)	Toutes les heures.	»	»
	Pastilles vomitives. (*Magendie.*)	3 ou 4.	»	Pour exciter le vomissement.
	Sirop d'émétine. (*Magendie.*)	De 4 gros à 1 once.	De 16 à 32 gramm.	Dans les potions ou mêlé à l'huile d'amandes douces.

à 7, 1/3; de 7 à 14, 1/2; de 14 à 20, 2/3; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINISTRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	(1) L'ellébore noir entre dans les *pilules toniques de Bacher*, les pilules balsamiques de *Stahl*, etc. *Antidotes*. Les mêmes que pour l'ellébore blanc.
»	»	»	
»	»	»	(2) D'après M. Caventou, l'infusion de noix de galles est un antidote; elle neutralise l'action vénéneuse de l'émétine.
»	»	»	
»	»	»	

Doses. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE. Poids anc.	Poids nouv.	MODE D'ADMINISTRATION.
ÉMÉTINE PURE (1).	En substance.	1 grain.	5 centigram.	Dans une po tion de onces.
	Pastilles de 9 grains. (*Magendie.*)	2 ou 3 pastilles par jour.	»	»
	Sirop d'émétine.	De 2 à 3 gros.	De 6 à 12 gramm.	En potions
ÉMÉTIQUE (Tartrate de potasse antimonté). *Tartras potassæ stibiatus.* Vomitif. VÉNÉNEUX (2).	En substance.	De 1 à 3 grains.	De 5 à 15 centigr.	Dissous dan 8 onc. d'ea et divisé e 3 doses.
	»	»	»	»
	»	»	»	»
	Pommade stibiée.	»	»	»
	Vin émétique.	»	»	»

à 7, 1/3 ; de 7 à 14, 1/2 ; de 14 à 20, 2/3 ; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINISTRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
»	»	»	
»	»	»	(1) L'émétine pure est peu employée parce que la préparation de cette substance est très-dispendieuse.
»	»	»	
De 1 à 3 grains.	De 5 à 15 centigr.	Dissous dans 4 ou 6 onces d'eau pour collyres.	
De 4 à 8 grains.	De 2 à 4 décigr.	En lavement.	(2) *Antidotes.* Eau sucrée ; solution opiacée pour calmer les vomissemens et les douleurs ; sangsues, saignées, quand les accidens augmentent ; s'il n'y a point de vomissemens, forte décoction de quinquina ou mieux de noix de galles. L'écorce de chêne, de saule, peut au besoin remplacer ces dernières substances.
En quantité indéterminée.	»	Sur des emplâtres.	
Idem.	»	En frictions.	
4 onces.	128 gramm.	En lavement.	

Doses. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE. Poids anc.	Poids nouv.	MODE D'ADMINISTRATION.
Emplatres (1).	»	»	»	»
Émulsion (2). *Voy.* Amandes.	»	»	»	»
Encens. *Oliban.*	»	»	»	»
Épinard. *Spinacia oleracea.* Adoucissant.	Feuilles.	»	»	»
Épine vinette, *Berberis vulgaris.* Rafraîchissant, diurétique.	Suc du fruit.	2 onces.	64 grammes.	En limonade.
	Sirop.	De 1 à 2 onces.	De 32 à 64 gramm.	Dans les tisanes.
	Suc pur.	De 2 à 4 gros.	De 8 à 16 gramm.	»

à 7, 1/3; de 7 à 14, 1/2; de 14 à 20, 2/3; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINISTRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
»	»	»	(1) L'emplâtre est un médicament externe, solide, glutineux, se ramollissant par la chaleur, et adhérant à la partie sur laquelle on l'applique. Nous ne devons pas parler dans cet ouvrage des diverses préparations emplastiques; elles ne sont pas susceptibles d'être dosées.
»	»	»	
Quantité indéterminée.	»	En fumigat. contre les rhumatism.	
Idem.	»	En cataplasme.	
»	»	»	(2) Les émulsions se composent d'une huile suspendue dans l'eau par l'intermédiaire d'un mucilage.
»	»	»	
«	»	»	

Doses. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 3

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE. Poids anc.	Poids nouv.	MODE D'ADMINISTRATION.
ÉPONGE. *Voy.* Charbon d'.	»	»	»	»
ÉPURGE. *Euphorbia lathyris.* Purgatif, âcre. VÉNÉNEUX (1).	Huile fixe.	De 6 à 8 gouttes.	»	En pastilles, pilules, potions.
ÉRYSIMUM. *Voy.* Alliaire.	»	»	»	»
ESPÈCES (2).				
ESPÈCES AMÈRES. *Species amaræ.*	En substance.	De 1 à 2 onces.	De 32 à 64 gramm.	En décoction (3).
ESPÈCES ANTHELMINTIQUES. *Species anthelmintica.*	*Idem.*	De 1 à 2 onces.	De 32 à 64 gramm.	*Idem.*
ESPÈCES ANTISCORBUTIQUES. *Species antiscorbutica.*	*Idem.*	De 1 à 2 onces.	De 32 à 64 gramm.	*Idem.*

à 7, 1/3; de 7 à 14, 1/2; de 14 à 20, 2/3; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINISTRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
»	»	»	
»	»	»	(1) Les habitans de la campagne emploient les fruits de l'épurge pour se purger. Quand on veut faire usage de ce médicament, il faut employer des graines sèches; les graines recouvertes du parenchyme vert de la capsule sont âcres et vénéneuses.
»	»	»	
»	»	»	(2) On donne le nom d'*espèces* à la réunion de diverses substances végétales divisées et dont les propriétés médicales sont à peu près les mêmes.
De 2 à 4 onces.	De 64 à 128 gram.	En lavement, en fomentation.	(3) Pour augmenter l'intensité de l'amertume on joint quelquefois à cette décoction une petite dose de sous-carbonate de soude ou de potasse.
»	»	»	

Doses. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes) ; de 1 à 3, 1/6 ; de 3

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE. Poids anc.	Poids nouv.	MODE D'ADMINISTRATION.
Espèces apéritives. *Species aperitivæ* (1).	En substance.	De 1 à 2 onces.	De 32 à 64 gramm.	En décoction.
Espèces aromatiques. *Species aromaticæ.*	*Idem.*	De 1 à 2 onces.	De 32 à 64 gramm.	En décoction.
Espèces astringentes. *Species adstringentes.*	*Idem.*	De 1 à 2 onces.	De 32 à 64 gramm.	En infusion.
Espèces béchiques. *Voy.* Espèces pectorales.	»	»	»	»
Espèces carminatives. *Species carminativæ* (2).	*Idem.*	De 4 gros à 1 once.	De 16 à 32 gramm.	En infusion.
Espèces diurétiques, *Voy.* Espèces apéritives.	*Idem.*	»	»	»

à 7, 1/3 ; de 7 à 14, 1/2 ; de 14 à 20, 2/3 ; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINISTRATION.	*REMARQUES.*
Poids anc.	Poids nouv.		
»	»	»	
De 2 à 4 onces.	De 64 à 128 gram.	En fomentation, lavement, injection.	(1) Quoique nous n'ayons pas employé dans le cours de cet ouvrage le mot vague et inexact d'*apéritif* pour caractériser l'action de certains médicamens, nous avons cru devoir le conserver pour spécifier l'action d'un mélange de plantes, encore employé dans la pratique.
De 2 à 4 onces.	De 64 à 128 gram.	En infusion, pour lotions, foment., injection.	
»	»	»	
De 4 gros à 1 once.	De 16 à 32 gramm.	En lavement.	
»	»	»	(2) Les mêmes remarques que ci-dessus s'appliquent aux espèces carminatives.

Doses. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 3

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE. Poids anc.	Poids nouv.	MODE D'ADMINISTRATION.
Espèces émollientes. *Species emollientes.*	En substance.	De 1 à 2 onces.	De 32 à 64 gramm.	En décoction.
Espèces pectorales. *Species pectorales dictæ.*	*Idem.*	De 1 à 2 onces.	De 32 à 64 gramm.	*Idem.*
Espèces sudorifiques. *Species sudorificæ.*	*Idem.*	De 1 à 2 onces.	De 32 à 64 gramm.	*Idem.*
Espèces vulnéraires (1). *Species vulnerariæ.*	*Idem.*	De 1 à 2 onces.	De 32 à 64 gramm.	En infusion.
Esprit carminatif de Sylvius (2).	*Idem.*	De 18 grains à 2 gros.	De 1 à 8 gramm.	En potion.
Esprit de cochléaria *Voy.* Cochléaria (Alcoolat).	*Idem.*	»	»	»

à 7, 1/3; de 7 à 14, 1/2; de 14 à 20, 2/3 ; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINISTRATION.	*REMARQUES.*
Poids anc.	Poids nouv.		
Quantité indéterminée.	»	En cataplasme ou en décoction, pour lotion, fomentat., injection, lavement.	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	(1) Le mot vulnéraire est aussi presque inusité ; on appelait autrefois de ce nom les médicamens qu'on croyait propres à consolider les plaies.
»	»	»	(2) L'esprit carminatif de Sylvius, encore appelé *alcool carminatif*, est le produit de la distillation de l'alcool, dans lequel on a fait macérer pendant deux jours diverses plantes, comme le galanga, le gingembre, la noix muscade, le romarin, la marjolaine, la rue, l'angélique, etc., etc.
»	»	»	

Doses. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6 ; de 3

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE. Poids anc.	Poids nouv.	MODE D'ADMINISTRATION.
ESPRIT DE MINDÉRÉRUS, *ou* Acétate d'ammoniaque (1).	En substance.	De 18 grains à 2 gros.	De 1 à 8 gramm.	En potion.
ESPRIT DE NITRE DULCIFIÉ. *Alcool æthereus acidi nitri.*	»	De 18 grains à 1 gros.	De 1 à 4 gramm.	*Idem.*
ESPRIT DE SEL DULCIFIÉ. *Spirit. æthereus salis marini.*	*Idem.*	De 18 grains à 1 gros.	De 1 à 4 gramm.	En potion.
ESPRIT DE SEL AMMONIAC DISTILLÉ. Excitant.	*Idem.*	De 15 à 20 gouttes.	»	*Idem.*
ESPRIT VOLATIL DE CORNE DE CERF. *Spirit. volatilis e cornu cervi.* Stimulant (2).	*Idem.*	De 1 à 2 gros.	De 4 à 8 gramm.	*Idem.*

à 7, 1/3 ; de 7 à 14, 1/2 ; de 14 à 20, 2/3 ; de 20 à 60, la dose des adultes

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINISTRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
»	»	»	
»	»	»	(1) Les rédacteurs du Codex font observer que l'esprit de *Mindérérus* doit être distingué de l'acétate d'ammoniaque proprement dit ; le premier doit être préparé avec le sous-carbonate d'ammoniaque huileux recueilli dans la distillation de la corne de cerf.
»	»	»	
«	»	»	
»	»	»	(2) L'*Esprit volatil de corne de cerf* est du sous-carbonate d'ammoniaque huileux liquide qu'on a rectifié par une seconde distillation.

Doses. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 3

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE. Poids anc.	Poids nouv.	MODE D'ADMINISTRATION.
ÉTAIN. *Stannum.* Anthelmintique (1).	Métal en poudre.	De 18 grains à 1 gros.	De 1 à 4 gramm.	En pilules, bols.
	Oxide blanc.	De 6 à 12 grains.	3 à 6 décigr.	*Idem.*
ÉTHER ACÉTIQUE. *Æther aceticus.* Stimulant, antispasmodique.	En substance.	De 18 à 36 grains.	De 1 à 2 gramm.	En potion.
ÉTHER HYDROCHLORIQUE. *Æther hydrochloricus.* Antispasmodique (2).	*Idem.*	»	»	»
ÉTHER HYDROCHLORIQUE ALCOOLISÉ. *Æther hydrochloricus alcoolisatus.*	*Idem.*	De 40 à 50 gouttes.	»	En potion.

à 7, 1/3; de 7 à 14, 1/2; de 14 à 20, 2/3; de 20 à 60, le dose des adult .

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINISTRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
»	»	»	
»	»	»	(1) On a conseillé la *limaille d'étain* contre le tœnia, à la dose d'une once mêlée à quatre onces de mélasse, donnée le matin à jeun, et à celle d'un gros et demi les deux jours suivans. On termine le traitement par un purgatif.
Quantité indéterminée.	»	En frictions.	
Idem.	»	*Idem.*	
»	»	»	(2) L'éther hydrochlorique est l'éther muriatique.

Doses. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 3

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE. Poids anc.	Poids nouv.	MODE D'ADMINISTRATION.
ÉTHER NITRIQUE. *Æther nitricus.* Antispasmodique, diurétique.	En substance.	De 18 à 36 grains.	De 1 à 2 gramm.	En potion.
ÉTHER NITRIQUE ALCOOLISÉ. *Æther nitricus alcoolisatu.*	*Idem.*	De 36 grains à 1 gros.	De 2 à 4 gramm.	*Idem.*
ÉTHER SULFURIQUE. *Æther sulfuricus.* Antispasmodique.	*Idem.*	De 36 grains à 1 gros.	De 2 à 4 gramm.	*Idem.*
	Sirop.	De 4 gros à 1 once.	De 16 à 32 gramm.	*Idem.*
ÉTHER SULFURIQUE ALCOOLISÉ (1). *Æther sulfuricus alcoolisatus.*	»	De 36 grains à 2 gros.	De 2 à 4 gramm.	*Idem,*

à 7, 1/3 ; de 7 à 14, 1/2 ; de 14 à 20, 2/3 ; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINISTRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
»	»	»	
»	»	»	
Quantité indéterminée.	»	En fomentation.	
«	«	«	
»	»	»	
			(1) Ce médicament est plus généralement connu sous le nom de *Liqueur minérale anodine d'Hoffmann.*

Doses. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 3

MOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE. Poids anc.	Poids nouv.	MODE D'ADMINISTRATION.
ÉTHER SULFURIQUE PHOSPHORÉ. *Æther sulfuricus phosphoratus.* Stimulant.	En substance.	De 15 à 36 gouttes.	»	En potion.
ÉTHER SULFURIQUE IODURÉ. *Æther sulfuricus ioduratus.* Antiscrophuleux.	*Idem.*	De 5 à 10 gouttes.	»	Par chaque verre de tisane.
ÉTHIOPS MARTIAL (1). *Voy.* Fer oxidé noir.	*Idem.*	»	»	»
ÉTHIOPS MINÉRAL, *ou* SULFURE NOIR DE MERCURE. Inusité.	»	»	»	»

à 7, 1/3 ; de 7 à 14, 1/2 ; de 14 à 20, 2/3 ; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR D'ADULTE.		MODE D'ADMINISTRATION.	*REMARQUES.*
Poids anc.	Poids nouv.		
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	(1) Le nom d'*Etiops*, dérivé de deux mots grecs (αιθω et ωψ) qui signifient *aspect brûlé*, a été donné autrefois à certains oxides ou sulfures métalliques.

Doses. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 3

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE. Poids anc.	Poids nouv.	MODE D'ADMINISTRATION.
Ethuse. *Voy.* Ciguë (petite).	«	»	»	»
Eupatoire d'Avicenne (1). *Eupatorium cannabinum.* Purgatif.	Feuilles fraîches.	De 1 à 3 onces.	De 32 à 96 gramm.	En décoction.
	Extrait.	De 1 à 2 gros.	De 4 à 8 gramm.	En pilules.
	Le suc exprimé.	De 2 à 3 onces.	De 64 à 96 gramm.	En nature.
Euphorbe. *Euphorbia officinarum, canariensis antiquorum.* *Voy.* Vésicant, sternutatoire, drastique. Vénéneux (2).	En poudre.	De 2 à 8 grains.	De 1 à 4 décigr.	Dans du vin blanc.
Euphraise. *Euphrasia officinalis.* Amer, astringent.	L'herbe.	De 4 gros à 1 once.	De 16 à 32 gramm.	En infusion.
	Eau distillée.	De 2 à 4 onces.	De 32 à 64 gramm.	En potion.

7, 1/3; de 7 à 14, 1/2; de 14 à 20, 2/3; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINISTRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
»	»	»	
Quantité indéterminée.	»	En cataplasme.	(1) Il y a plusieurs eupatoires exotiques qui sont très-renommés en Amérique; telles sont l'*eupatorium satureiæ folium*, *perfoliatum*, enfin l'*eupatorium aya-pana* dont nous avons parlé sous cette dernière dénomination.
»	»	»	
»	»	»	
De 18 à 36 grains.	De 1 à 2 gramm.	En lavement, liniment, onguent.	
De 2 à 4 onces.	De 64 à 128 gram.	En décoction, pour lotions.	(2) *Antidotes.* Vomissemens à l'aide de l'eau tiède, des barbes d'une plume. Adoucissans, mucilagineux, bains, saignées.
Quantité indéterminée.	»	En collyre.	

Doses. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes) ; de 1 à 3, 1/6 ; de

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE. Poids anc.	Poids nouv.	MODE D'ADMINISTRATION.
FEXTRAIT DE SATURNE. *Voy.* Acétate de plomb.	»	»	»	»
FAAM. *Angræcum fragrans.* Mucilagineux, récemment proposé contre les inflammations de poitrine (1).	La plante entière.	De 2 à 4 gros.	De 8 à 16 gramm.	En infusion
	Sirop.	De 1 à 2 onces.	De 32 à 64 gramm.	Dans des potions, des tisanes.
FENOUIL. *Fœniculum officinale.* Tonique, stimulant.	Semences.	De 2 à 4 gros.	De 8 à 16 gramm.	En infusion
	Poudre.	De 18 à 36 grains.	De 1 à 2 gramm.	En pilules opiat.
	Eau distillée.	De 1 à 2 onces.	De 32 à 64 gramm.	En potion.
	Huile volatile.	De 2 à 5 gouttes.	»	Sur du sucre
	Teinture.	De 36 grains à 2 gros.	De 2 à 8 gramm.	En potion.

à 7, 1/3 ; de 7 à 14, 1/2 ; de 14 à 20, 2/3 ; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINISTRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	Cette infusion est employée en lavement.	(1) Cette plante, dont nous devons la connaissance à M *du Petit-Thouars*, est employée de temps immémorial, par les Africains, contre les maladies de poitrine.
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	«	»	

Doses. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE. Poids anc.	Poids nouv.	MODE D'ADMINISTRATION.
Fenu grec. *Trigonella fœnum græcum.* Emollient.	Semences en poudre.	»	»	»
	Semences.	»	»	»
Fer. *Ferrum.* Tonique, astringent.	Poudre fine.	De 12 à 36 grains.	De 6 à 18 décigr.	En pilules ou en opiat (1)
	Oxide noir.	De 18 grains à 1 gros.	De 1 à 4 gramm.	En pilules ou opiat.
	Oxide brun.	De 18 grains à 1 gros.	De 1 à 4 gramm.	*Idem.*
	Oxide rouge.	»	»	»
Fève de saint-Ignace. *Strichnos Ignatii.* Fébrifuge. Vénéneux (2).	Poudre.	De 2 à 6 grains.	De 1 à 3 décigr.	En pilules
	Teinture.	De 18 à 24 gouttes.	»	En potion.

à 7, 1/3 ; de 7 à 14, 1/2 ; de 14 à 20, 2/3 ; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINISTRATION.	REMARQUES
Poids anc.	Poids nouv.		
Quantité indéterminée.	»	En cataplasme.	
De 2 à 4 onces.	De 64 à 128 gram.	En décoction, pour lavement.	
»	«	«	
»	»	»	(1) MM. Chevallier et Pelletan (Gabriel) l'ont recommandé comme un antidote des sels de cuivre. La dose qu'ils indiquent est de 4 à 6 gros (16 à 24 grammes).
»	»	»	
Quantité indéterminée.	»	Sur les ulcères atoniques.	
»	»	»	
»	»	»	(2) *Antidotes.* Vomissemens par l'émétique ou autres vomitifs ; insufflation de l'air dans les poumons, et autres moyens employés contre l'asphyxie. Potions éthérées, excitantes.

Doses. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6;

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE. Poids anc.	Poids nouv.	MODE D'ADMINISTRATION
FIEL DE BOEUF. *Fel bovinum.* Tonique, anthelmintique.	Extrait.	De 4 à 12 grains.	De 2 à 6 décigr.	En pilul
	Teinture.	»	»	»
	Sirop.	De 4 gros à 1 once.	De 16 à 32 gramm.	Dans des tions, tines.
FIGUIER. *Ficus carica.* Le fruit émollient, adoucissant.	Fruits (1).	De 2 à 4 onces.	De 64 à 128 gram.	En décoction
FLEURS (2) D'ANTIMOINE. *V.* Antimoine.	»	»	»	
FLEURS DE BENJOIN. *Voy.* Acide benzoïque.	»	»	»	»
FLEURS MARTIALES. *Voy.* Hydrochlorate de fer.	»	»	»	»

à 7, 1/3 ; de 7 à 14, 1/2 ; de 14 à 20, 2/3 ; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINISTRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
»	»	»	
Quantité indéterminée.	»	Contre les taches de rousseur ?	
»	»	»	
Quantité indéterminée.	»	Comme topique.	
»	»	»	(1) C'est par suite d'un usage erroné qu'on donne le nom de fruit à la figue, qui n'est qu'un véritable récepta-cle charnu rempli d'un suc mucilagineux, adoucissant et nutritif.
»	»	»	(2) En chimie et en pharmacologie, on a donné autrefois le nom de *fleurs* à des produits volatils obtenus sous forme sèche par le moyen de la sublimation.
»	»	»	

Doses. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE. Poids anc.	Poids nouv.	MODE D'ADMINISTRATION.
FLEURS DE SOUFRE. *Voy.* Soufre.	»	»	»	»
FLEURS DE ZINC. *Voy.* Oxide de zinc.	»	»	»	»
FOUGÈRE MALE. *Polypodium filix mas.* Astringent réputé anthelmintique (1).	Racine.	De 1 à 2 onces.	De 32 à 64 gramm.	En décoction.
	Poudre.	De 1 à 4 gros.	De 4 à 16 gramm.	En pilules, ou delayée dans un liquide approprié.
	Extrait.	De 1 à 2 gros.	De 4 à 8 gramm.	En pilules.
	Eau distillée.	De 2 à 4 onces.	De 64 à 128 gram.	Dans les potions.
	Teinture.	De 1 à 2 gros.	De 4 à 8 gramm.	*Idem.*
	Vin.	De 4 gros à 1 once.	De 16 à 32 gramm.	En substance.
	Principe gras (2).	De 6 à 12 gouttes.	»	En pilules.

à 7, 1/3 ; de 7 à 14, 1/2 ; de 14 à 20, 2/3 ; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINISTRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	(1) La fougère mâle est la base du remède de madame *Nouffer*, préconisé contre le tœnia. Cette racine, qu'on a fait entrer dans un grand nombre d'*arcanes* contre les vers, n'a guère d'action marquée qu'autant qu'elle est associée à des purgatifs.
»	»	»	
»	»	»	(2) On peut administrer ce principe gras, qui semble jouir de propriétés anthelmintiques spéciales depuis 12 jusqu'à 30 gouttes en plusieurs doses, prises en plusieurs jours ; il s'obtient en faisant digérer les bourgeons de fougère dans l'éther sulfurique, et en évaporant ensuite le liquide qui dépose la matière grasse huileuse.
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	

Doses. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 3

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE. Poids anc.	Poids nouv.	MODE D'ADMINISTRATION.
Fraisier. *Fragaria vesca.* Diurétique, astringent (1).	Racine.	De 1 à 2 onces.	De 32 à 64 gramm.	En décoction.
	Suc du fruit.	De 2 à 4 onces.	De 64 à 128 gram.	En substance.
Framboisier. *Rubus idæus.* Astringent.	Feuilles.	»	»	»
Fumeterre. *Fumaria officinalis.* Amer, tonique (2).	Herbe.	De 1 à 2 onces.	De 32 à 64 gramm.	En décoction.
	Poudre.	De 1 à 2 gros.	De 4 à 8 gramm.	En pilules.
	Extrait.	De 1 à 2 gros.	De 4 à 8 gramm.	*Idem.*
	Sirop.	De 1 à 3 onces.	De 32 à 96 gramm.	Dans les tisanes.
	Suc.	De 2 à 4 onces.	De 64 à 128 gram.	En substance.

à 7, 1/3; de 7 à 14, 1/2; de 14 à 20, 2/3; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINISTRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
»	»	»	
»	»	»	(1) L'un des auteurs du *Dictionnaire des Drogues* assure que l'usage prolongé de la décoction de fraisier teint en rouge les excrémens, phénomène qui a fait quelquefois supposer une hémorragie intestinale.
De 1 à 2 onces.	De 32 à 64 gramm.	En gargarisme.	
»	»	»	
»	»	»	(2) La fumeterre est une substance trop négligée. Pinel, dont l'autorité n'est pas suspecte en pharmacologie, a loué son efficacité dans les dartres invétérées.
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	

DOSES. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 3

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE. Poids anc.	Poids nouv.	MODE D'ADMINISTRATION.
GALANGA. *Maranta galanga.* Stimulant.	Racine pulvérisée.	De 18 à 36 grains.	De 1 à 2 gramm.	En pilules, en opiat.
	Extrait.	De 18 à 36 grains.	De 1 à 2 gramm.	En pilules.
	Teinture.	De 36 grains à 2 gros.	De 2 à 8 gramm.	En potion.
GALBANUM (G. Résine de). *Bubon galbanum.* Stimulant (1).	En substance.	De 6 à 24 grains	De 3 à 12 décigr.	En pilules, en solution.
	Teinture.	De 24 à 36 gouttes.	»	En potion.
GALLES. *Voy.* Noix de galles.	»	»	»	»
GARANCE. *Rubia tinctorum.* Tonique, diurétique (2).	Racine en substance.	De 4 à 8 gros.	De 16 à 32 gramm.	En décoction.
	Poudre.	De 1 à 2 gros.	De 4 à 8 gramm.	En pilules.
	Extrait.	De 1 à 2 gros.	De 4 à 8 gramm.	*Idem.*
	Sirop.	De 2 à 3 onces.	De 64 à 96 gramm.	Dans les tisanes, potions.

à 7, 1/3 ; de 7 à 14, 1/2 ; de 14 à 20, 2/3 ; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINISTRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
De 18 grains à 1 gros.	De 1 à 4 gramm.	En lavement.	
De 1 à 2 gros.	De 4 à 8 gramm.	En lavement, en frictions, en collyres.	(1) Le galbanum est peu employé; on lui préfère l'assafœtida et la gomme ammoniaque.
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	(2) C'est à tort que plusieurs auteurs ont avancé que la garance était une plante inerte; il serait utile de la soumettre à de nouvelles expériences.

DOSES. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 3

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE. Poids anc.	Poids nouv.	MODE D'ADMINISTRATION.
GAROU. *Daphne gnidium.* Drastique, émétique. VÉNÉNEUX (1).	Écorce	De 1 à 2 gros.	De 4 à 8 gramm.	En décoction.
	Poudre.	De 1 à 3 grains.	De 5 à 15 centigr.	En pilules.
	Extrait.	De 1 à 3 grains.	De 5 à 15 centig.	*Idem.*
GAYAC (Le bois). *Guayacum officinale.* Sudorifique, anti-syphilitique (2).	Le bois rapé.	De 1 à 2 onces.	De 32 à 64 gramm.	En décoction.
	Poudre.	De 18 grains à 1 gros.	De 1 à 4 gramm.	En pilules.
	Résine en poudre.	De 10 à 20 grains.	De 5 à 10 décigr.	*Idem.*
	Teinture de bois.	De 2 à 4 gros.	De 8 à 16 gramm.	Dans les tisanes.
	Teinture de résine.	De 2 à 4 gros.	De 8 à 16 gramm.	*Idem.*

à 7, 1/3; de 7 à 14, 1/2; de 14 à 20, 2/3; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINISTRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
Quantité indéterminée.	»	Macérée dans du vinaigre pour produire la vésication.	
»	»	»	(1) Les daphnés *méséréon* et *lauréole* jouissent des mêmes propriétés. Les secours à donner, dans les cas d'empoisonnemens par le garou, sont les mêmes que pour les autres végétaux irritans, âcres et corrosifs; tels sont la coloquinte, l'aconit, le concombre sauvage.
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	(2) Le gayac et sa résine entrent dans un grand nombre de préparations vantées contre la syphilis et la goutte; de ce nombre sont l'*élixir anti-goutteux*, le remède dit *des Caraïbes*, la *mixture de Gayac*, etc., etc.
Quantité indéterminée.	»	Comme dentifrice et dans les gargarism.	
Idem.	»	*Idem.*	

Doses. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 3

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE. Poids anc.	Poids nouv.	MODE D'ADMINISTRATION.
GÉLATINE. *Gelatina.* Émolliente, nutritive.	En substance.	De 2 à 6 onces.	De 64 à 192 gramm.	Délayée dans l'eau sucrée aromatisée.
GÉNÉPI *Artemisia glacialis.* Tonique, aromatique (1).	Plante.	De 4 gros à 1 once.	De 16 à 32 gramm.	En infusion théiforme.
GENÊT A BALAIS. *Genista scoparia.* Amer, diurétique, purgatif (2).	Sommités.	De 4 gros à 1 once.	De 16 à 32 gramm.	En décoction.
	Poudre.	De 36 grains à 1 gros.	De 2 à 4 gramm.	En pilules,
	Extrait.	De 36 grains à 1 gros.	De 2 à 4 gramm.	*Idem.*
GENIÈVRE COMMUN. *Juniperus communis.* Diurétique, stimulant.	Baies.	De 4 gros à 1 once.	De 16 à 32 gramm.	En infusion.
	Extrait ou rob.	De 1 à 2 gros.	De 4 à 8 gramm.	En opiat.
	Teinture.	De 1 à 2 gros.	De 4 à 8 gramm.	En potion.
	Huile essentielle.	De 2 à 10 gouttes.	»	Dans un véhicule convenable.

à 7, 1/3; de 7 à 14, 1/2; de 14 à 20, 2/3; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINISTRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv		
De 4 onces à 1 livre.	De 128 à 500 gram.	Dans les bains dit gélatineux.	
»	»	»	
»	»	»	(1) Cette plante est particulièrement employée en Suisse et en Savoie; il en est de même d'une autre espèce du même genre, l'*artemisia rupestris*.
»	»	»	
»	»	»	
n quantité indeterminée.	»	Pour fumigations.	(2) Le *genista tinctoria* a été recommandé par Marochetti contre l'hydrophobie. Suivant cet auteur, c'est un remède populaire employé dans l'Ukraine.
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	

Doses. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; dé

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE. Poids anc.	Poids nouv.	MODE D'ADMINISTRATION.
GENTIANE JAUNE. *Gentiana lutea.* Amer, tonique (1).	Racine.	De 1 à 2 gros.	De 4 à 8 gramm.	En infusion
	Poudre.	De 18 grains à 1 gros.	De 1 à 4 gramm.	En pilules.
	Extrait.	De 18 grains à 1 gros.	De 1 à 4 gram m.	*Idem.*
	Sirop.	De 2 à 4 onces.	De 64 à 128 gram.	Dans les tisanes.
	Teinture.	De 1 à 2 gros.	De 4 à 8 gramm.	En tisane.
	Vin.	De 2 à 4 onces.	De 64 à 128 gram.	En nature.
GENTIANIN. *Gentianinum* (Magendie) (2).	»	»	»	»
GEOFFRÉE. *Geoffrea* ou *Geoffroya inermis.* Émétique, purgatif.	Écorce.	De 4 gros à 1 once.	De 16 à 32 gramm.	En décoction.
	Poudre.	De 12 à 24 grains.	De 6 à 12 décigr.	En pilules.

à 7, 1/3; de 7 à 14, 1/2; de 14 à 20, 2/3; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINISTRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
»	»	»	
Quantité indéterminée.	»	Sur les ulcères fongueux, et atoniques.	(1) La gentiane entre dans la composition de la poudre antiarthritique du duc de Portland.
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	(2) M. Magendie dit avoir fait des expériences sur l'action du gentianin, mais comme cette substance ne paraît pas avoir été employée par les praticiens, nous ne pouvons indiquer aucune dose.
»	»	»	

Doses. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 3

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE. Poids anc.	Poids nouv.	MODE D'ADMINISTRATION.
Géranium Robert. *Geranium Robertianum.* Astringent. (1)	Herbe.	»	»	»
	Suc.	De 1 à 2 onces.	De 32 à 64 gramm.	En substance.
Germandrée. (Petit chêne). *Teucrium chamœdris.* Tonique.	Plante.	De 2 à 4 gros.	De 4 à 8 gramm.	En infusion aqueuse ou en macération vineuse
	Extrait.	De 18 à 24 grains.	De 9 à 12 décigr.	En pilules.
	Poudre.	De 1 à 2 gros.	De 4 à 8 gramm.	En pilules, opiat ou délayée.
Gingembre. *Zingiber officinale.* Tonique, aromatique (2).	Racine.	De 1 à 2 gros.	De 4 à 8 gramm.	En infusion.
	Poudre.	De 18 à 36 grains.	De 1 à 2 gramm.	En pilules, opiat.
	Sirop.	De 2 à 4 gros.	De 8 à 16 gramm.	En potion.
	Teinture.	De 1 à 2 gros.	De 4 à 8 gramm.	Dans les tisanes, les potions.

à 7, 1/3; de 7 à 14, 1/2; de 14 à 20, 2/3; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINISTRATION.	*REMARQUES.*
Poids anc.	Poids nouv.		
De 1 à 2 onces.	De 32 à 64 gramm.	En décoction, pour gargarisme.	
»	»	»	
»	»	»	(1) Les espèces de géranium *sanguineum*, *pratense*, *rotundifolium* et *cicutarium*, jouissent des mêmes propriétés que le robertianum.
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	(2) Le gingembre entre dans la composition de plusieurs préparations officinales: la *thériaque*, le *diascordium*, et dans beaucoup d'autres électuaires.
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	

Doses. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 3

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE. Poids anc.	Poids nouv.	MODE D'ADMINISTRATION.
Ginseng. *Panax quinquefolium.* Aromatique (1).	Racine.	De 2 à 4 gros.	De 8 à 16 gramm.	En décoction.
	Poudre.	De 1 à 2 gros.	De 4 à 8 gramm.	En pilules, opiat.
	Extrait.	De 36 grains à 1 gros.	De 2 à 4 gramm.	En pilules.
	Teinture.	De 36 grains à 2 gros.	De 2 à 8 gramm.	Dans les potions.
Girofle (Clous de) *Caryophyllus aromaticus.* Aromatique, stimulant (2).	Poudre.	De 4 à 8 grains.	De 2 à 4 décigr.	Mêlée à du sucre.
	Huile volatile.	»	»	»
	Teinture.	De 12 à 24 gouttes	»	En potion.
Globulaire (Turbith blanc). *Globularia alypum.* Purgatif.	Feuilles.	De 4 gros à 1 once.	De 16 à 32 gramm.	En infusion (3).
	Extrait.	De 36 grains à 1 gros.	De 2 à 4 gramm.	En pilules.

à 7, 1/3; de 7 à 14, 1/2; de 14 à 20, 2/3; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINISTRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
»	»	»	
»	»	»	(1) On trouve dans le commerce une racine qui a des rapports avec la précédente; c'est la racine du *ninsin* (*sium ninsi*), plante de la Chine.
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
Quantité indéterminée.	»	Pour aromatiser la poudre dentifrice et cautériser les dents carriées.	(2) Les clous de girofle entrent dans diverses préparations officinales, telles que le *laudanum*, le *vinaigre* dit *des quatre-voleurs*, l'*élixir de Mynsicht*.
»	»	»	
»	»	»	(3) On administre cette infusion par tasse, toutes les demi-heure, jusqu'à ce qu'elle produise un effet purgatif.
«	»	»	

Doses. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 4

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE. Poids anc.	Poids nouv.	MODE D'ADMINISTRATION.
GLUTEN. *Gluten* (1).	»	»	»	»
GOMME ADRAGANTE. *Gummi tragacantha.* Adoucissant, mucilagineux.	Poudre.	De 18 à 36 grains.	De 1 à 2 gramm.	Dans les potions.
	Sirop	De 1 à 2 onces.	De 32 à 64 gramm.	En potion, en tisane.
GOMME AMMONIAQUE. *Gummi ammoniacum.* Expectorant, excitant.	Poudre.	De 12 à 24 grains.	De 6 à 12 décigr.	En potion, pilules.
	Teinture.	De 36 grains à 1 gros.	De 2 à 4 gramm.	Dans les potions.
GOMME ARABIQUE (2). *Gummi arabicum.* Adoucissant.	Poudre.	De 4 gros à 1 once.	De 16 à 32 gramm.	En décoction.
	Sirop.	De 2 à 4 onces.	De 64 à 128 gram.	En tisane, etc.
	Tablettes.	De 2 à 4 gros.	De 8 à 16 gramm.	En nature.

à 7, 1/3 ; de 7 à 14, 1/2, de 14 à 20, 2/3; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINISTRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
»	»	»	(1) Proposé par Taddeï comme contre-poison du perchlorure de mercure. L'action d'un grain de sublimé corrosif, selon ce praticien, est anéantie par 13 grains de gluten sec, 25 grains de gluten frais, ou par 7 à 8 gros de farine.
»	»	»	
»	»	»	
En quantité indéterminée, dissoute dans du vinaigre.	»	Pour former une espèce d'emplâtre qu'on applique sur les tumeurs.	
De 1 à 2 gros.	De 4 à 8 gramm.	En lavement.	
»	»	»	
»	»	»	(2) M. Braconnot a formé une *gomme artificielle*, en traitant la *matière ligneuse* du bois, de la toile, de la paille, par l'acide sulfurique. Cette matière gommeuse se convertit ensuite en sucre.
»	»	»	

Doses. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 3

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE. Poids anc.	Poids nouv.	MODE D'ADMINISTRATION.
Gomme gayac. *Voy.* Gayac.	»	»	»	»
Gomme gutte. *Gummi gutta.* Drastique, anthelmintique. Vénéneux (1).	Poudre.	De 2 à 8 grains.	De 1 à 4 décigr.	Mêlée à du sucre, ou à une poudre inerte.
Gomme kino. *Kino.* Astringent (2).	En substance.	De 4 à 8 gros.	De 16 à 32 gramm.	En infusion.
	Poudre.	De 18 à 36 grains.	De 1 à 2 gramm.	En pilules.
	Teinture.	De 1 à 4 gros.	De 4 à 16 gramm.	Dans les tisanes.
Gomme Sénégal. *Voy.* Gomme arabique.	»	»	»	»
Goudron. *Pix navalis.* Stimulant.	En substance.	De 2 gros à 1 once.	De 8 à 32 gramm.	En macération pour faire l'eau de goudron.

à 7, 1/3; de 7 à 14, 1/2; de 14 à 20, 2/3; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINISTRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	(1) On combat les accidens produits par la gomme gutte à trop haute dose par les adoucissans, les fomentations les lavemens émolliens, et même les saignées. Si la substance vénéneuse n'a point été évacuée, ou donne avec succès les décoctions de café à l'intérieur ou en lavement.
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	(2) La gomme kino n'est ni une gomme, ni une résine; mais un extrait sec obtenu de l'infusion ou de la décoction aqueuse évaporée jusqu'à siccité, des tiges et des jeunes feuilles de certains arbres encore mal déterminés, et dont le plus connu est le *nauclea gambir*.
En quantité indéterminée.	»	Comme topique; dans les onguens.	

Doses. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes) ; de 1 à 3, 1/6 ; de 3

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE. Poids anc.	Poids nouv.	MODE D'ADMINISTRATION.
GOUET. *Arum maculatum.* *Voy.* Pied de veau.	»	»	»	»
GRATIOLE. *Gratiola officinalis.* Émétique, drastique. VÉNÉNEUX (1).	Herbe.	De 1 à 2 gros.	De 4 à 8 gramm.	En infusion.
	Poudre.	De 18 à 36 grains.	De 1 à 2 gramm.	En pilules.
	Extrait.	De 4 à 12 grains.	De 2 à 6 décigr.	*Idem.*
GREMIL. *Lithospermum officinale.* Diurétique.	Herbe.	De 2 à 4 onces.	De 64 à 128 gram.	En décoction.
	Semences.	De 4 gros. à 1 once.	De 16 à 32 gramm.	En émulsion.

à 7, 1/3 ; de 7 à 14, 1/2 ; de 14 à 20, 2/3 ; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINISTRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv		
»	»	»	
De 2 à 4 gros.	De 8 à 16 gramm.	En lavement.	
»	»	»	
»	»	»	(1) La gratiole est un médicament très-actif, mais sujet à produire de graves accidens, comme des vomissemens, des démangeaisons insupportables, surtout aux organes génitaux; on a même prétendu que cette plante donne lieu à des accès de nymphomanie. Les *antidotes* de la *gratiole* sont les mêmes que ceux de la *gomme gutte*. L'extrait de gratiole à petites doses n'est pas purgatif; c'est peut-être la seule manière de l'administrer avec sécurité.
»	»	»	
»	»	»	

DOSES. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes) ; de 1 à 3, 1/6 ; de 3

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE. Poids anc.	Poids nouv.	MODE D'ADMINISTRATION.
GRENADIER. *Punica granatum.* Astringent et tœnifuge (1).	Écorce de la racine.	2 onces.	64 gramm.	En décoction réduite d'un tiers.
	Fleurs.	De 2 à 4 gros.	De 8 à 16 gramm.	En décoction.
	Écorce du fruit.	«	»	»
	Suc du fruit.	De 1 à 2 onces.	De 32 à 64 gramm.	Mêlé à du sucre.
	Sirop.	De 2 à 3 onces.	De 64 à 96 gramm.	Dans les tisanes.
GROSEILLER. *Ribes rubrum.* Rafraîchissant.	Suc du fruit.	De 2 à 4 onces.	De 64 à 128 gram.	En nature.
	Sirop.	De 2 à 4 onces.	De 64 à 128 gram.	En tisane.
GRUAU. *Grutum.* Adoucissant.	En substance.	De 1 à 2 onces.	De 32 à 64 gram.	En décoction.
	Sirop.	De 1 à 2 onces.	De 32 à 64 gramm.	Dans les tisanes.

à 7, 1/3; de 7 à 14, 1/2; de 14 à 20, 2/3; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINISTRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
»	»	»	
De 4 gros à 1 once.	De 16 à 32 gramm.	En gargarisme, lavemens, lotions, injections.	(1) L'écorce de la racine de grenadier doit être privée de la *partie ligneuse*, qui, comme dans la plupart des autres racines, est presque entièrement dépourvue de propriétés actives. Selon M. *Mitouart*, cette racine contient du *tannin* et de l'*acide gallique*, une matière analogue à la cire, une substance sucrée, en partie soluble dans l'alcool, en partie dans l'eau.
De 3 à 6 gros.	De 12 à 24 gramm.	*Idem.*	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	

Doses. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes) ; de 1 à 3, 1/6 ; de

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS. médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE, Poids anc.	Poids nouv.	MODE D'ADMINISTRATION.
Gui de chêne. *Viscum album.* Astringent, antispasmodique (1).	Tiges.	De 1 à 2 onces.	De 32 à 64 gramm.	En décoction.
	Tiges en poudre.	De 1 à 2 gros.	De 4 à 8 gramm.	En pilules.
	Extrait.	De 1 à 2 gros.	De 4 à 8 gramm.	*Idem.*
Guimauve. *Althæa officinalis.* Émollient, adoucissant (2).	Racine.	De 4 gros à 1 once.	De 16 à 32 gramm.	En décoction.
	Feuilles.	»	»	»
	Fleurs.	De 2 à 4 gros.	De 8 à 16 gramm.	En infusion.
	Sirop.	De 2 à 4 gros.	De 64 à 128 gram.	Dans les tisanes.

à 7, 1/3; de 7 à 14, 1/2; de 14 à 20, 2/3; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINISTRATION.	*REMARQUES.*
Poids anc.	Poids nouv.		
»	»	»	
»	»	»	(1) Le gui est un médicament qui ne manque pas d'une certaine activité, et qu'on a abandonné à tort. Les propriétés médicales de ce végétal résident principalement dans l'écorce des tiges ; il entre dans la composition de la poudre de *guttette;* on l'a vanté contre l'épilepsie.
»	»	»	
De 1 2 onces.	De 32 à 64 gramm.	En décoction.	
Idem.	*Idem.*	*Idem.*	(2) Il existe dans la guimauve un principe particulier d'abord appelé *althéine*, et ensuite désigné sous le nom d'*asparagine* par M. Plisson qui a fait de nouvelles expériences sur cette racine.
De 1 2 onces.	De 32 à 64 gramm.	*Idem.*	
»	»	»	

DOSES. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 3

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE. Poids anc.	Poids nouv.	MODE D'ADMINISTRATION.
HERBES (1).				
HERMODACTES. *Hermodactyli.* Laxatif.	En substance.	De 1/2 gros à 1 gros.	De 2 à 4 gramm.	En infusion.
	Poudre.	*Idem.*	*Idem.*	En pilules, etc.
HIÈBLE. *Sambucus ebulus.* Émétique, purgatif, diurétique et diaphorétique.	Feuilles.	»	»	»
	Fleurs.	De 3 à 4 gros.	De 12 à 16 gramm.	En infusion théiforme.
	Racine.	De 1 à 2 gros.	De 4 à 8 gramm.	En infusion
	Deuxième écorce.	De 1 à 2 gros.	De 4 à 8 gramm.	*Idem.*
	Rob.	1 once.	32 gramm.	En substance.
	Semences.	De 3 à 4 gros.	De 12 à 16 gramm.	En infusion aqueuse ou vineuse.
	Suc de la racine.	De 4 gros à 1 once.	De 16 à 32 gramm.	En substance.

à 7, 1/3; de 7 à 14, 1/2; de 14 à 20, 2/3; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINISTRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
»	»	»	(1) On a donné le nom d'*herbes*, aux plantes annuelles qui perdent ordinairement leur tige et leur feuillage en hiver, et n'acquièrent jamais une consistance ligneuse; ainsi on appelle *Herbe des aulx*, l'alliaire; *Herbe à cailler*, le galliet; *Herbe aux cancers*, la dentelaire; *Herbe au chantres*, le vélard; *Herbe aux charpentiers*, *aux coupures*, ou *à éternuer*, la millefeuille; *Herbe aux chats*, la cataire; *Herbe aux chèvres*, le galega; *Herbe aux cors*, la joubarbe; *Herbe aux cuillers*, le cochléaria; *Herbes aux écrouelles*, la scrophulaire; *Herbe à l'esquinancie*, ou *à Robert*, le géranium à Robert; *Herbe à la fièvre*, la petite centaurée et autres amers; *Herbe à la goutte*, le rossolis; *Herbe aux gueux*, la clématite; *Herbe de Guinée*, le panic; *Herbe aux hémorroïdes*, la ficaire; *Herbe des murailles*, la pariétaire; *Herbe à pauvre homme*, la gratiole: *Herbe aux per-*
»	»	»	
Quantité indéterminée.	»	En cataplasmes, lotions, fomentations.	
De 1 à 2 onces.	De 32 à 64 gramm.	En lotions.	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	

DOSES. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 3

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS. medicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE. Poids anc.	Poids nouv.	MODE D'ADMINISTRATION.
HOUBLON. *Humulus lupulus.* Amer et tonique (1).	Cônes.	De 4 gros à 1 once.	De 16 à 32 gramm	En infusion.
	Extrait.	De 18 grains à 1 gros.	De 1 à 4 gramm.	En bols.
	Poudre.	De 1 à 2 gros.	De 4 à 8 gramm.	En pilules.
	Suc des feuilles.	De 2 à 4 onces.	De 64 à 128 gram.	En substance.
	Teinture.	De 1 à 2 gros.	De 4 à 8 gramm.	Dans les tisanes.
	Turions.	De 1 à 2 onces.	De 32 à 64 gramm.	En décoction.
HOUX ÉPINEUX. *Ilex aquifolium.* Diurétique, urgatif (2).	Feuilles.	De 2 gros à 1 once.	De 8 à 32 gramm.	*Idem.*
	Écorces.	De 2 gros à 1 once.	De 8 à 32 gram.	*Idem.*
	Racine.	De 2 gros à 1 once.	De 8 à 32 gramm.	*Idem.*

7, 1/3; de 7 à 14, 1/2; de 14 à 20, 2/3; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINISTRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
uantité indéterminée.	»	En cataplasme, ou infusé dans la bière, pour fomentation.	*les*, le grémil ; *Herbe aux poux*, le staphysaigre; *Herbe de la Saint-Jean*, l'armoise ; *Herbe aux teigneux*, la bardane, etc., etc. *Voy.* ces différens mots.
»	»		
»	»	»	(1) La matière jaune qu'on recueille sur les écailles des cônes, est la partie active de la plante, on l'a nommée *Lupuline*. *Voy.* ce mot.
»	»	»	
De 2 à 4 gros.	De 8 à 16 gramm.	Sur des cataplasmes.	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	(2) On assure que les fruits ou baies purgent comme ceux de Nerprun, au nombre de dix à douze.

Doses. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 3

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE. Poids anc.	Poids nouv.	MODE D'ADMINISTRATION.
Houx (Petit). *Ruscus aculeatus.* Diurétique (1).	Racine.	De 4 gros à 2 onces.	De 16 à 64 gramm.	En décoction.
	Extrait.	De 18 grains à 1 gros.	De 1 à 4 gramm.	En bols.
	Poudre.	De 18 grains à 1 gros.	De 1 à 4 gramm.	*Idem.*
	Vin.	De 2 à 4 onces.	De 64 à 128 gram.	En substance.
HUILES (2).				
Huile animale de Dippel. *Oleum pyrozoonicum.* Stimulant, antispasmodique.	En substance.	De 6 à 30 gouttes.	»	En émulsion ou sur du sucré.
Huile d'Aspic. *Voy.* Lavande.	»	»	»	»
Huile de Cajeput. *Oleum Cajeput.* Stimulant, diffusible (3).	En substance.	A la dose de 4 à 6 gouttes.	»	Dans les infusions aromatiques.

à 7, 1/3; de 7 à 14, 1/2; de 14 à 20, 2/3; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINISTRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
»	»	»	
»	»	»	(1) La racine de petit houx est une des cinq *racines dites apéritives*.
»	»	»	
»	»	»	
En dissolution dans l'eau, ou incorporée dans l'axonge.	»	Proposé contre les dartres, les rhumatismes.	(2) Nous renvoyons, sauf quelques exceptions, pour les huiles, aux végétaux qui les fournissent. Exemple : *Huile d'amandes*, *voy.* Amandes ; *Huile de Palma-Christi*, *voy.* Ricin.
»	»	»	
En quantité indéterminée.	»	Pour cautériser le nerf dentaire.	(3) L'huile de *cajeput* est fournie ou par les semences de l'*amomum cardamomum*, ou par les feuilles du *malaleuca leucadendron*; elle nous vient des Moluques.

Doses. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes) ; de 1 à 3, 1/6; de 3

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MODE D'ADMINISTRATION.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE. Poids anc.	Poids nouv.	MODE D'ADMINISTRATION.
HUILE D'OLIVES CAMPHRÉE. *Oleum camphoratum.* Stimulant.	En substance.	»	»	»
HUILE DE PÉTROLE. *Oleum Petroleum.* Stimulant.	*Idem.*	De 8 à 15 gouttes.	»	En émulsion ou sur du sucre.
HUILE DE VITRIOL. *Voy.* Acide sulfurique.	»	»	à	»
HYDRIODATE DE POTASSE. *Hydriodas potassæ.* Excitant.	*Idem.*	»	»	»
HYDRIODATE DE POTASSE IODURÉ *Hydriodas potassæ ioduratus.* Stimulant.	En solution (2).	De 4 à 10 gouttes.	»	Dans les potions, tisanes.

à 7, 1/3; de 7 à 14, 1/2; de 14 à 20, 2/3; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINISTRATION.	*REMARQUES.*
Poids anc.	Poids nouv.		
De 1 à 2 onces.	De 32 à 64 gramm.	En liniment.	(1) Il y a une autre huile camphrée qu'on prépare avec l'huile de camomille, et qu'on appelle *huile de camomille camphrée;* on l'emploie de la même manière que la précédente.
De 1 à 2 gros.	De 4 à 8 gramm.	En frictions.	
»	»	»	
De 36 grains à 1 gros.	De 2 à 4 gramm.	Dans 1 once d'axonge pour linim.	
De 36 grains à 1 gros.	De 2 à 4 gramm.	*Idem.*	(2) La solution se fait, d'après M. Magendie, dans les proportions suivantes : Hydriodate de potasse ioduré. . . . . 36 grains. Eau distillée. . . . 1 once.

Doses. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes) ; de 1 à 3, 1/6 ; de 3

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE. Poids anc.	Poids nouv	MODE D'ADMINISTRATION.
HYDROCHLORATE D'AMMONIAQUE. *Hydrochloras ammoniæ.* Stimulant et diaphorétique.	En substance.	De 10 à 24 grains.	De 5 à 12 décigr.	Dans les tisanes.
HYDROCHLORATE D'AMMONIAQUE ET DE FER. *Hydrochloras ferri ammoniacalis.* Stimulant.	*Idem.*	De 4 à 12 grains.	De 2 à 6 décigr.	En pilules, potions, tisanes.
HYDROCHLORATE DE BARYTE. *Hydrochloræs barii.* Excitant. VÉNÉNEUX (1).	*Idem.*	D'un 5e de grain à 2 grain.	De 1 à 10 centigr.	Dans de l'eau distillée (2).

à 7, 1/3; de 7 à 14, 1/2; de 14 à 20, 2/3; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINISTRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
De 2 à 8 onces.	De 64 à 250, gram.	En bains généraux, locaux, lotions, fomentations, sachets.	
»	»	»	(1) Les premiers secours à donner consistent à administrer les solutions préparées avec des sulfates de potasse de soude, ou de magnésie.
»	»	»	(2) Le Codex prescrit la solution suivante : Hydrochlorate de baryte. . . . . 10 grains. Eau. . . . . 50 grains. On la donne à la dose de 2 à 6 gouttes. Crawford, qui le premier a employé ce sel, l'administrait en solution très-saturée à la dose de 8 à 30 gouttes par jour; mais ce moyen est très-infidèle.

Doses. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 4, 1/6; de 3

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE. Poids anc.	Poids nouv.	MODE D'ADMINISTRATION.
HYDROCHLORATE DE CHAUX. *Hydrochloras calcis.* Stimulant. VÉNÉNEUX à haute dose.	En solution.	De 36 grains à 1 gros.	De 1 à 4 gramm.	Dans des potions, tisanes.
HYDROCHLORATE DE CINCHONINE. *Hydrochloras cinchoninæ.* Fébrifuge, tonique.	En substance.	De 4 à 12 grains.	De 2 à 6 décigr.	En bols.
HYDROCHLORATE DE MORPHINE. *Hydrochloras morphinæ.* Calmant (1).	*Idem.*	De 1/5 à 3/5 de gr.	De 1 à 3 centigr.	En pilules.

à 7, 1/3; de 7 à 14, 1/2; de 14 à 20, 2/3; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINISTRATION.	*REMARQUES.*
Poids anc.	Poids nouv.		
»	»	»	(1) Ce sel, comme le précédent, a été vanté dans les engorgemens lymphatiques chroniques, les affections scrophuleuses; il doit être administré avec précaution.
»	»	»	
»	»	»	(1) Ce sel a l'avantage sur l'acétate de morphine, d'être plus fixe dans ses élémens qui se trouvent en même temps dans des proportions plus constantes.

Doses. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 3

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE. Poids anc.	Poids nouv.	MODE D'ADMINISTRATION.
HYDROCHLORATE D'OR. *Hydrochloras auri.* Excitant, anti-vénérien. VÉNÉNEUX.	En substance.	D'un 15e de grain à un 10e par jour.	»	Dans des tablettes et dans des sirops.
HYDROCHLORATE D'OR ET DE SOUDE. *Hydrochloras auri et sodæ.* Excitant, anti-vénérien. VÉNÉNEUX (1).	*Idem.*	*Idem.*	»	*Idem.*
HYDROCHLORATE DE POTASSE. *Hydrochloras potassæ.* Fébrifuge.	*Idem.*	De 4 gros à 1 once.	De 16 à 32 gramm.	En tisanes.

à 7, 1/3; de 7 à 14, 1/2; de 15 à 20, 2/3; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINISTRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
D'un 15e de grain à un 10e par jour.	»	En frictions sur la langue et les gencives.	(1) L'usage externe de ce sel doit être préféré à l'usage interne; la quantité employée pour chaque malade est de 4 à 5 grains pendant six semaines ou deux mois que dure le traitement. Les substances que nous avons indiquées comme véhicules doivent être exclusivement employées, pour éviter la décomposition du médicament. Les *antidotes* de l'hydrochlorate d'or sont les mêmes que pour les autres sels âcres et corrosifs.
Idem.	»	Uni à 4, 6 8, 10, 12 et 15 fois son poids de poudre de Lycopode, ou d'amidon lavés à l'alcool.	
»	»	*Idem.*	

Doses. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 3

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE. Poids anc.	Poids nouv.	MODE D'ADMINISTRATION.
HYDROCHLORATE DE SOUDE. *Hydrochloras sodæ.* Excitant, purgatif (1).	En substance.	De 4 gros à 1 once.	De 16 à 32 gramm.	En tisane.
HYDROMEL. *Hydromel.* Adoucissant, délayant.	Simple.	De 2 à 3 livres.	De 1000 à 1500 gram.	Pour tisane.
	Vineux.	De 8 onces à 1 livre.	De 250 à 500 gram.	»
HYSOPE. *Hyssopus officinalis.* Tonique, stimulant.	Les feuilles et les fleurs.	De 2 à 4 gros.	De 8 à 16 gramm.	En infusion.
	Eau distillée.	De 1 à 2 onces.	De 32 à 64 gramm.	En potion.
	Huile volatile.	De 2 à 5 gouttes.	»	Sur du sucre ou en émulsion.
	Sirop.	De 2 à 3 onces.	De 64 à 96 gramm.	Dans les potions, tisanes.

à 7, 1/3 ; de 7 à 14, 1/2 ; de 14 à 20, 2/3 ; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINISTRATION.	*REMARQUES.*
Poids anc.	Poids nouv.		
De 1 à 2 onces.	De 32 à 64 gramm.	En lavement, en lotions, bains, etc.	(1) La solution d'hydrochlorate de soude est un excellent contre poison à employer pour combattre les accidens qui resultent de l'introduction d'un sel soluble d'argent, dans l'économie animale.
»	«	»	
»	»	»	
De 1 à 2 onces.	De 32 à 64 gramm.	En décoction, pour lavemens, fomentations, lotions.	
Quantité indéterminée.	»	Pour collyres.	
»	»	»	
»	»	»	

Doses. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 3

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE. Poids anc.	Poids nouv.	MODE D'ADMINISTRATION.
Ichthyocolle. *Ichthyocolla.* Adoucissant, mucilagineux (1).	Incisée.	»	»	»
	Gelée.	De 2 à 4 onces.	De 64 à 128 gram.	Par cuillerées.
Impératoire. *Imperatoria obsthrutium.* Stimulant (2).	Racine.	De 2 à 4 gros.	De 8 16 gramm.	En infusion aqueuse ou vinense.
	Poudre.	De 18 grains à 1 gros.	De 1 à 4 gramm.	En pilules, opiat.
Iodate de zinc. *Iodas zinci.* Stimulant, excitant.	En substance.	»	»	»
Iode. *Iodes.* Stimulant.	*Idem.*	»	»	»
	Teinture alcoolique.	De 4 à 10 gouttes.	»	Répétées plusieurs fois par jour dans 1 verre d'eau sucrée (3).
	Teinture éthérée.	De 4 à 10 gouttes.	»	Dans 1 verre d'eau sucrée.

à 7, 1/3 ; de 7 à 14, 1/2 ; de 14 à 20, 2/3 ; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINISTRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv		
De 2 à 4 gros.	De 8 à 16 gramm.	En décoction, pour lavemens.	
»	»	»	(1) Un gros de colle de poisson peut absorber, 3 onces d'eau et fournir une décoction qui par le refroidissement se prend en gelée. Ainsi, pour faire une livre de gelée il faut employér 5 gros 1/2 d'ichthyocolle.
De 4 gros à 1 once.	De 16 à 32 gramm.	En décoction.	
»	»	Pour gargarisme.	
De 36 grains à 1 gros.	De 2 à 4 gramm.	Avec 1 once d'axonge, en pommade, pour frictions.	(2) Quoique cette plante soit très-active, elle est néanmoins presque entièrement abandonnée, et on la remplace généralement par la racine d'angélique, qu'il est beaucoup plus facile de se procurer
De 18 grains à 1/2 gros.	De 1 à 2 gramm.	Mêlée à 1 once d'axonge pour pommade.	
»	»	»	
»	»	»	(3) On peut porter la dose de cette teinture jusqu'à 1 gros et plus, sans aucun inconvénient.

Doses. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 3

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS. médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE. Poids anc.	Poids nouv.	MODE D'ADMINISTRATION.
IODURE D'ARSENIC. *Ioduretum arsenici.* Anti-herpétique.	En substance.	»	»	»
IODURE DE MERCURE (Proto-). *Proto-ioduretum hydrargyri.* Anti-syphilitique.	*Idem.*	1 grain.	5 centigr.	Pour 8 pilules (1).
IODURE DE MERCURE (Deuto-). *Deuto-ioduretum hydrargyri.* Anti-syphilitique.	*Idem.*	1 grain.	5 centigr.	*Idem* (2).
	Teinture alcoolique.	De 10 à 20 gouttes.	»	Dans 1 verre d'eau distillée.
	Teinture éthérée.	De 5 à 10 gouttes.	»	*Idem.*

à 7, 1/3; de 7 à 14, 1/2; de 14 à 20, 2/3; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINISTRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids no uv.		
De 2 à 3 grains.	De 10 à 15 centigr.	Mêlée à 1 once d'axonge.	
De 12 18 grains.	De 6 à 9 décigr.	En pommade, avec 1 once 1/2 d'axonge.	(1) On en prend 2 le matin et 2 le soir. Cette dose peut être doublée. (2) La note précédente se rapporte également au deuto-iodure.
De 12 18 grains.	De 6 à 9 décigr.	*Idem.*	
»	»	«	
»	»	»	

Doses. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; dé

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE. Poids anc.	Poids nouv.	MODES D'ADMINISTRATIONS
IPÉCACUANHA. *Cephælis ipecacuanha.* Émétique.	Racine.	De 36 grains à 1 gros.	De 2 à 4 gramm.	En infusion dans 4 onces d'eau (1).
	Poudre.	De 12 à 36 grains.	De 6 décigr. à 2 gramm.	Délayé dans de l'eau, en 3 doses.
	Pastilles.	De 4 à 8.	»	Dans le courant de la journée.
	Sirop.	De 1 à 2 onces.	De 32 à 64 gramm.	En plusieurs fois.
	Teinture.	De 4 gros à 1 once.	De 16 à 32 gramm.	Dans des sanes et lo tions.
	Vin (2).	De 1 à 2 onces.	De 32 à 64 gramm.	Par cuill rées à div ses époqu de la jou née.

à 7, 1/3 ; de 7 à 14, 1/2 ; de 14 à 20, 2/3 ; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINISTRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
»	»	»	
»	»	»	(1) On prend de cette infusion jusqu'à ce qu'elle détermine le vomissement.
»	»	»	
»	»	»	
»	»		
»	»	»	
			(2) Le vin a été désigné sous le nom de *vin du Brésil.*

Doses. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 3

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE. Poids anc.	Poids nouv.	MODE D'ADMINISTRATION.
Iris commun. *Iris germanica.* Excitant, purgatif (1).	Racine.	De 1 à 2 gros.	De 4 à 8 gramm.	En infusion
	Poudre.	De 18 à 36 grains.	De 1 à 2 gramm.	En opiat, e pilules.
	Suc.	De 4 gros à 1 once.	De 16 à 32 gramm.	En nature e par cuille rées.
	Vin.	De 2 à 4 onces.	De 64 à 128 gram.	»
Iris de Florence. *Iris Florentina.* Stimulant, diurétique (2).	Poudre de la racine.	De 16 à 24 grains.	De 8 à 12 décigr.	En pilules ou delayé (3).
	Suc.	De 1 à 2 onces.	De 32 à 64 gramm.	Par cuillerée dans le con rant de journée, mêlé à d vin blanc.

à 7, 1/3; de 7 à 14, 1/2; de 14 à 20, 2/3; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINISTRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
»	»	»	
»	»	»	(1) *L'iris tuberosa* et *l'iris pseudo-acorus* jouissent des mêmes propriétés et sont employées de la même manière.
»	»	»	
»	»	»	
»	»	«	(2) L'*iris* germanique, l'*iris* des marais, l'*iris* fétide, jouissent des mêmes propriétés qu l'*iris* de Florence.
»	»	»	
			(3) Des auteurs indiquent cette poudre comme drastique à la dose de 4 gros à 1 once 1/2.

Doses. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes) ; de 1 à 3, 1/6 ; de 3

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE. Poids anc.	Poids nouv.	MODE D'ADMINISTRATION.
IVETTE. *Teucrium chamæpitys.* Amer, aromatique.	Herbe.	De 4 gros à 1 once.	De 16 à 32 gramm.	En infusion.
	Poudre.	De 36 grains à 1 gros.	De 2 à 4 gramm.	En pilules.
	Extrait.	De 36 grains à 1 gros.	De 2 à 4 gramm.	*Idem.*
	Suc.	De 3 à 4 onces.	De 96 à 128 gram.	En nature.
JACÉE DES PRÉS. *Centaurea jacea.* Amer et astringent.	Feuilles.	De 4 gros à 1 once.	De 16 à 32 gramm.	En décoction.
JALAP. *Convolvulus jalapa.* Purgatif drastique.	Poudre.	De 12 à 36 grains.	De 6 à 18 décigr.	Délayée convenablement
	Extrait.	De 6 à 12 grains	De 3 à 6 décigr.	En pilules.
	Résine.	De 6 à 12 grains.	De 3 à 6 décigr.	En émulsion et pilules.
	Teinture.	De 18 à 36 grains.	De 1 à 2 gramm.	En potion (1

à 7, 1/3; de 7 à 14, 1/2; de 14 à 20, 2/3; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINISTRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
De 1 à 2 onces.	De 32 à 64 gramm.	En décoction, pour gargarisme.	(1) La teinture de jalap a beaucoup d'analogie avec le principe actif d'un médicament malheureusement trop connu, et qui est désigné sous le nom de *médecine de Leroy*. Beaucoup de médecins pensent même que la résine de jalap fait la base de ce drastique. La teinture de jalap est un médicament infidèle; il arrive quelquefois, quand on l'administre à l'intérieur, que les fluides contenus dans l'estomac précipitent la résine dissoute dans l'alcool et causent des accidens. On remédie à ces accidens par les moyens employés contre les autres substances âcres et vénéneuses.
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	

Doses. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 3

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE. Poids anc.	Poids nouv.	MODE D'ADMINISTRATION.
Jalap (Faux). *Mirabilis jalapa.* Purgatif (1).	Extrait résineux.	De 18 à 36 grains.	De 1 à 2 gramm.	En potion, en pilules.
Jean de Lopès (Racine de). *Radix Lopeziana.* Astringent.	Racine.	De 4 gros à 1 once.	De 16 à 32 gramm.	En infusion
	Poudre.	De 18 à 36 grains.	De 1 à 2 gramm.	En pilules, opiat, ou délayée.
Joubarbe. *Sempervivum tectorum.* Rafraîchissant (2).	Feuilles.	»	»	»
	Suc des feuilles.	De 2 à 3 onces.	De 64 à 96 gramm	En nature.
Jujube (Fruit du jujubier). *Rhamnus zizyphus.* Adoucissant.	Fruit.	De 1 à 3 onces.	De 32 à 96 gramm.	En décoction.
	Pâte.	De 1 à 2 onces.	De 32 à 64 gramm.	En nature.
	Sirop.	De 1 à 3 onces.	De 32 à 96 gramm.	Dans les tisanes.

à 7, 1/3; de 7 à 14, 1/2; de 14 à 20, 2/3; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINISTRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
»	»	»	
»	»	»	(1) Le jalap a quelquefois été falsifié par la racine du *mirabilis*. Cette fraude est très-répréhensible, car les racines de cette plante ne jouissent pas de la propriété purgative à un aussi haut degré que celles du jalap.
»	»	»	
uantité indéterminée	»	En cataplasmes, broyées dans de l'huile d'olives.	
»	»		
»	»	»	(2) La joubarbe fait la base d'un remède populaire usité contre les brûlures. Ce remède se prépare en mêlant le suc de la plante à de l'huile d'olives, de noix, etc., battant jusqu'à ce que le mélange soit parfait.
»	»	»	
»	»	»	
	«	»	

Doses. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6 ; dé

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE. Poids anc.	Poids nouv.	MODE D'ADMINI TRATIO
JUSQUIAME NOIRE. *Hyosciamus niger.* Sédatif, narcotique. VÉNÉNEUX.	Feuilles et racine.	»	»	»
	Extrait préparé avec le suc.	De 1 à 4 grains.	De 5 à 20 centigr.	En pilu (1).
	Huile par macération.	»	»	»
	Poudre.	De 1 à 4 grains.	De 5 à 20 centigr.	En pilu
	Sirop.	De 4 gros à 1 once.	De 16 à 32 gramm.	Dans l tisanes
JUSQUIAME BLANCHE. Mêmes propriétés, usages et doses que la précédente.	»	»	»	»

à 7, 1/3 ; de 7 à 14, 1/2 ; de 14 à 20, 2/3 ; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINISTRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
4 onces.	128 gramm.	En cataplasme, en décoction pour un bain de vapeur.	
De 36 grains à 1 gros.	De 2 à 4 gramm.	En frictions.	(1) Ce médicament est infidèle, il agit diversement; nous pensons que cette infidélité dépend du mode de préparation qu'on emploie.
De 2 à 3 onces.	De 64 à 96 gramm.	En liniment.	
»	»	»	
»	»	»	(2) Suivant l'un de nous (A. Chevallier), le sirop de jusquiame doit être fait avec l'extrait obtenu du suc des feuilles de l'*hyosciamus albus*, et préparé à la vapeur. *Antidotes.* Vomissement pour faire rejeter le poison; boissons acidulées, forte décoction de café; excitans externes ou en lavemens.
»	»	»	

Doses. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 3

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE. Poids anc.	Poids nouv	MODE D'ADMINISTRATION.
KARABÉ. *Succinum.* *Voy* Succin. Excitant (1).	Sirop.	De 2 gros à 1 once.	De 8 à 32 gramm.	En potion.
KERMÈS ANIMAL. *Coccus ilicis.* Tonique (2).	Entier.	De 1 à 2 gros.	De 4 à 8 gramm	En infusion vineuse.
	Poudre.	De 12 à 24 grains.	De 6 à 12 décigr.	En opiat, en pilules.
	Sirop.	De 1 à 2 onces.	De 32 à 64 gramm.	Dans les tisanes.
KERMÈS MINÉRAL. *Voy.* Antimoine.	»	»	»	»
KINKINA. *Voy.* Quinquina.	»	»	»	»
KINO. *Voy.* Gomme kino.	»	»	»	»

à 7, 1/3; de 7 à 14, 1/2; de 14 à 20, 2/3; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINISTRATION.	*REMARQUES.*
Poids anc.	Poids nouv		
»	»	»	
»	»	»	(1) On a donné le nom de sirop de karabé à un sirop d'opium, fait dans les proportions suivantes : Sirop d'opium, 1 livre. Esprit de succin, 48 grains.
»	»	»	
»	»	»	(2) Le kermès animal est un insecte hémiptère qui vit sur le *quercus coccifera*, et qui a une grande ressemblance avec les cochenilles. C'est à cause de sa couleur d'écarlate qu'on lui a donné le nom de kermès.
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	

DOSES. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE. Poids anc.	Poids nouv.	MODE D'ADMINISTRATION.
LAITUE. *Lactuca sativa.* Adoucissant, légèrement narcotique.	Plante entière.	De 1 à 2 onces.	De 32 à 64 gramm.	En infusion et décoction.
	Eau distillée.	De 1 à 4 onces.	De 32 à 128 gram.	Dans les potions.
	Extrait mou.	De 12 à 20 grains.	De 6 à 10 décigr.	En pilules.
	Extrait sec (1).	De 2 à 8 grains.	De 1 à 4 décigr.	En pilules ou en dissolution dans un liquide.
LAITUE VIREUSE. *Lactuca virosa.* Antispasmodique, narcotique, VÉNÉNEUX.	Extrait.	De 2 à 6 grains.	De 1 à 3 décigr.	En pilules (2).

à 7, 1/3 ; de 7 à 14, 1/2 ; de 14 à 20, 2/3 ; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINISTRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
En quantité indéterminée.	»	En cataplasme, en décoction pour lavement.	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	(1) Cet extrait, obtenu des tiges fleuries, est connu sous le nom de *Lactucarium* et *de Thridace*. (2) Cet extrait peut successivement être porté à une dose plus forte ; il faut avoir égard à la manière dont il a été préparé. Celui qu'on obtient à l'aide de la vapeur est plus actif que l'extrait qui a été préparé à une température plus élevée.

Doses. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 3

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE. Poids anc.	Poids nouv.	MODE D'ADMINISTRATION.
LAUDANUM. *Laudanum.* Vin d'opium de Sydenham (1). Calmant, narcotique. VÉNÉNEUX (2).	En substance.	De 10 à 30 gouttes.	»	En potion.
	»	»	»	»
	»	»	»	»
LAUDANUM DE ROUSSEAU. *Opium de Rousseau.* Calmant narcotique. VÉNÉNEUX.	En substance.	De 8 à 15 gouttes.	»	Dans les potions.
LAURIER-CERISE. *Prunus laurocerasus.* Antispasmodique. VÉNÉNEUX (3).	Feuilles.	2 à 3 feuilles.	»	En infusion
	Eau distillée.	De 10 à 40 gouttes.	»	Dans les potions.

à 7, 1/3 ; de 7 à 14, 1/2 ; de 14 à 20, 2/3 ; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINISTRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
De 15 à 25 gouttes.	»	En lavement.	
Quantité indéterminée.	»	En friction, ou pour arroser des cataplasmes.	(1) Vingt gouttes contiennent un grain d'opium. (2) Pour les antidotes, *voy.* Opium.
De 36 grains à 1 gros.	De 2 à 4 gramm.	En collyres.	(3) La grande différence qui existe entre les diverses doses d'eau de laurier-cerise, indiquées par les auteurs, fait présumer que ses propriétés varient suivant la manière dont elle est préparée, son ancienneté, etc.; ainsi, tandis que les uns n'ont pas osé dépasser 20 ou 30 gouttes par jour, d'autres en ont administré jusqu'à 60, plusieurs fois dans la même journée. Il est certain, au reste, que la présence de l'acide hydrocyanique dans cette préparation la rend vénéneuse, et que de très-graves accidens sont résultés de son usage dans l'économie domestique. On doit donc l'employer avec circonspection. Ses *antidotes* sont les mêmes que ceux de l'acide hydrocyanique.
De 8 à 10 gouttes.	»	Dans les lavemens.	
»	»	»	
»	»	»	

Doses. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 3

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE. Poids anc.	Poids nouv.	MODE D'ADMINISTRATION.
LAURIER COMMUN, LAURIER FRANC *Laurus nobilis.* Excitant, stimulant.	Baies.	De 1 à 2 gros.	De 4 à 8 gramm.	En infusion.
	Huile de laurier par expression.	»	»	»
LAVANDE OFFICINALE. *Lavandula vera.* Stimulant.	Sommités fleuries.	De 1 à 2 gros.	De 4 à 8 gramm.	En infusion.
	Eau distillée.	De 1 à 3 onces.	De 32 à 96 gramm.	Dans les potions.
	Huile essentielle (2).	De 2 à 5 gouttes.	»	Sur du sucre ou en émulsion.
	Poudre.	De 18 à 36 grains.	De 1 à 2 gramm.	En pilules.
	Teinture.	De 36 grains à 1 gros.	De 2 à 4 gramm.	Dans des potions.
	Vinaigre.	De 2 gros à 1 once.	De 8 à 32 gramm.	En tisane.

à 7, 1/3; de 7 à 14, 1/2; de 14 à 20, 2/3; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINISTRATION.	*REMARQUES.*
Poids anc.	Poids nouv.		
De 4 gros à 1 once.	De 16 à 32 gramm.	En lotion, fumigation.	
De 4 gros à 1 once.	De 16 à 32 gramm.	En liniment. (1).	(1) L'huile de laurier du commerce n'est le plus souvent que de l'axonge, dans laquelle on a fait macérer les fruits de cet arbre.
De 1 à 3 onces.	De 32 à 96 gramm.	En lotions, fomentat., injection et lavement.	
»	»	»	
De 1 à 2 gros.	De 4 à 8 gramm.	En liniment	
»	»	»	(2) L'huile employée dans les arts sous le nom d'*huile de spic* et *d'aspic*, est obtenue de la lavande spic. *L. spica.*
De 2 à 4 gros.	De 8 à 16 gramm.	En frictions.	
De 1 à 2 onces.	De 32 à 64 gramm.	En lotion, fomentation, injections, et bains.	

Doses. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes) ; de 1 à 3, 1/6 ; de 3

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE. Poids anc.	Poids nouv.	MODE D'ADMINISTRATION.
Lichen d'Islande. *Lichen Islandicus.* Amer, mucilagineux (1).	Entier.	De 4 gros à 1 once.	De 16 à 32 gramm.	En décoction.
	Gelée.	De 2 à 4 onces.	De 64 à 128 gram.	En nature.
	Poudre.	De 36 grains à 1 gros.	De 2 à 4 gramm.	En opiat.
Lichen pixidé. *Scyphophorus pixidatus.* Amer, mucilagineux.	Entier.	De 4 gros à 1 once.	De 16 à 32 gramm.	En décoction.
	Poudre.	De 36 grains à 1 gros.	De 2 à 4 gramm.	En opiat.
Lichen pulmonaire. *Lichen pulmonarius.* Amer, mucilagineux.	Entier.	De 4 gros à 1 once.	De 16 à 32 gramm.	En décoction.
	Poudre.	De 36 à 72 grains.	De 2 à 4 gramm.	En pilules, opiat.
Lierre grimpant. *Hedera helix.* Amer, excitant, purgatif.	Baies en poudre.	De 12 à 24 grains.	De 6 à 12 décigr.	En pilules.
	Gomme de lierre.	De 18 grains à 1 gros.	De 1 à 4 gramm.	En bols, opiat.

à 7, 1/3 ; de 7 à 14, 1/2 ; de 14 à 20, 2/3 ; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINISTRATION.	*REMARQUES.*
Poids anc.	Poids nouv.		
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	(1) Cette plante qui, d'après l'analyse de *Berzélius*, contient 44 parties de fécule, et 3 parties de principe amer sur 100, est à la fois tonique et analeptique. Cette double propriété explique les grands avantages qu'on retire de ce médicament dans les affections chroniques de la poitrine, où il est à la fois urgent de fortifier et de nourrir les malades épuisés par la fièvre hectique, les sueurs abondantes, etc. Quand on veut priver le lichen de son principe amer plus ou moins excitant, il suffit de le faire macérer dans l'eau chaude rendue légèrement alcaline.
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	

Doses. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 3

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE. Poids anc.	Poids nouv.	MODE D'ADMINISTRATION.
Lierre terrestre. *Glechoma hederacea.* Excitant, tonique.	Feuilles et tiges.	De 4 gros à 1 once.	De 16 à 32 gramm.	En infusion
	Sirop.	De 1 à 3 onces.	De 32 à 96 gramm.	Dans les tisanes, potion
	Suc.	De 2 à 4 onces.	De 64 à 128 gram.	En nature
Lilas ordinaire. *Syringa vulgaris.* Tonique, fébrifuge (1).	Extrait des capsules vertes.	De 36 grains à 2 gros.	De 2 à 8 gramm.	En pilules, bols, opiat.
	Poudre des semences.	De 36 grains à 1 gros.	De 2 à 4 gramm.	En pilules
Limaçons. *Helix pomatia.* Mucilagineux.	Sirop.	De 2 à 4 onces.	De 64 à 128 gram.	Dans les tisanes, potion
Limon. *Citrus limonium.* Tonique, astringent.	Sirop des fruits.	De 1 à 3 onces.	De 32 à 96 gramm.	En limonade.

à 7, 1/3; de 7 à 14, 1/2; de 14 à 20, 2/3; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINISTRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	(1) M. *Cruveilhier*, professeur à la faculté de médecine de Paris, dans une brochure intitulée : *la Médecine pratique éclairée par l'anatomie et la physiologie*, dit avoir employé l'extrait des capsules de lilas avec un succès qu'il qualifie d'*extraordinaire*, dans six cas de fièvres intermittentes, quartes, rebelles. Deux gros d'*extrait mou* suffisaient pour faire cesser la fièvre, ce qui semblerait indiquer que cette substance est aussi active que le quinquina lui-même.
»	»	»	
»	«	»	

Doses. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 3

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE. Poids anc.	Poids nouv.	MODE D'ADMINISTRATION.
Lin cultivé. *Linum usitatissimum.* Émollient, mucilagineux.	Semences.	De 1 à 2 gros.	De 4 à 8 gramm.	En tisane par infusion ou décoction.
	Huile récente.	De 2 gros à 1 once.	De 8 à 32 gramm.	En émulsion.
Lin cathartique. *Linum catharticum.* Purgatif (1).	Plante.	De 2 à 4 gros.	De 8 à 16 gramm.	En infusion aqueuse, vineuse, et dans le petit-lait.
	Poudre.	De 18 grains à 1 gros.	De 1 à 4 gramm.	En pilules ou délayée.
Liqueur minérale d'Hoffmann. *Voy.* Éther sulfurique alcoolisé.	»	»	»	»

à 7, 1/3; de 7 à 14, 1/2; de 14 à 20, 2/3; de 20 à 60, la dose desa dultes

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINISTRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
De 4 à 8 gros.	De 16 à 32 gramm.	En décoction, pour fomentat., bain, lavement.	
De 1 à 2 onces.	De 32 à 64 gram.	En lavement, liniment.	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	(1) A plus forte dose, cette plante devient émétique; si on l'associe à la crème de tartre, on rend son action plus prompte et plus douce. Linné a fait un grand éloge de ce purgatif indigène, qui n'a pas encore été analysé.

DOSES. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE. Poids anc.	Poids nouv.	MODE D'ADMINISTRATION.
LIS. *Lilium candidum.* Adoucissant.	Fleur.	De 1 à 2 gros.	De 4 à 8 gramm.	En infusion
	Huile par macération.	»	»	»
	Pulpe des bulbes.	»	»	»
LIVÈCHE. *Ligusticum levisticum.* Stimulant.	Racine.	De 1 à 2 onces.	De 32 à 64 gramm.	En décoction.
	Racine en poudre.	De 36 grains à 1 gros.	De 2 à 4 gramm.	En bols, pilules.
	Semences entières.	De 2 à 4 gros.	De 8 à 16 gramm.	En infusion
	Poudre des semences.	De 36 grains à 1 gros.	De 2 à 4 gramm.	En pilules opiat.
LOBÉLIE SYPHILITIQUE. *Lobelia syphilitica.* Stimulant, très-âcre, réputé antisyphilitique. VÉNÉNEUX (1).	Racine.	De 2 à 4 gros.	De 8 à 16 gramm.	En décoction.
	Extrait.	De 6 à 18 grains.	De 3 à 9 décigr.	En pilules.

à 7, 1/3 ; de 7 à 14, 1/2 ; de 14 à 20, 2/3 ; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINISTRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
»	»	»	
De 2 à 4 onces.	De 64 à 128 gram.	En lavement, liniment et injection.	
De 4 à 6 onces.	De 128 à 192 gramm.	En cataplasme.	
»	»	»	(1) Cette plante nous vient du Canada, où elle jouit d'une grande réputation contre la syphilis. Les expériences faites en Europe lui ont été peu favorables. A petite dose, la lobélie est sudorifique ; à dose plus forte, purgative, et à très-grande dose, émétique ; elle mériterait d'être analysée et expérimentée de nouveau. Il y a une seconde espèce de lobélie (*lobelia urens*) qui croît communément en France, et qui probablement est douée des mêmes propriétés que la précédente ; elle est plus âcre et plus vénéneuse. Des accidens sont résultés de l'emploi de cette dernière espèce à haute dose.
»	»	»	
De 4 à 6 gros.	De 16 à 24 gramm.	En décoction, pour lavement.	
»	»	»	
uantité indéterminée.	»	En décoction, pour lotions.	
»	»	»	

Doses. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 3

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE. Poids anc.	Poids nouv.	MODE D'ADMINISTRATION.
Lupuline. *Lupulina.* Tonique (1).	En substance.	De 10 à 20 grains.	De 5 à 10 décigr.	En pilules.
	Extrait.	De 4 à 8 grains.	De 2 à 4 décigram.	*Idem.*
	Sirop.	De 1 à 2 onces.	De 32 à 64 gramm.	Dans les tisanes.
	Teinture.	De 1 à 2 gros.	De 4 à 8 gramm.	En potions, en tisane.
	Vin.	De 1 à 3 onces.	De 32 à 96 gramm	En nature.
Macis. (2e écorce du fruit du muscadier.) *Myristica moschata.* Stimulant (2).	Poudre.	De 6 à 12 grains.	De 3 à 6 décigr.	En pilules.
	Extrait,	De 6 à 12 grains.	De 3 à 6 décigr.	*Idem.*
	Huile volatile.	De 2 à 5 gouttes.	»	Sur du sucre ou en émulsion.
	Huile fixe.	»	»	»
	Teinture.	De 18 à 36 grains.	De 1 à 2 gramm.	En potion.

à 7, 1/3; de 7 à 14, 1/2; de 14 à 20, 2/3; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINISTRATION.	*REMARQUES.*
Poids anc.	Poids nouv.		
De 1 à 2 gros.	De 4 à 8 gramm.	En infusion. pour préparer une pommade.	(1) La lupuline est la partie active du houblon; elle se sépare des cônes lorsqu'ils sont secs. Pour l'obtenir, on jette ces cônes sur un tamis à travers lequel passe la lupuline; elle est d'une belle couleur jaune.
»	»		
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	(2) On a donné mal à propos au macis le nom de *fleurs de muscade*, à cause de la forme de cette écorce qui imite une corolle monopétale.
De 2 à 4 gros.	De 8 à 16 gramm.	Dans les pommades, en frictions.	
De 1 à 2 gros.	De 4 à 8 gramm.	En liniment.	

Doses. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 3

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE. Poids anc.	Poids nouv.	MODE D'ADMINISTRATION.
MADAR. *Asclepias gigantea.* Excitant. VÉNÉNEUX.	Poudre.	De 3 à 5 grains.	De 15 à 25 centigr.	En substance, en pilules (1).
MAGNÉSIE CALCINÉE. *Magnesia calcinata.* Absorbant, anti-acide, laxatif (2).	En substance.	De 18 grains à 1 gros.	De 1 à 4 gramm.	Délayée.
	En pastilles.	De 2 à 3 gros.	De 8 à 12 gramm.	En substance (3).
MALATE DE FER. *Malas ferri.* Tonique, astringent.	En substance.	De 6 à 12 grains.	De 3 à 6 décigr.	En pastilles pilules.
MANDRAGORE. *Atropa mandragora.* Calmant, narcotique. VÉNÉNEUX (4).	Poudre de la racine.	De 1/2 grain à 2 grains.	De 2 à 10 centigr.	En pilules.

à 7, 1/3; de 7 à 14, 1/2; de 14 à 20, 2/3; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINISTRATION.	*REMARQUES.*
Poids anc.	Poids nouv.		
»	»	»	(1) Recommandé dans les maladies de la peau, et particulièrement dans l'éléphantiasis.
»	»	»	(2) La magnésie est le meilleur antidote pour combattre les empoisonnemens causés par les acides forts; on l'administre alors en grande quantité. On prépare à cet effet un lait de magnésie en délayant la poudre dans l'eau.
»	»	»	
»	»	»	(3) Les pastilles de magnésie ont un goût terreux; on peut masquer ce goût en faisant entrer du chocolat dans cette préparation.
»	»	»	(4) Par ses propriétés médicales et vénéneuses, la mandragore a la plus grande analogie avec la belladone, qui est du même *genre*. La mandragore est totalement déchue de son antique réputation. On combat les accidens produits par cette plante, par les *antidotes* indiqués pour la belladone. *Voy.* ce mot.

DOSES. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 2 à 3, 1/6; de 3

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE. Poids anc.	Poids nouv.	MODE D'ADMINISTRATION.
MANGANÈSE. *Voy.* Oxide de manganèse.	»	»	»	»
MANIGUETTE. (Graine de paradis.) Semence du *Malaguetta officinalis.* Excitant.	Poudre.	De 18 à 36 grains.	De 1 à 2 gramm.	En bols, pilules, ou délayée.
MANNE. *Manna.* Purgatif (1)	En larmes.	De 1 à 3 onces.	De 32 à 96 gramm.	Dissoute dans un véhicule approprié.
	En sorte.	De 1 à 2 onces.	De 32 à 64 gramm.	*Idem.*
	Grasse.	De 1 once à 12 gros.	De 32 à 48 gramm.	*Idem.*
MANNITE. *Mannites.* Purgatif (2).	En substance.	De 1 à 2 onces.	De 32 à 64 gram.	*Idem.*

à 7, 1/3 ; de 7 à 14, 1/2 ; de 14 à 20, 2/3 ; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINISTRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
De 2 à 4 onces.	De 64 à 128 gram.	En lavement.	(1) La manne en larmes est quelquefois remplacée par de la manne en sorte que l'on fait dissoudre dans l'eau, filtrant, faisant évaporer, et trempant des fils dans cette solution concentrée.
De 1 2 onces.	De 32 à 64 gramm.	*Idem.*	
De 4 gros à 1 once.	De 16 à 32 gramm.	En pommade avec axonge (1 once.)	(2) Un fait observé par l'un de nous a démontré que cette pommade, en frictions sur le ventre, déterminait une légère purgation.

Doses. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE. Poids anc.	Poids nouv.	MODE D'ADMINISTRATION.
MARANTA. *Voy.* Galanga.	»	»	»	»
MARJOLAINE. *Origanum majorana.* Tonique, stimulant (1).	Sommités.	De 1 à 2 gros.	De 4 à 8 gramm.	En infusion
	Eau distillée.	De 2 à 4 onces.	De 64 à 128 gram.	En potion
	Esprit.	De 1 à 2 gros.	De 4 à 8 gramm.	*Idem.*
	Huile volatile.	De 2 à 5 gouttes.	»	Sur du sucre
	Poudre.	De 18 à 36 grains.	De 1 à 2 gramm.	En bols, pilules.
MARMELADE DE TRONCHIN. Expectorant, laxatif (2).	En substance.	De 1 à 2 onces.	De 32 à 64 gramm.	Par cuillerées à bouche.

à 7, 1/3; de 7 à 14, 1/2; de 14 à 20, 2/3; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINISTRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
»	»	»	
De 4 gros à 1 once.	De 16 à 32 gramm.	En lotion, bain, fomentation.	
»	»	»	
»	»	»	(1) La marjolaine est douée d'une odeur aromatique très-forte, qu'elle doit à la présence d'une huile volatile, qui, selon Proust, contient beaucoup de camphre. La poudre de cette plante est légèrement sternutatoire.
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	(2) Cet électuaire est composé de manne en larmes, d'huile d'amandes douces, de pulpe de casse et de sirop de capillaire aromatisé.

Doses. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 3

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE. Poids anc.	Poids nouv.	MODE D'ADMINISTRATION.
MARRONIER D'INDE. *Æsculus hipopcastanum.* Amer, fébrifuge (1).	Écorce des jeunes branches.	De 1 à 2 onces.	De 32 à 64 gramm.	En décoction.
	Extrait.	De 18 grains à 1 gros.	De 1 à 4 gramm.	En bols, pilules.
	Poudre.	De 2 à 8 gros.	De 8 à 16 gramm.	Délayée ou en plusieurs prises.
	Vin.	De 1 à 3 onces.	De 32 à 96 gramm.	En substance.
MARRUBE COMMUN. *Marrubium vulgare.* Aromatique, stimulant.	Sommités.	De 2 à 4 gros.	De 8 à 16 gramm.	En infusion.
	Extrait.	De 18 grains à 1 gros.	De 1 à 4 gramm.	En bols, pilules.
	Poudre.	De 1 à 2 gros.	De 4 à 8 gramm.	Délayée.
	Sirop.	De 2 à 3 onces.	De 64 à 96 gramm.	Dans les potions.
	Suc.	De 2 à 4 onces.	De 64 à 128 gram.	En nature.
	Vin.	De 1 à 3 onces.	De 32 à 96 gramm.	En substance.

à 7, 1/3 ; de 7 à 14, 1/2 ; de 14 à 20, 2/3 ; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINISTRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
De 2 à 6 onces.	De 64 à 192 gram.	En décoction, pour lotion, bain, etc.	
»	»	»	
»	»	»	(1) L'écorce de marronier d'Inde contient une matière colorante rouge qui, associée dans cette écorce à un acide, forme une sorte de *tannin* auquel la plante doit ses propriétés médicales. Cette matière tannante se rapproche beaucoup de la matière astringente du quinquina.
»	»	»	
De 4 gros à 1 once.	De 32 à 64 gramm.	En décoction, pour lavemens, lotions, fomentation.	
»	»		
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	

Doses. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 3

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE. Poids anc.	Poids nouv.	MODE D'ADMINISTRATION.
MARUM. (Germandrée maritime.) *Teucrium marum.* Aromatique, stimulant (1).	Plante.	De 2 à 6 gros.	De 8 à 24 gramm.	En infusion.
	Poudre.	De 18 grains à 1 gros.	De 1 à 4 gramm.	Délayée.
MATRICAIRE. CAMOMILLE. *Matricaria chamomilla.* Amer, aromatique, stimulant, anthelmintique.	Sommités fleuries.	De 1 à 2 gros.	De 4 à 8 gramm.	En infusion.
	Poudre.	De 36 grains à 1 gros.	De 2 à 4 gramm.	En bols, pilules.
	Suc.	De 1 à 2 onces.	De 32 à 64 gramm.	En substance.
MATRICAIRE OFFICINALE. *Matricaria parthenium.* Stimulant.	Sommités.	De 1 à 2 gros.	De 4 à 8 gramm.	En infusion.
	Poudre.	De 18 grains à 1 gros.	De 1 à 4 gramm.	En bols, pilules.
	Suc.	De 1 à 2 onces.	De 32 à 64 gramm.	En nature.

à 7, 1/3; de 7 à 14, 1/2; de 14 à 20, 2/3; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINISTRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
»	»	»	
»	»	»	(1) Le marum, qui entrait autrefois dans une foule de médicamens, avait été abandonné; depuis peu, M. le docteur Mayer a préconisé son emploi contre les polypes du nez. Ce praticien fit prendre la poudre avec succès comme sternutatoire à une jeune fille; le polype disparut au bout de douze jours. Plusieurs mois après le polype ayant reparu, il fut traité de nouveau avec le même succès par le même moyen.
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
De 4 gros à 1 once.	De 16 à 32 gramm.	En décoction, pour fomentation, lavement, etc.	
»	»		
»	»	»	

Doses. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes) ; de 1 à 3, 1/6 ; de 3

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE. Poids anc.	Poids nouv.	MODE D'ADMINISTRATION.
MAUVE. *Malva sylvestris*, *Malva rotundifolia*. Émollient.	Herbe.	»	»	»
	Fleurs.	De 2 à 4 gros.	De 8 à 16 gramm.	En infusion.
MECHOACAN. *Convolvulus mechoacan*. Purgatif (1).	Racine.	De 1 à 2 gros.	De 4 à 8 gramm.	Infusée dans 8 onces de vin blanc.
	Poudre.	De 1 à 2 gros.	De 4 à 8 gramm.	Délayée.
MÉLILOT. *Melilotus officinalis*. Aromatique (2).	Sommités fleuries.	De 1 à 2 gros.	De 4 à 8 gramm.	En infusion.
	Eau distillée.	De 2 à 4 onces.	De 64 à 128 gram.	En potion.
	Poudre.	De 18 à 36 grains.	De 1 à 2 gramm.	En bols, ou délayée.

à 7, 1/3; de 7 à 14, 1/2; de 14 à 20, 2/3; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINISTRATION.	*REMARQUES.*
Poids anc.	Poids nouv.		
De 1 à 2 onces.	De 32 à 64 gramm.	En décoction, pour bain, lotion, fomentation.	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	(1) De nos jours, le méchoacan est presque toujours remplacé avec avantage par le jalap, dont l'action est plus sûre, la saveur moins désagréable.
De 2 à 4 gros.	De 8 à 16 gramm.	Pour collyre, lotion, fomentation.	
De 2 à 4 onces.	De 64 à 128 gram.	En collyre.	(2) Le mélilot a une odeur des plus agréables; on y a constaté la présence de l'acide benzoïque.
»	»	»	

DOSES. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 3

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE. Poids anc.	Poids nouv.	MODE D'ADMINISTRATION.
MÉLISSE OFFICINALE. *Melissa officinalis.* Aromatique, excitant (1).	Feuilles.	De 1 à 2 gros.	De 4 à 8 gramm.	En infusion.
	Eau distillée.	De 1 à 2 onces.	De 32 à 64 gramm.	En potion.
	Esprit composé (2).	De 1 à 2 gros.	De 4 à 8 gramm.	En potion.
	Huile volatile.	De 2 à 8 gouttes.	»	Sur du sucre.
	Poudre.	De 18 à 36 grains.	De 1 à 2 gramm.	En bol ou délayée.
	Sirop.	De 1 à 3 onces.	De 32 à 96 gramm.	En potion.

à 7, 1/3 ; de 7 à 14, 1/2 ; de 14 à 20, 2/3 ; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINISTRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
De 2 à 4 onces.	De 64 à 128 gram.	En infusion, pour fomentation, lotion, bains, etc.	
»	»		
»	»	»	(1) Le calament, *mélissa calamintha*, jouit des mêmes propriétés que la mélisse officinale.
»	»	»	(2) Cette préparation est la même que celle qu'on trouve dans les officines sous le nom d'*eau de mélisse des carmes.*
»	»	»	
»	«	»	

Doses. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 3

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE. Poids anc.	Poids nouv.	MODE D'ADMINISTRATION.
MENTHE. *Mentha crispa, Mentha piperita, Mentha pulegium.* Aromatique, excitant.	Feuilles.	De 1 à 2 gros.	De 4 à 8 gramm.	En infusion.
	Eau distillée (2).	De 1 à 2 onces.	De 32 à 128 gram.	En potion.
	Esprit.	De 1 à 2 gros.	De 4 à 8 gramm.	*Idem.*
	Huile volatile.	De 2 à 5 gouttes.	»	Sur du sucre ou en émulsion.
	Poudre.	De 18 à 36 grains.	De 1 à 2 gramm.	Délayée ou en bols.
	Sirop.	De 1 à 2 onces.	De 32 à 64 gramm.	En potions, tisanes.
MERCURE. *Hydrargirum.* Anthelmintique (3).	En substance.	6 onces.	192 gramm.	En décoction dans 1 livre (500 gram.) d'eau.

à 7, 1/3; de 7 à 14, 1/2; de 14 à 20, 2/3; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINISTRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
De 1 à 2 onces.	De 32 à 64 gramm.	En fomentation, lotion, gargarisme (1).	
»	»	»	(1) On a employé l'infusion de menthe poivrée contre la galle. La dose est de 4 onces en lotions.
»	»	»	(2) Elle est préparée avec la menthe poivrée.
«	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	(3) On a quelquefois prescrit le mercure à l'état métallique à la dose de 1 à 4 onces contre le *volvulus*, pour rétablir la continuité du tube digestif; mais la crainte de causer la rupture des intestins doit faire renoncer à ce moyen.

Doses. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 3

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE. Poids anc.	Poids nouv.	MODE D'ADMINISTRATION.
Mercure doux. *Proto chloruretum hydrargiri.* Antisyphilitique, purgatif, vermifuge.	En substance.	De 2 à 8 grains.	De 1 à 4 décigr.	En pilules, poudre. Comme tonique et antisyphilitique.
	Idem.	De 10 à 20 grains.	De 5 à 10 décigr.	(Comme purgatif.)
Mercure gommeux de Plenck *Hydrargirum gommosum Plenckii.* Antisyphilitique (1).	*Idem.*	De 6 à 36 grains.	De 3 à 18 décigr.	En pilules de 3 grains.
Mercure sacharin. *Hydrargirum sacharinum.* Antisyphilitique (2).	Poudre.	De 4 à 8 grains.	De 2 à 4 décigr.	En pilules, poudre, pastilles.

à 7, 1/3 ; de 7 à 14, 1/2 ; de 14 à 20, 2/3 ; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINISTRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
De 1/2 grain à 1 grain.	De 2 cent. 1/2 à 5 centigr.	En friction sur les gencives, d'après la méthode de Clare.	
De 1 à 2 gros.	De 4 à 8 gramm.	Mêlé à une once d'axonge, pour friction.	
»	»	»	
«	«	»	(1) Le mercure gommeux de Plenck n'est autre chose que le sirop de mercure et de gomme du *codex*, qu'on prépare avec mercure 4 grammes (1 gros), gomme arabique 12 grammes (3 gros), sirop d'amandes 16 grammes (4 gros), mêlant par trituration. (2) On prépare le mercure sacharin en triturant du mercure avec le double ou le triple de son poids de sucre candi, selon que l'on désire que le mélange soit plus ou moins actif.

Doses. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 3

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE. Poids anc.	Poids nouv.	MODE D'ADMINISTRATION.
Marcure soluble de Hahoremann (1). Antisyphilitique.	Poudre.	De 1/2 gr. à 1 grain.	De 2 à 5 centigr.	Délayé dans l'eau gommée.
Mercuriale annuelle. *Mercurialis annua.* Purgatif (2).	Feuilles.	»	»	»
	Miel.	»	»	»
	Sirop.	De 2 gros à 1 once.	De 8 à 32 gramm.	En potion.
	Suc.	De 2 à 4 onces.	De 64 à 128 gram.	En nature.
Meum officinal. *Meum vulgare.* Aromatique, excitant.	Racine.	De 2 à 4 gros.	De 8 à 16 gramm.	En infusion.
	Poudre.	De 18 grains à 1 gros.	De 1 à 4 gramm.	En pilules, opiat.

à 7, 1/3 ; de 7 à 14, 1/2 ; de 14 à 20, 2/3 ; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINISTRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
»	»	»	
De 1 à 2 onces.	De 32 à 64 gramm.	En lavement, fomentation, bain.	
De 1 à 2 onces.	De 32 à 64 gramm.	En lavement.	(1) Le mercure soluble est un oxide de mercure obtenu par l'ammoniaque.
»	»	»	
»	»	»	(2) La mercuriale entre dans plusieurs médicamens ; elle fait la base du mellite de mercuriale simple et du mellite de mercuriale composé, connu sous les noms de *sirop de mercuriale composé*, *sirop de longue vie*, *sirop de Calabre*. Ce dernier est entièrement discrédité.
»	»	»	
»	»	»	

Doses. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 3

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE. Poids anc.	Poids nouv.	MODE D'ADMINISTRATION.
MIEL. *Mel.* Légèrement laxatif (1).	En substance.	De 1 à 2 onces.	De 32 à 64 gramm.	En tisane.
MIEL ROSAT. *Mel rosatum.* *Voy.* Rose.	»	»	»	»
MILLEFEUILLE COMMUNE. *Achillea millefolium.* Amer, astringent.	Sommités fleuries.	De 1 à 2 onces.	De 32 à 64 gramm.	En décoction.
	Suc.	De 2 à 4 onces.	De 64 à 128 gramm.	En substance.
MILLEPERTUIS VULGAIRE. *Hypericum perforatum.* Amer, astringent (2).	Sommités fleuries.	De 4 gros à 1 once.	De 16 à 32 gramm.	En infusion aqueuse ou vineuse.
	Huile par infusion.	»	»	»
	Suc exprimé.	De 2 à 4 onces.	De 64 à 128 gram.	En substance.

à 7, 1/3; de 7 à 14, 1/2; de 14 à 20, 2/3; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINISTRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
De 2 à 4 onces.	De 64 à 128 gram.	En lavement.	
»	»	»	(1) Le miel associé à diverses plantes prend des noms différens : ainsi, on a donné le nom de *miel mercurial* à un mellite préparé avec le mercuriale, de *miel rosat* au miel préparé avec les roses, de *miel anthosat* au miel préparé avec le romarin.
De 2 à 4 onces.	De 64 à 128 gram.	En lavement, lotion et bain.	
»	»		
»	»	»	(2) Le millepertuis *Toutesaine* (*Hypericum androsæmum*) jouit des mêmes propriétés, mais ces deux plantes sont aujourd'hui presque tombées en désuétude.
En quantité indéterminée.	»	Pour le pansement des plaies.	
»	»	»	

Doses. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 3

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE. Poids anc.	Poids nouv.	MODE D'ADMINISTRATION.
MIXTURE CATHÉRÉTIQUE. *Mixtura catheretica.* (Collyre de Lanfranc.) Caustique. VÉNÉNEUX (1).	En substance.	»	»	»
MOLÈNE. *Voy.* Bouillon blanc.	»	»	»	»
MORELLE NOIRE. *Solanum nigrum.* Narcotique. VÉNÉNEUX (2).	Feuilles.	»	»	»
	Extrait.	De 1 à 4 grains.	De 5 à 20 centigr	En pilules.
	Huile par infusion.	»	»	»
	Poudre.	De 1 à 4 grains.	De 5 à 20 centigr.	En pilules.

à 7, 1/3; de 7 à 14, 1/2; de 14 à 20, 2/3; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINISTRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
Quantité indéterminée.	»	Pour cautériser les ulcères vénériens.	
»	»	»	(1) *Antidotes.* Émétiques, adoucissans; eau chargée de blancs d'œufs.
Quantité indéterminée.	»	En lotion, bain, injection ou en cataplasme.	
»	»		
De 1 à 2 onces.	De 32 à 64 gramm.	En liniment.	(2) *Antidotes.* Évacuans à haute dose, boissons acidulées, décoction de café à très-haute dose, saignées, épispastiques, etc.
»	»	»	

Doses. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 3

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE. Poids anc.	Poids nouv.	MODE D'ADMINISTRATION.
MORPHINE. *Morphin.* Calmant, narcotique. VÉNÉNEUX. (*Voy.* Acétate et hydrochlorate de morphine (1).)	»	»	»	»
MOUSSE DE CORSE. *Fucus helminthocorton.* Vermifuge.	En substance.	De 2 gros à 1 once.	De 8 à 32 gramm.	En décoction dans 12 onces d'eau.
	Gelée.	De 2 à 4 onces.	De 64 à 128 gram.	En substance.
	Poudre.	De 18 grains à 1 gros.	De 1 à 4 gramm.	En pilules, opiat ou délayée.
	Sirop.	De 2 à 4 onces.	De 64 à 128 gram.	En potion, tisane.
MOUTARDE BLANCHE. *Sinapis alba.* Laxatif ?	Semences.	De 1 à 3 gros.	De 4 à 12 gramm.	En substance (2).

à 7, 1/3 ; de 7 à 14, 1/2 ; de 14 à 20, 2/3 ; de 20 à 60, la dose des adultes

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINISTRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
»	»	»	
»	»	»	(1) Chaussier avait donné à la morphine le nom de *Narcéïne*, afin que le nom, malheureusement trop célèbre de cette substance, n'effrayât pas les malades.
»	»	»	
«	»	»	
»	»	»	
»	»	»	(2) On les avale sans les mâcher après les avoir fait infuser, pendant quelques minutes, dans l'eau chaude.

Doses. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 3

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE. Poids anc.	Poids nouv.	MODE D'ADMINISTRATION.
MOUTARDE NOIRE. *Sinapis nigra.* Stimulant, rubéfiant, vésicant, laxatif.	Semences (1).	De 1 à 3 gros.	De 4 à 12 gramm.	En substance.
	Semences pulvérisées.	»	»	»
MUGUET. *Convallaria maialis.* Emétique, purgatif, sternutatoire.	Fleurs.	De 1 à 2 gros.	De 4 à 8 gramm.	En infusion.
	Extrait.	De 18 à 36 grains.	De 1 à 2 gramm.	En pilules.
	Poudre.	De 18 grains à 1 gros.	De 1 à 4 gramm.	En pilules, opiat.
MURIATES. *Voy.* Hydrochlorates.	»	»	»	»

à 7, 1/3 ; de 7 à 14, 1/2 ; de 14 à 20, 2/3 ; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINISTRATION.	*REMARQUES.*
Poids anc.	Poids nouv.		
»	»	»	(1) Prises de la même manière que les précédentes, elles produisent le même effet.
De 2 onces à 1 livre.	De 64 à 500 gram.	En pédiluves, Sinapismes (2).	(2) Les sinapismes préparés avec le vinaigre ont moins d'activité que ceux préparés avec l'eau seulement ; on a aussi recommandé pour le même topique la farine de moutarde, privée par expression, de son huile fixe.
»	»	»	
»	»	»	
De 6 à 8 grains.	De 3 à 4 décigr.	Comme sternutatoire.	
»	»	»	

Doses. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE. Poids anc	Poids nouv.	MODE D'ADMINISTRATION.
Murier noir. *Morus nigra.* Les fruits (rafraîchissans), l'écorce de la racine (vermifuge).	Écorce de la racine.	De 1 à 4 onces.	De 32 à 128 gram.	Dans 6 livres d'eau réduites à 2 livres.
	Poudre.	De 36 grains à 2 gros.	De 2 à 8 gramm.	En opiat ou délayée.
	Suc du fruit.	Quantité indéterminée.	»	Dans les boissons.
	Sirop du fruit.	De 2 à 4 onces.	De 64 à 128 gram.	Dans les tisanes.
Musc. *Moschus.* Antispasmodique (1).	En substance.	De 6 à 24 grains.	De 3 à 12 décigr.	En pilules, potion.
	Eau distillée.	De 1 à 3 onces.	De 32 à 96 gramm.	En potions.
	Teinture.	De 18 à 36 grains.	De 1 à 2 gramm.	*Idem.*

à 7, 1/3; de 7 à 14, 1/2; de 14 à 20, 2/3; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINISTRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
»	»	»	
»	»	»	
Quantité indéterminée.	»	En gargarisme.	
De 1 à 3 onces.	De 32 à 96 gramm.	Dans les gargarismes.	(1) Le musc qu'on trouve dans le commerce est souvent falsifié par du plomb et du sable. Cette sophistication est plus facile à découvrir que celle qu'on opère à l'aide du sang et de l'asphalte. Ce dernier mélange, plus difficile à reconnaître, n'est pas sans inconvénient, par la raison qu'on ne sait véritablement quelle quantité de musc pur on administre quand on l'emploie.
De 12 à 36 grains.	De 6 à 18 décigr.	En lavement.	
»	»	»	
De 36 grains à 1 gros.	De 2 à 4 gramm.	En lavement.	

Doses. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 3

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE. Poids anc.	Poids nouv.	MODE D'ADMINISTRATION.
Muscade. *Nux moschata.* Stimulant, énergique.	Poudre.	De 6 à 24 grains.	De 3 à 12 décigr.	En pilules.
	Huile concrète.	»	»	»
	Huile volatile.	De 4 à 8 gouttes.	»	Sur du sucre.
	Teinture.	De 36 grains à 1 gros.	De 1 à 4 gramm.	En potion.
Myrobolans. *Fructus myrobolani.* Purgatifs, astringens (2).	Entiers.	De 1 à 2 gros.	De 4 à 8 gramm.	En infusion.
	Poudre.	De 36 grains à 1 gros.	De 2 à 4 gramm.	En pilules.
Myrrhe. *Myrrha.* Stimulant (3).	Huile volatile.	De 5 à 10 gouttes.	»	Sur du sucre ou en émulsion.
	Poudre.	De 12 à 36 grains.	De 6 à 18 décigr.	En pilules ou opiat.
	Teinture.	De 36 grains à 1 gros.	De 2 à 4 gramm.	En potion.

à 7, 1/3; de 7 à 14, 1/2; de 14 à 20, 2/3 ; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINISTRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
Quantité indéterminée.	»	En friction. (1).	(1) A cet effet, on la mêle à de l'eau ou à de l'alcool.
De 4 gros à 2 onces.	De 16 à 64 gramm.	En liniment.	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	(2) On connaît cinq espèces de myrobolans : les *myrobolans chébules*, les *myrobolans citrins*, les *myrobolans indiques*, les *myrobolans bellirics*, enfin les *myrobolans emblics*.
»	»	»	
»	»	»	(3) La myrrhe entre dans un grand nombre de préparations officinales ; de ce nombre sont la thériaque, le mithridate, l'élixir de propriété, la confection d'hyacinthe, les pilules de cynoglosse, le baume de Fioraventi, l'emplâtre diabotanum, etc.
De 1 à 2 gros.	De 4 à 8 gramm.	En gargarisme, liniment, lotion.	

Doses. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 3

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE. Poids anc.	Poids nouv.	MODE D'ADMINISTRATION.
MYRTE. *Myrtus communis.* Aromatique, astringent (1).	Sirop.	De 1 à 2 onces.	De 32 à 64 gramm.	En potion.
NAPEL. *Voy.* Aconit.	»	»	»	»
NARCISSE DES PRÉS. *Narcissus pseudo-narcissus.* Vomitif, narcotique, irritant. VÉNÉNEUX (2).	Bulbes pulvérisées.	De 18 à 36 grains.	De 1 à 2 gramm.	En pilules ou délayées.
	Fleurs.	De 1 à 2 gros.	De 4 à 8 gramm.	En infusion.
	Extrait.	De 2 à 6 grains.	De 1 à 3 décigr.	En pilules.
	Poudre des fleurs.	De 18 grains à 1 gros.	De 1 à 4 gramm.	Délayée ou en opiat.
	Sirop.	De 1 à 2 onces.	De 32 à 64 gramm.	Dans les tisanes, potions.

à 7, 1/3; de 7 à 14, 1/2; de 14 à 20, 2/3; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINISTRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
»	»	»	
»	»	»	(1) L'écorce aromatique connue sous le nom de *Canelle giroflée*, est l'écorce du *Myrtus cariophyllata*.
»	»	«	
»	»	»	
»	«	»	(2) Il paraît que le narcisse des prés agit d'une manière efficace par les seules émanations qu'il répand; et ce sont même les effets remarquables de ces émanations sur une affection convulsive qui ont révélé les propriétés de cette plante.
»	«	»	*Antidotes.* Vomissemens provoqués par les boissons tièdes sucrées; adoucissans externes et internes; saignées

DOSES. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 3

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE. Poids anc.	Poids nouv.	MODE D'ADMINISTRATION.
NAVET. *Brassica napus.* Adoucissant.	Racine.	De 8 onces à 1 livre.	De 250 à 500 gram.	En décoction.
	Sirop.	De 1 à 4 onces.	De 32 à 128 gram.	Dans les boissons.
NÉNUPHAR BLANC. *Nymphæa alba.* Mucilagineux (1).	Racine.	De 4 gros à 1 once.	De 16 à 32 gramm.	En décoction.
	Fleurs.	De 2 à 4 gros.	De 8 à 16 gramm.	En infusion.
	Eau distillée.	De 1 à 3 onces.	De 32 à 96 gramm.	En potion.
	Sirop.	De 2 à 4 onces.	De 64 à 128 gram.	En potion, tisane.
	Suc.	De 1 à 3 onces.	De 32 à 96 gramm.	En substanc

à 7, 1/3 ; de 7 à 14, 1/2 ; de 14 à 20, 2/3 ; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR D'ADULTE.		MODE D'ADMINISTRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
Quantité indéterminée.	»	En cataplasme.	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	(1) L'antique renommée du nénuphar, dont on abusait tant dans les cloîtres pour amortir les désirs vénériens, ne repose sur aucune observation exacte. C'est donc gratuitement qu'on a prétendu que les fleurs de cette plante pouvaient remplacer les *opiacés*.
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	

Doses. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes) ; de 1 à 3, 1/6 ; de 3

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE. Poids anc.	Poids nouv.	MODE D'ADMINISTRATION.
Nerprun. *Rhamnus catharticus.* Purgatif (1).	Baies.	De 2 à 4 gros.	De 8 à 16 gramm.	En décoction.
	Rob.	De 36 grains à 2 gros.	De 2 à 8 gramm.	En potion.
	Sirop.	De 1 à 2 onces.	De 32 à 64 gramm.	*Idem.*
	Suc.	De 1 à 3 gros.	De 4 à 12 gramm.	*Idem.*
Nerprun bourdaine, *ou* Bourgène. *Rhamnus frangula.* Purgatif (2).	Baies.	De 2 à 5 gros.	De 8 à 20 gramm.	En décoction.
	Écorce.	De 4 à 6 gros.	De 16 à 24 gramm.	*Idem.*
	Poudre.	De 1 à 2 gros.	De 4 à 8 gramm.	En pilules, opiat.
Nicotiane *Voy.* Tabac.	»	»	»	»
Nitrate d'argent. *Voy.* Argent.	»	»	»	»

à 7, 1/3 ; de 7 à 14, 1/2 ; de 14 à 20, 2/3 ; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINISTRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
»	»	»	
»	»	»	
»	«	»	(1) Les habitans des campagnes se purgent avec les baies de nerprun, au nombre de 15 à 20.
»	»	»	
Quantité indéterminée.	»	En décoction aqueuse ou préparée avec le vinaigre. On l'a employé en lotions contre les maladies cutanées.	(2) Le bois du *Rhamnus frangula* est employé pour faire du charbon qui sert à la préparation de la poudre à canon.
»	»		
»	»		
»	»	»	
»	»		

Doses. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 3

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE. Poids anc.	Poids nouv.	MODE D'ADMINISTRATION.
NITRATE DE BISMUTH. *Voy.* Bismuth.	»	»	»	»
NITRATE DE CUIVRE. *Nitras cupri.* Antisyphilitique. VÉNÉNEUX (1).	En substance.	1/8 de grain.	»	En pilules.
NITRATE DE MERCURE. *Protonitras hydrargiri.* Caustique, antisyphilitique. VÉNÉNEUX (2).	*Idem.*	»	»	»
NITRATE DE POTASSE. *Nitras potassæ.* Diurétique. VÉNÉNEUX (3).	Poudre.	De 18 grains à 1 gros.	De 1 à 4 gramm.	Dans les tisanes.
NITRE. *Voy.* Nitrate de potasse.	»	»	»	»

à 7, 1/3; de 7 à 14, 1/2; de 14 à 20, 2/3; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINISTRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
»	»	»	
Quantité indéterminée.	»	En solution, pour toucher les ulcères fongueux (2).	(1) *Antidotes.* Ils sont les mêmes que pour les autres sels de cuivre (les acétates et sous-acétates).
Quantité indéterminée.	»	Pour toucher les ulcères fongueux.	(2) Le nitrate de mercure liquide est connu en pharmacologie, sous le nom d'*eau mercurielle.* Le deutonitrate est employé aux mêmes usages.
»	»	»	(3) C'est à tort qu'on a nié les propriétés vénéneuses du nitrate de potasse; ce sel peut produire, à très-haute dose, l'inflammation de l'estomac, et un véritable empoisonnement accompagné de symptômes nerveux très graves.
»	»	»	*Antidotes.* Vomissemens provoqués par l'eau tiède, la décoction de guimauve, etc.; adoucissans, narcotiques, saignées, etc.

Doses. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 3

MOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE. Poids anc.	Poids nouv.	MODE D'ADMINISTRATION.
Noix. (Fruit du noyer.) *Nux*. Adoucissant.	Fruit.	De 4 gros à 1 once.	De 16 à 32 gramm.	En émulsion.
	Huile fixe.	De 1 à 4 gros.	De 8 à 16 gramm.	Dans les potions (1).
Noix DE GALLES. *Galla*. Astringent (2).	Concassée.	De 1 à 2 gros.	De 4 à 8 gramm.	En infusion.
	Poudre.	De 18 à 36 grains.	De 1 à 2 gros.	En pilules, opiat.
	Teinture alcoolique.	De 1 à 3 gros.	De 4 à 12 gramm.	Délayée convenablement.
Noix MUSCADE. *Voy*. Muscade.	»	»	»	»

à 7, 1/3; de 7 à 14, 1/2; de 14 à 20, 2/3; de 20 à 60, le dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINISTRATION.	*REMARQUES.*
Poids anc.	Poids nouv.		
»	»	»	
Quantité indéterminée.	»	Dans les linimens.	(1) Il faut que cette huile soit récente.
De 1 à 3 gros.	De 4 à 12 gramm.	En décoction pour lavement.	
De 1 à 2 gros.	De 4 à 8 gramm.	Mêlée à de l'axonge, pour faire une pommade employée contre les hémorroïdes.	(2) On a vanté les noix de galles contre les affections flatulentes. L'auteur d'un mémoire publié en 1778, et inséré dans le 49e volume d'un Journal de médecine, chirurgie et pharmacie de cette époque, assure avoir retiré beaucoup de succès de ce médicament administré sous diverses formes, à douze individus qui éprouvaient des flatuosités très-incommodes.
Quantité indéterminée.	Étendue d'eau, en lotion.		
»	»		

Doses. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 3

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE. Poids anc.	Poids nouv.	MODE D'ADMINISTRATION.
Noix vomique. (Fruit du *Strychnos nux vomica.*) Excitant. Vénéneux (1).	Extrait alcoolique.	D'un 1/2 gr. à 1 grain.	De 2 à 5 centig.	En pilules.
	Poudre.	De 1 à 3 grains.	De 5 à 15 centigr.	*Idem.*
	Teinture.	De 5 à 30 gouttes.		Dans les potions.
Noyer. *Nux juglans.* Excitant.	Feuilles.	»	»	»
	Eau des 3 noix (2).	De 1 à 3 onces.	De 32 à 96 gramm.	En potion.
Oeillet rouge. *Dianthus cariophyllus.* Aromatique, tonique.	Fleurs.	De 2 à 4 gros.	De 8 à 16 gramm.	En infusion.
	Sirop.	De 1 à 3 onces.	De 32 à 96 gramm.	En potion, tisane.
Oeuf. *Ovum gallinaceum.* Adoucissant, mucilagineux.	Jaune.	De 2 à 4 gros.	De 8 à 16 gramm.	En émulsion.
	Huile d'œuf.	»	»	»

à 7, 1/3 ; de 7 à 14, 1/2 ; de 14 à 20, 2/3 ; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINISTRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
»	»	»	
De 18 à 36 grains.	De 1 à 2 gramm.	En lavement.	
Quantité indéterminée.	»	En friction.	
De 2 à 4 onces.	De 64 à 128 gram.	En infusion, pourlotions, fomentat., cataplasme, sur les engorgemens chroniques et les ulcères atoniques.	(1) La dose de l'extrait alcoolique de noix vomique peut être quelquefois portée jusqu'à 25 ou 30 grains pour obtenir des secousses tétaniques ; mais le plus souvent 4 à 6 grains suffisent.
»	»		
»	»		
»	»		(2) L'eau dite des trois noix est le produit de la distillation répétée de l'eau, mise en contac àt diverses époques, avec les fleurs et les fruits du noyer.
Quantité indéterminée.	»	Pour tenir le camphre en suspension.	
Idem.	»	Pour toucher les crevasses, les pustules de la variole, etc.	

DOSES. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE. Poids anc.	Poids nouv.	MODE D'ADMINISTRATION.
OLIBAN. *Olibanum.* Excitant.	Poudre.	De 18 grains à 2 gros.	De 1 à 8 gramm.	En opiat.
OLIVIER. *Olea Europæa.* Amer, tonique (1).	Feuilles.	De 2 à 4 gros.	De 8 à 16 gramm.	En décoction.
	Poudre.	De 1 à 2 gros.	De 4 à 8 gramm.	En pilules, en opiat.
	Résine.	De 18 grains à 1 gros.	De 1 à 4 gramm.	En pilules.
	Marc.	»	»	»
ONGUENT CITRIN. *Unguentum citrinum.* Antipsorique.	En substance.	»	»	»
ONGUENT MERCURIEL DOUBLE. *Unguentum ex hydrargyro.* Antisyphilitique (3).	Onguent.	De 6 à 8 grains.	De 3 à 4 décigr.	Amené convenablement à l'état pilulaire (2).

à 7, 1/3 ; de 7 à 14, 1/2 ; de 14 à 20, 2/3 ; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINISTRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
Quantité indéterminée.	»	Pour fumigation.	
»	»	»	(1) Les feuilles d'olivier, qui ont beaucoup d'amertume, sont comptées au nombre des succédanés du quinquina.
»	»	»	
»	»	»	
Quantité indéterminée.	»	En bain.	
De 1 à 2 gros.	De 4 à 8 gramm.	En friction.	(2) Nous avons cru ne devoir faire mention que des onguens qui sont employés à des doses déterminées.
De 36 grains à 1 gros.	De 2 à 4 gramm.	En friction, dans des linimens.	(3) Terras ; de Genève, qui a conseillé le premier l'usage intérieur de l'onguent mercuriel, commençait le traitement en donnant 3 pilules de 2 grains le matin à jeun, et il augmentait ensuite successivement jusqu'à 9, 12 et même 15 pilules par jour.

Doses. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 3

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE. Poids anc.	Poids nouv.	MODE D'ADMINISTRATION.
ONGUENT MERCURIEL SIMPLE. (Onguent gris.) Antisyphilitique (1).	En substance.	»	»	»
OPIUM. *Opium.* Calmant, narcotique. VÉNÉNEUX (2).	Extrait aqueux.	De 1/4 de gr. à 1 grain.	De 1 à 5 centigr.	En pilules.
	Sirop d'opium.	De 4 gros à 1 once.	De 16 à 32 gramm.	En potion.
OPODELDOCH. *Voy.* Baume opodeldoch.	»	»	»	»
OPOPANAX. *Opopanax.* Excitant (3).	Poudre.	De 12 à 24 grains.	De 6 à 12 décigr.	En potion.

à 7, 1/3; de 7 à 14, 1/2; de 14 à 20, 2/3; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINISTRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
De 1 à 2 gros.	De 4 à 8 gramm.	En friction, dans des linimens.	
De 1 à 2 gros.	De 4 à 8 gramm.	Dans 2 livres d'eau, pour lotions, sur les parties non dénudées.	(1) *L'onguent mercuriel double* résulte du mélange du métal, avec partie égale d'axonge. L'onguent mercuriel simple est préparé avec une partie d'onguent double et trois parties d'axonge.
»	»	»	(2) *Antidotes.* Les mêmes que pour les autres narcotiques. *Voy.* Jusquiame.
De 36 grains à 1 gros.	De 2 à 4 gramm.	En lavement.	(3) A plus haute dose (de 36 grains à 1 gros), il agit comme purgatif.

Doses. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 3

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS. medicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE. Poids anc.	Poids nouv.	MODE D'ADMINISTRATION.
ORANGER. *Citrus aurantium.* Antispasmodique.	Ecorce d'orange.	De 2 à 4 gros.	De 8 à 16 gramm.	En infusion.
	Eau distillée des fleurs (1).	De 2 à 4 gros.	De 8 à 16 gramm.	En potion, tisane.
	Extrait des feuilles.	De 36 grains à 1 gros.	De 2 à 4 gramm.	En pilules.
	Feuilles.	De 1 à 2 gros.	De 4 à 8 gramm.	En infusion.
	Fleurs.	De 36 grains à 1 gros.	De 2 à 4 gramm.	*Idem.*
	Huile essentielle.	De 4 à 8 gouttes.	»	Dans une émulsion.
	Poudre des feuilles.	De 18 grains à 2 gros.	De 1 à 8 gramm.	En opiat.
	Sirop d'écorce.	De 1 à 3 onces.	De 32 à 96 gramm.	En potion, tisane.
	Sirop de fleurs.	De 1 à 2 onces.	De 32 à 64 gramm.	*Idem.*
	Suc du fruit.	De 1 à 2 onces.	De 32 à 64 gramm.	Dans les tisanes

à 7, 1/3 ; de 7 à 14, 1/2 ; de 14 à 20, 2/3 ; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINISTRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
»	»	»	
»	»	»	(1) L'eau de fleurs d'oranger est préparée en grande quantité en Provence, d'où elle est ensuite exportée. On a reconnu que cette eau n'est pas aussi agréable et aussi suave que celle fabriquée à Paris. Cette eau contient quelquefois des sels de cuivre et de plomb, qui résultent de l'action de l'eau distillée sur les vases dans lesquels on apporte ce liquide, et qu'on nomme *estagnons*.
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	

Doses. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 4

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE. Poids anc.	Poids nouv.	MODE D'ADMINISTRATION.
ORGE. *Hordeum distychon.* Adoucissant, délayant.	Orge perlé.	De 4 gros à 1 once.	De 16 à 32 gramm.	En décoction.
	Farine.	»	»	»
ORIGAN VULGAIRE. *Origanum vulgare.* Tonique, aromatique.	Sommités.	De 1 à 3 gros.	De 4 à 12 gramm.	En infusion.
ORME. *Ulmus campestris.* Sudorifique (1).	Écorce moyenne.	4 onces.	128 gramm.	En décoction dans 2 livres d'eau réduites à 1 livre.
	Extrait.	De 18 à 36 grains.	De 1 à 2 gramm.	En pilules.
	Poudre.	De 1 à 2 gros.	De 4 à 8 gramm.	En opiat.
ORTIE BLANCHE. *Lamium album.* Astringent.	Fleurs sèches.	De 1 à 4 gros.	De 4 à 16 gramm.	En infusion.

à 7, 1/3; de 7 à 14, 1/2; de 14 à 20, 2/3; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINISTRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
De 1 à 2 onces.	De 32 à 64 gramm.	En décoct., pour lavement, lotion, etc.	
Quantité indéterminée.	»	En cataplasme.	
Idem.	»	Pour bain, fumigation.	
»	»	»	
»	»	»	(1) Deux médecins anglais, Lysons et Letsom, vantèrent, il y a environ cinquante ans, l'écorce moyenne ou *liber* de l'orme, comme un excellent remède contre les dartres et les autres maladies chroniques de la peau; mais, soit défaut d'expériences, soit défaut de propriétés actives, ce médicament est peu usité de nos jours.
»	»	»	
»	»	»	

Doses. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 3

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE. Poids anc.	Poids nouv.	MODE D'ADMINISTRATION.
OSEILLE. *Rumex acetosa.* Rafraîchissant, antiscorbutique (1).	Feuilles.	De 4 gros à 1 once.	De 16 à 32 gramm.	En décoction.
	Suc.	De 2 à 4 onces.	De 64 à 128 gram.	En nature.
OSMONDE ROYALE. *Osmunda regalis.* Excitant, tonique.	Extrait de la racine.	De 2 à 4 gros.	De 8 à 16 gramm.	En bols.
OXALATE ACIDULE DE POTASSE. *Oxalas acidulus potassæ.* Rafraîchissant.	En substance.	De 18 à 36 grains.	De 1 à 2 gramm.	En limonade, en tablettes (2).
OXALIDE. *Oxalis acetosella.* Rafraîchissant.	Feuilles.	De 1 à 2 onces.	De 32 à 64 gramm.	En décoction.
	Suc.	De 1 à 2 onces.	De 32 à 64 gramm.	En substance.

à 7, 1/3; de 7 à 14, 1/2; de 14 à 20, 2/3; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINISTRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
Quantité indéterminée.	»	En cataplasme.	
»	»	«	
»	»	»	(1) On applique avec succès l'oseille pilée sur les plaies faites par les plantes âcres et corrosives, aux lèvres, dans l'intérieur de la bouche et sur les parties dénudées.
»	»	»	
»	»	»	(2) La limonade sèche de Fascio est préparée avec oxalate, acidule de potasse. 3 gros; sucre blanc, 1 livre; huile essentielle de citron, 8 gouttes. On mêle une once de cette poudre à une chopine d'eau.
»	»	»	

Doses. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6 ; de 3

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE. Poids anc.	Poids nouv.	MODE D'ADMINISTRATION.
Oxide d'antimoine. *Oxidum stibii.* (Antimoine diaphorétique lavé).	Poudre.	De 18 à 36 grains.	De 1 à 2 gramm.	En potion, opiat, poudre par doses fractionnées.
Oxide d'arsenic (1).	»	»	»	»
Oxide de cuivre. (Deuto-). *Oxidum cupri.* Antiscrophuleux, anticancéreux. Vénéneux (2).	En substance.	De 1/8 à 1/4 de gr.	»	En pilules.
Oxide de fer. *Voy.* Fer.	»	»	»	»
Oxide de magnésium. *Voy.* Magnésie.	»	»	»	»

à 7, 1/3; de 7 à 14, 1/2; de 14 à 20, 2/3; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINISTRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
»	»	»	
»	»	»	
Quantité indéterminée.	»	Pour cautériser les ulcères fongueux.	(1) L'oxide d'arsenic n'est pas employé seul, mais associé ou combiné avec la potasse dans la solution dite de *Fowler*. Il entre dans la composition de la pâte arsenicale. (2) *Antidotes*. Émétiques l'eau chargée de blanc d'œuf.
»	»	»	
»	»	»	

Doses. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes) ; de 1 à 3, 1/6 ; de 3

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MODE D'ADMINISTRATION.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE. Poids anc.	Poids nouv.	MODE D'ADMINISTRATION.
OXIDE DE MERCURE. *Oxidum hydrargyri.* Antisyphilitique. VÉNÉNEUX (1).	Protoxide.	De 1 à 4 grains.	De 5 à 20 centig.	En pilules.
	Peroxide.	De 1/2 grain à 2 grains.	De 2 à 10 centig.	*Idem.*
OXIDE DE ZINC. *Oxidum zinci.* Antispasmodique.	Poudre.	De 4 à 12 grains.	De 2 à 6 décigr.	En pilules s bols.
OXIMEL COLCHIQUE. *Oximel colchicum.* Diurétique.	En substance.	De 1 à 2 gros.	De 4 à 8 gramm. (2).	En potion.
OXIMEL SCILLITIQUE. *Oximel scilliticum.* Diurétique.	*Idem.*	De 4 gros à 1 once.	De 16 à 32 gramm.	En potion tisane.

à 7, 1/3; de 7 à 14, 1/2; de 14 à 20, 2/3; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINISTRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
Quantité indéterminée.	»	Poursaupoudrer les ulcères syphilitiques.	
Idem.	»	Dans les mêmes cas et dans diverses pommades.	
De 36 grains à 1 gros.	De 2 à 4 gramm.	En liniment, mêlée à une once d'huile de lin récente.	(1) *Antidotes.* Les mêmes que pour les sels mercuriels. *Voy.* Sublimé corrosif.
»	»	»	(2) On peut augmenter cette dose, mais il est prudent de commencer par de petites quantités.
»	»	»	

Doses. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 3

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS. médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE, Poids anc.	Poids nouv.	MODE D'ADMINISTRATION.
OXIMEL SIMPLE. *Oximel simplex.* Rafraîchissant.	En substance.	De 2 à 4 onces.	De 64 à 128 gram.	En tisane.
PALMA-CHRISTI. *Voy.* Ricin.	»	»	»	»
PANAIS. *Pastinaca sativa.* Aromatique. (1).	Semences.	De 2 à 4 gros.	De 8 à 16 gramm.	En infusion.
	Poudre.	De 1 à 2 gros.	De 4 à 8 gramm.	En opiat.
PAREIRA BRAVA. *Cissampelos pareira.* Diurétique.	Racine.	De 2 à 4 gros.	De 8 à 16 décigr.	En décoction.
	Poudre.	De 1 à 2 gros.	De 4 à 8 gramm.	En pilules, bols, opiat.
	Extrait.	De 36 grains à 1 gros.	De 2 à 4 gramm.	En pilules.

à 7, 1/3; de 7 à 14, 1/2; de 14 à 20, 2/3; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINISTRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
»	»	»	
»	»	»	
De 4 gros à 1 once.	De 16 à 32 gramm.	En lavement.	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	

(1) La racine du panais a de la ressemblance avec la racine de ciguë. Jean Bauhin dit avoir vu des accidens très-graves résultant de méprises qui peuvent avoir lieu, en hiver, lorsque les racines sont dépourvues de feuilles.

Doses. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes) ; de 1 à 3, 1/6 ; de

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE. Poids anc.	Poids nouv.	MODE D'ADMINISTRATION.
PARIÉTAIRE. *Parietaria officinalis.* Emollient, diurétique (1).	Herbe.	De 4 gros. à 1 once.	De 16 à 32 gramm.	En décoction.
	Poudre.	De 1 à 2 gros.	De 4 à 8 gramm.	En opiat.
	Eau distillée.	De 2 à 4 onces.	De 64 à 128 gram.	En potion.
	Extrait.	De 36 grains à 1 gros.	De 2 à 4 gramm.	En pilules.
	Suc.	De 2 à 4 onces.	De 64 à 128 gram.	En nature.
PASTILLES. *Voy.* Tablettes.	»	»	»	»
PATE ARSENICALE. Caustique. VÉNÉNEUX (2).	»	»	»	»

à 7, 1/3; de 7 à 14, 1/2; de 14 à 20, 2/3; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINISTRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
Quantité indéterminée.	»	En cataplasme, en décoction, pour lavement.	
»	»		(1) L'action de cette plante est due au nitrate de potasse qu'elle contient; il convient donc de l'employer en décoction ou en infusion. L'eau distillée ne doit jouir d'aucune efficacité.
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	(2) La pâte arsenicale dont le *Frère Côme* avait acheté la composition d'un chirurgien, contenait 5 grains d'oxide blanc d'arsenic, 25 grains de cinabre et une pincée de poudre de semelles de souliers brûlés, mêlés ensemble avec assez d'eau pour en faire une pâte; on a remplacé la poudre de savatte par du sang-dragon. Voici la formule la plus usitée aujourd'hui : Oxide blanc d'arsenic . . . . . 1/2 gros. Cinabre ou vermillon de Hollande . . . . . 4 gros. Sang-dragon. . . . . 4 gros.
«	»	»	
Quantité indéterminée et proportionnelle.	»	Pour cautériser les ulcères carcinomateux.	

Doses. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 3

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE. Poids anc.	Poids nouv.	MODE D'ADMINISTRATION.
PATIENCE. *Rumex patientia.* Amer, sudorifique (1).	Racine.	De 4 gros à 1 once.	De 16 à 32 gramm.	En décoction.
	Poudre.	De 36 grains à 1 gros.	De 2 à 4 gramm.	En pilules, bols.
	Extrait.	De 36 grains à 1 gros.	De 2 à 4 gramm.	En bols.
PAVOT. *Papaver somniferum.* Narcotique, calmant. VÉNÉNEUX (2).	Capsules.	De 1 à 2.	»	En décoction.
	Extrait.	De 2 à 6 grains.	De 1 à 3 décigr.	En pilules.
	Sirop. (Sirop diacode.)	De 2 gros à 1 once.	De 8 à 32 gramm.	En potion.
PAVOT CORNU, *Voy.* Chélidoine.	»	»	»	»

à 7, 1/3 ; de 7 à 14, 1/2; de 14 à 20, 2/3 ; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINISTRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
»	»	»	
»		»	(1) M. Deyeux s'est occupé de l'examen de la racine de patience ; il y a reconnu la présence du soufre libre.
»	»	»	
De 1 à 2.	»	En décoction, pour lavement, fomentat.	
»	»		
»	»	»	
«	»	»	(2) Des expériences répétées ont prouvé que le *Pavot indigène* jouissait de propriétés très-actives, et que l'extrait de cette plante pouvait, en beaucoup de cas, être substitué à l'opium.

Doses. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 3

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE. Poids anc.	Poids nouv.	MODE D'ADMINISTRATION.
PÉCHER. *Amygdalus persica.* Purgatif, vermifuge. (1)	Feuilles.	De 4 gros à 1 once.	De 16 à 32 gramm.	En infusion.
	Fleurs.	De 2 à 3 gros.	De 8 à 12 gramm.	*Idem.*
	Poudre de la fleur.	De 36 grains à 1 gros.	De 2 à 4 gramm.	En pilules.
	Sirop de fleurs.	De 4 gros à 1 once.	De 16 à 32 gramm.	En potion.
PENSÉE SAUVAGE. *Viola tricolor sylvestris.* Émétique, tonique (2).	Herbe.	De 4 gros à 1 once.	De 16 à 32 gramm.	En décoction ou infusion.
	Poudre.	De 18 à 36 grains.	De 1 à 4 gramm.	En pilules.
	Extrait.	De 18 à 36 grains.	De 1 à 4 gramm.	*Idem.*
	Sirop.	De 4 gros à 2 onces.	De 16 à 64 gramm.	En tisane.
	Suc.	De 2 à 4 onces.	De 64 à 128 gram.	En nature.

à 7, 1/3 ; de 7 à 14, 1/2 ; de 14 à 20, 2/3 ; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINISTRATION.	*REMARQUES.*
Poids anc.	Poids nouv.		
»	»	»	
»	»	»	(1) Les feuilles du pêcher contiennent de l'acide hydrocianique. Il en est de même de ses amandes ; elles ont donné lieu à des accidens très-graves chez des enfans qui en avaient mangé un grand nombre.
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	(2) Les fleurs du *Viola tricolor* sont presque habituellement substituées, dans la pharmacie, aux fleurs de violettes.
»	»	»	
»	»	»	

Doses. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 3

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE. Poids anc.	Poids nouv.	MODE D'ADMINISTRATION.
Persil. *Apium petroselinum.* Stimulant, diurétique, résolutif.	Racine (1).	De 4 gros à 1 once.	De 16 à 32 gramm.	En décoction.
	Poudre de la racine.	De 18 à 36 grains.	De 1 à 2 gramm.	En pilules.
	Feuilles.	»	»	»
	Semences.	De 1 à 2 gros.	De 4 à 8 gramm.	En infusion.
	Eau distillée.	De 1 à 3 onces.	De 32 à 96 gramm.	En potion.
	Extrait.	De 18 à 36 grains.	De 1 à 2 gramm.	En bols.
	Poudre de la semence.	De 18 à 36 grains.	De 1 à 2 gramm.	*Idem.*
Pervenche. *Vinca major.* Astringent (1).	Feuilles.	De 2 à 4 gros.	De 8 à 16 gramm.	En infusion.
Pétrole. *Voy.* Huile de pétrole.	»	»	»	»

à 7, 1/3; de 7 à 14, 1/2; de 15 à 20, 2/3; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINISTRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
»	»	»	
»	»	»	(1) La racine de persil est l'une des cinq racines dites apéritives majeures; la semence de cette plante faisait partie des quatre semences chaudes mineures.
Quantité indéterminée.	»	En épithême.	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
De 4 gros à 1 once.	De 16 à 32 gramm.	En décoction, pour gargarisme.	
»	»	»	(2) La pervenche est une des plantes qui entrent dans le vulnéraire suisse, panacée du vulgaire.

DOSES. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 3

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE. Poids anc.	Poids nouv.	MODE D'ADMINISTRATION.
PHELLANDRE. *Phellandrium aquaticum.* Excitant, aromatique, astringent (1).	Semences en poudre.	De 12 à 24 grains.	De 6 à 12 décigr.	En pilules.
PHOSPHATE DE SOUDE. *Phosphas sodæ.* Laxatif.	En substance.	De 1 à 2 onces.	De 32 à 64 gramm.	Dans du bouillon aux herbes.
PHOSPHORE. *Phosphorus.* Stimulant énergique. VÉNÉNEUX (2).	*Idem.*	De 1/5 de gr. à 1 grain.	De 1 à 5 centigr.	Dissous dans l'huile, mêlé aux potions.
	Éther phosphoré.	De 18 à 36 gouttes.	»	En potions émulsions.
PIED DE VEAU. *Arum maculatum.* Excitant, rubéfiant, vésicant.	Racine sèche.	De 2 à 4 gros.	De 8 16 gramm.	En décoction.
	Poudre.	De 6 à 24 grains.	De 3 à 12 décigr.	En pilules opiat.

à 7, 1/3; de 7 à 14, 1/2; de 14 à 20, 2/3; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINISTRATION.	*REMARQUES.*
Poids anc.	Poids nouv.		
»	»	»	
»	»	»	(1) Le *Phellandrium aquaticum* a été expérimenté plusieurs fois dans la phthisie pulmonaire; l'un de nous (M. Bricheteau), qui en a fait souvent usage en l'associant à l'opium et à la ciguë, est parvenu, au moyen de cette composition, à diminuer considérablement l'expectoration qui épuise les phthisiques, et à calmer en même temps leurs souffrances; voici la formule qu'il emploie : *Phelland. aquat.* . . 1 gros. Extrait. de ciguë. . 9 grains. Opium . . . . . 6 grains. Sirop de fleurs d'orange. q. suf. Pour 30 pilules; on commence par une.
De 1 à 2 grains.	De 5 à 10 centigr.	Dissous dans l'huile et mêlée à de l'axonge.	
»	»	»	
Quantité indéterminée de racines fraîches.	»	En épithême.	
	»	»	(2) Les doses auxquelles on a prescrit le phosphore sont singulièrement variables; tandis que des médecins d'ailleurs très-recommandables, tels que *Desbois*, de *Roche-*

Doses. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 3

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE. Poids anc.	Poids nouv.	MODE D'ADMINISTRATION.
PIERRE INFERNALE. *Voy.* Argent.	»	»	»	»
PIGNON D'INDE. *Voy.* Croton tiglium.	»	»	»	»
PIGNON DOUX. (Graines du *pinus sativus.*) Adoucissant (1).	Semences.	De 2 à 4 onces.	De 64 à 128 gram.	En émulsion.
PILULES ANTE CIBUM. (Pilules d'aloès et de quinquina.) Excitant.	Pilules de 4 grains.	De 4 à 12 grains.	De 2 à 6 décigr.	»
PILULES ANTI-SCROFULEUSES. (Pilules d'antimoine et de sulfure noir de mercure.)	*Idem.*	De 18 à 36 grains.	De 1 à 2 gramm.	»

à 7, 1/3; de 7 à 14, 1/2; de 14 à 20, 2/3; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINISTRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
»	»	»	*fort*, Alphonse *Leroy*, *Remer*, en prescrivaient de 4 à 10 grains dans des potions, d'autres, comme *Poilroux*, l'administraient à des doses si minimes, qu'une cuillerée de potion ne contenait pas plus de 1/864 de grain de phosphore; nous avons pris le milieu entre ces deux extrêmes, en adoptant au surplus la dose indiquée par *Hufeland*.
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	*Antidotes*. Ils sont les mêmes que ceux des poisons les plus corrosifs.
»	»	»	(1) Les pignons doux ne doivent pas être confondus avec les pignons d'Inde, qui sont un violent purgatif. Les premiers doivent être employés lorsqu'ils sont mûrs et exempts de rancidité.

Doses. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 3

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE. Poids anc.	Poids nouv.	MODE D'ADMINISTRATION.
Pilules bénites de Fuller. (Pilules d'aloès et de gomme résine fétide) Excitant.	Pilules de 4 grains.	De 8 à 16 grains.	De 4 à 8 décigr.	Deux le matin et deux le soir.
Pilules de Belloste. (Pilules mercurielles avec la scammonée et l'aloès. Purgatif (1).	*Idem.*	De 8 à 36 grains.	De 4 à 18 decigr.	»
Pilules de Cynoglosse. (Pilules d'extrait d'opium.) Calmant (2).	*Idem.*	De 4 à 8 grains.	De 2 à 4 décigr.	»
Pilules écossaises. (Pilules d'Anderson.) Purgatif.	*Idem.*	De 4 à 16 grains.	De 2 à 8 décigr.	»

à 7, 1/3; de 7 à 14, 1/2; de 14 à 20, 2/3; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINISTRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	(1) Une foule de formules pour la préparation de ces pilules, ont été consignées dans les divers ouvrages. La plupart de ces formules varient et pour les substances, et pour les proportions.
»	»	»	(2) Dans le *Codex*, on a donné mal à propos le nom de *pilules d'extrait d'opium* aux pilules de cynoglosse. Cette dénomination peut induire en erreur.

Doses. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes) ; de 1 à 3, 1/6; de 3

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE. Poids anc.	Poids nouv	MODE D'ADMINISTRATION.
PILULES HYDRAGOGUES DE BONTIUS. (Pilules d'aloès et de gommegutte.) Purgatif.	Pilules de 4 grains.	De 12 à 36 grains.	De 6 à 18 décigr.	»
PILULES DE MORTON. (Pilules balsamiques.) Excitant.	Pilules de 1 grain.	De 6 à 12 grains.	De 3 à 6 décigr.	»
PILULES DE RUFUS. (Pilules d'aloès et de myrrhe.) Purgatif.	Pilules de 4 grains.	De 12 à 36 grains.	De 6 à 18 décigr.	»
PILULES DE SAVON. Diurétique, laxatif (1).	*Idem.*	De 18 à 36 grains.	De 1 à 2 gramm.	»
PILULES DE SAVON ET D'ALOÈS. Laxatif.	*Idem.*	De 8 à 16 grains.	De 4 à 8 décigr.	»

à 7, 1/3; de 7 à 14, 1/2; de 14 à 20, 2/3; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINISTRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	(1) Les pilules de savon sont préparées avec savon 16 parties, poudre de guimauve 1 partie. Cette petite quantité de guimauve leur donne une couleur jaunâtre, une odeur et une saveur désagréable. On peut remplacer avec avantage cette poudre inerte par de l'amidon. Les pilules sont alors blanches, et elles n'ont ni odeur ni saveur désagréable.
«	»	»	

Doses. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 3

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE. Poids anc.	Poids nouv.	MODE D'ADMINISTRATION.
PILULES. SCILLITIQUES. Diurétique.	Pilules de 2 grains.	De 6 à 12 grains.	De 3 à 6 décigr.	»
PILULES TONIQUES DE BACHER. (Pilules d'ellébore et de myrrhe.) Diurétique, emménagogue (1).	Pilules d'un 1/2 gr.	De 2 à 10 grains.	De 1 à 5 décigr.	»
PIMENT DE LA JAMAÏQUE. *Myrtus pimenta.* Tonique (2).	Poudre.	De 6 à 12 grains.	De 3 à 6 décigr.	En pilules.
	Eau distillée.	De 1 à 2 onces.	De 32 à 64 gramm.	En potion.
	Huile volatile.	De 1 à 5 gouttes.	»	Sur du sucre.
	Teinture.	De 2 à 4 gros.	De 8 à 16 gramm.	En potion.
PIMPRENELLE NOIRE. *Sanguisorba officinalis.* Astringent.	Racine.	De 1 à 2 onces.	De 32 à 64 gramm.	En décoction.

à 7, 1/3; de 7 à 14, 1/2; de 14 à 20, 2/3; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINISTRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
»	»	»	
»	»	»	(1) La dose des pilules de *Bacher* est fixée, par la plupart des auteurs, à un demi-grain; mais M. Portal, qui a souvent prescrit ces pilules, dit qu'on peut en donner depuis 2 jusqu'à 10 grains, suivant qu'on veut produire un effet excitant ou un effet purgatif.
»	»	»	
»	»	»	(2) On a depuis peu annoncé qu'on avait découvert dans le *capsicum annuum* une substance cristallisée alcaline.
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	

Doses. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 3

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE. Poids anc.	Poids nouv.	MODE D'ADMINISTRATION.
Pin d'Écosse. *Pinus sylvestris.* Stimulant.	Bourgeons (1).	De 4 gros à 1 once.	De 16 à 32 gramm.	En décoction.
	Poudre de bourgeons.	De 1 à 2 gros.	De 4 à 8 gramm.	En opiat.
Piperin. *Piperinum.* Fébrifuge (2).	En substance.	De 4 à 8 grains,	De 2 à 4 décigr.	En pilules.
Pissenlit. *Leontodon taraxacum.* Amer.	Racine.	De 2 à 3 onces.	De 64 à 96 gramm.	En décoction.
	Feuilles.	De 2 à 3 onces.	De 64 à 96 gramm.	*Idem.*
	Extrait.	De 1 à 2 gros.	De 4 à 8 gramm.	En bols.
	Suc exprimé.	De 2 à 4 onces.	De 64 à 128 gram.	En substance.
Pistachier. *Pistacia vera.* Adoucissant.	Amandes.	De 1 à 2 onces.	De 32 à 64 gramm.	En émulsion.

à 7, 1/3; de 7 à 14, 1/2; de 14 à 20, 2/3; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINISTRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
De 1 à 2 onces.	De 32 à 64 gramm.	En décoction, pour lotions, injections.	(1) Ces bourgeons contiennent une matière résineuse qui a de la ressemblance avec la térébenthine cuite. Cette matière qui a été examinée par l'un de nous (M. Chevallier), est d'une saveur très-agréable.
»	»	»	
»	»	»	
»	»		
Quantité indéterminée.		En cataplasme.	
»	»	»	
»	»	»	(2) Le piperin est une substance cristalline découverte dans le poivre noir, par Oersted; ce produit a été examiné par MM. Pelletier, Poutet et Meli.
»	»	»	

Doses. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes) ; de 1 à 3, 1/6 ; de 3

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE. Poids anc.	Poids nouv.	MODE D'ADMINISTRATION.
Pivoine. *Pæonia officinalis.* Antispasmodique.	Racine.	De 4 gros à 1 once.	De 16 à 32 gramm.	En décoction.
	Poudre de la racine.	De 36 grains à 1 gros.	De 2 à 4 gramm.	En bols.
	Fleurs.	De 2 à 4 gros.	De 8 à 16 gramm.	En infusion.
	Semences.	De 2 à 4 onces.	De 8 à 16 gramm.	*Idem.*
	Sirop.	De 4 gros à 2 onces.	De 16 à 64 gramm.	En potion, tisane.
	Suc des feuilles.	De 1 à 3 onces.	De 32 à 96 gramm.	En substance.
	Teinture.	De 36 grains à 1 gros.	De 2 à 4 gramm.	En potion.
Plantain (Grand). *Plantago major.* Astringent.	Feuilles.	De 1 à 2 onces.	De 32 à 64 gram.	En décoction.
	Eau distillée (1).	De 2 à 4 onces.	De 64 à 128 gram.	En potion.

à 7, 1/3 ; de 7 à 14, 1/2 ; de 14 à 20, 2/3 ; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINISTRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
Quantité indéterminée.	»	En cataplasme.	(1) L'eau distillée de plantain est depuis un temps immémorial associée à l'eau de roses pour la préparation des collyres ; c'est à cette dernière espèce d'eau distillée qu'il faut attribuer les effets qu'on obtient de ces collyres.
Idem.	»	En collyre.	

Doses. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 3

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE. Poids anc.	Poids nouv.	MODE D'ADMINISTRATION.
Poivre cubèbe. *Voy.* Cubébe.	«	«	«	«
Poivre noir. *Piper nigrum.* Stimulant, fébrifuge.	Fruit en poudre.	De 6 à 12 grains.	De 3 à 6 décigr.	En pilules.
Polygala de Virginie. *Polygala senega.* Stimulant (1).	Racine.	De 4 gros à 1 once.	De 16 à 32 gramm.	En décoction.
	Poudre.	De 36 grains à 1 gros.	De 2 à 4 gramm.	En pilules.
	Extrait.	De 36 grains à 1 gros.	De 2 à 4 gramm.	En bols.
	Vin.	De 4 gros à 1 once.	De 16 à 32 gramm.	En substance.
Polypode de chêne. *Polypodium vulgare.* Laxatif.	Racine.	De 1 à 2 onces.	De 32 à 64 gramm.	En décoction.
	Poudre.	De 36 grains à 1 gros.	De 2 à 4 gramm.	En pilules.

à 7, 1/3 ; de 7 à 14, 1/2 ; de 14 à 20, 2/3 ; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINISTRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
«	«	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	(1) Le *Polygala vulgaris* et le *Polygala amara* peuvent être employés comme succédanés du *Polygala senega*.
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	

Doses. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 3

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE. Poids anc.	Poids nouv.	MODE D'ADMINISTRATION.
Pommade d'Authenrieth. Vésicant.	»	»	»	»
Pommade de Gondret (1).	»	»	»	»
Pomme épineuse. *Voy.* Stramoine.	»	»	»	»
Poudre absorbante ou anti-acide. (Poudre de magnésie composée.)	En substance.	De 1 à 2 gros.	De 4 à 8 gramm.	Délayée dans l'eau.
Poudre anti-arthritique amère. (Poudre amère composée.)	*Idem.*	De 18 à 54 grains.	De 9 à 27 décigr.	*Idem.*

à 7, 1/3; de 7 à 14, 1/2; de 14 à 20, 2/3; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINISTRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
De 36 grains à 1 gros.	De 2 à 4 gramm.	En friction.	
De 2 à 4 gros.	De 8 à 16 gramm.	En friction, en épithême caustique.	(1) La pommade de Gondret a pour base l'ammoniaque liquide qui se trouve dans la proportion d'une partie d'alcali sur 1/2 partie de suif de mouton et 1/2 partie d'huile d'amandes douces. Cette pommade est employée pour cautériser la peau et produire une escharre plus ou moins profonde. L'inventeur de cette composition, qui s'occupe spécialement des maladies des yeux, la regarde comme un puissant dérivatif contre le développement de la cataracte.
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	

DOSES. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 2 à 3, 1/6; de 3

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE. Poids anc.	Poids nouv.	MODE D'ADMINISTRATION.
POUDRE ANTI-ARTHRITIQUE PURGATIVE. (Poudre de séné, de scammonée et de bois.)	En substance.	De 36 grains à 1 gros.	De 2 à 4 gramm.	Dans un véhicule approprié.
POUDRE ANTI-ASTHMATIQUE OU INCISIVE. (Poudre de soufre et de scille.)	*Idem.*	De 12 à 36 grains.	De 6 à 18 décigr.	Délayée dans un véhicule approprié.
POUDRE ANTIMONIALE DE JAMES. (Poudre de phosphate de chaux et d'antimoine.) Diaphorétique.	*Idem.*	De 1 gros à 1 gros 1/2.	De 4 à 6 gramm.	Délayée dans l'eau.
POUDRE D'ARUM COMPOSÉE. (Poudre stomachique de Birckmann.) Excitant.	*Idem.*	De 18 grains à 1 gros.	De 1 à 4 gramm.	*Idem.* (1)

à 7, 1/3 ; de 7 à 14, 1/2 ; de 14 à 20, 2/3 ; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINISTRATION.	*REMARQUES.*
Poids anc.	Poids nouv.		
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	(1) Pour préparer cette poudre on recommande d'employer la racine lorsque les feuilles commencent à pousser; il faut aussi avoir soin de la faire sécher avant de la pulvériser; cette précaution a pour objet de diminuer la vertu âcre et purgative de la plante.

DOSES. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes) ; de 1 à 3, 1/6 ; de 3

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE. Poids anc.	Poids nouv.	MODE D'ADMINISTRATION.
POUDRE CATHARTIQUE. (Poudre de jalap et de scammonée composée.)	En substance.	De 10 à 16 grains.	De 5 à 8 décigr.	Délayée dans l'eau.
POUDRE CORNACHINE ou DE TRIBUS. (Poudre de scammonée et d'antimoine composée.) Purgatif (1).	*Idem.*	De 18 grains à 1 gros.	De 1 à 4 gramm.	*Idem.*
POUDRE DE DOWER. (Poudre d'ipécacuanha et d'opium composée.) Sudorifique, calmant.	*Idem.*	De 12 à 24 grains.	De 6 à 12 décigr.	*Idem.*
POUDRE HYDRAGOGUE. (Poudre de gomme-gutte composée.) Drastique.	*Idem.*	De 12 à 36 grains.	De 6 à 18 décigr.	*Idem.*

à 7, 1/3 ; de 7 à 14, 1/2 ; de 14 à 20, 2/3 ; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINISTRATION.	*REMARQUES.*
Poids anc.	Poids nouv.		
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	(1) Cette poudre qui est aussi connue sous le nom de poudre du comte de *Warwick*, devient émétique en vieillissant, probablement par suite de la décomposition de la crême de tartre et de la combinaison de l'acide tartareux avec l'antimoine; ce qui a lieu surtout, selon Baumé, lorsque la préparation antimoniale est faite avec peu de soin.
»	»	»	

Doses. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 3

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE. Poids an c	Poids nouv.	MODE D'ADMINISTRATION.
Poudre de savon végétal. (Poudre gommeuse alcaline.) Anti-acide.	En substance.	De 36 grains à 1 gros.	De 2 à 4 gramm.	Délayée dans l'eau.
Poudre tempérante de Stahl. (Poudre de sulfate de potasse composée.)	*Idem.*	De 12 à 36 grains.	De 6 à 18 décigr.	*Idem.* (1)
Poudre de Tribus. *Voy.* Poudre cornachine.	»	»	»	»
Poudre vermifuge sans mercure. (Poudre d'helminthocorton composée.)	*Idem.*	De 18 grains à 1 gros.	De 1 à 4 gramm.	Délayée dans l'eau.

à 7, 1/3; de 7 à 14, 1/2; de 14 à 20, 2/3; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINISTRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
»	»	»	
»	»	»	(1) La poudre tempérante de Stahl, qu'on trouve dans les officines, est composée de nitrate, de sulfate de potasse et de cinabre. Il ne faut pas la confondre avec les poudres de Stahl découvertes en 1814 selon M. Wetzler.
»	»	»	
»	»	»	

Doses. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 3

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE. Poids anc.	Poids nouv.	MODE D'ADMINISTRATION.
Poudre vermifuge mercurielle. (Poudre de sulfure noir de mercure et de scammonée.)	En substance.	De 12 à 24 grains.	De 6 à 12 décigr.	Délayée dans l'eau.
Pourpier. *Portulaca oleracea.*	Eau distillée.	De 2 à 4 onces.	De 64 à 128 gram.	En potion.
Rafraîchissant, mucilagineux. (1).	Suc de l'herbe.	De 2 à 4 onces.	De 64 à 128 gram.	En substance.
Précipité blanc. *Voy.* Mercure doux.	»	»	»	»
Précipité rouge. *Voy.* Oxide rouge de mercure.	»	»	»	»
Prêle. *Equisetum sylvaticum.* Diurétique (2).	Tige.	De 2 à 4 gros.	De 8 à 16 gramm.	En décoction.

à 7, 1/3; de 7 à 14, 1/2; de 14 à 20, 2/3; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINISTRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
»	»	»	
»	«	»	(1) L'eau distillée de pourpier doit la réputation de vermifuge dont elle a joui pendant long-temps au *semen contra* qu'on avait soin d'y ajouter. Elle n'est plus employée aujourd'hui que comme excipient. La graine de pourpier faisait autrefois partie des *quatre semences froides mineures*.
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	(2) Cette plante, tombée depuis long-temps en désuétude, a été récemment vantée comme un diurétique puissant, par le professeur Lenhossek de Vienne. L'un de nous (M. Cottereau) a fait avec M. le docteur Parmentier de *Tours* une série d'expériences confirmatives de l'assertion du médecin de Vienne.
»	»	»	

Doses. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 3

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE. Poids anc.	Poids nouv.	MODE D'ADMINISTRATION.
PRUNIER SAUVAGE. (Prunellier.) *Prunus spinosa.* Fébrifuge, astringent (1).	Écorce.	De 4 gros à 1 once.	De 16 à 32 gramm.	En décoction.
	Fruits.	De 2 à 4 onces.	De 64 à 128 gram.	*Idem.*
PRUSSIATE DE MERCURE. *Hydrocyanas hydrargiry.* Antisyphilitique, VÉNÉNEUX	En substance.	D'un 8e à 1/6 de grain.	»	En pilules ou dissous.
PULMONAIRE. *Pulmonaria officinalis.* Amer, mucilagineux.	Feuilles.	De 4 gros à 1 once.	De 16 à 32 gramm.	En décoction.
PULSATILLE. *Voy.* Anémone pulsatille.	»	»	»	»
PYRÈTHRE. *Anthemis pyrethrum.* Acre, stimulant.	Racine (2).	»	»	»
	Racine pulvérisée.	De 4 à 10 grains.	De 2 à 5 décigr.	En pilules.

à 7, 1/3; de 7 à 14, 1/2; de 14 à 20, 2/3; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINISTRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	(1) On faisait autrefois, avec les fruits encore verts du prunellier, un extrait qui portait le nom d'*acacia nostras*, ou acacia d'Allemagne, qu'on substituait souvent à l'acacia d'Egypte, ou suc épaisi du *mimosa nilotica*, arbre qui fournit la gomme arabique. Lorsque les prunelles sont dans un état de maturité parfaite, elles perdent leur saveur acerbe, et au lieu d'être astringentes, elles sont purgatives; il serait important et utile d'expérimenter si les fruits indigènes du prunellier pourraient, comme on l'a prétendu, remplacer les tamarins.
»	»	»	
»	»	»	
De 1 à 2 onces.	De 32 à 64 gramm.	En décoction pour gargarisme,	(2) Cette racine est employée comme masticatoire pour exciter la sécrétion salivaire, et calmer l'odontalgie.
»	»	»	

DOSES. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 3

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE. Poids anc.	Poids nouv.	MODE D'ADMINISTRATION.
QUASSIA. *Quassia amara.* Amer, tonique (1).	Bois.	De 1 à 2 gros.	De 4 à 8 gramm.	En macérat à prendre 1 2 onc. par
	Poudre.	De 18 à 36 grains.	De 1 à 2 gramm.	Délayée en pilules.
	Teinture.	De 18 à 36 grains.	De 1 à 2 gramm.	En potion
	Vin.	De 4 gros à 1 once.	De 16 à 32 gramm.	En substance
QUINQUINA. *Cinchona.* Tonique, fébrifuge (2).	Écorce entière.	De 2 gros à 1 once.	De 8 à 32 gramm.	En décoct infusion macération
	Poudre.	De 1 à 4 gros.	De 4 à 16 gramm.	Délayée ou en opiat
	Extrait mou.	De 18 grains à 1 gros.	De 1 à 4 gramm.	En pilules
	Extrait sec.	De 12 à 36 grains.	De 6 à 18 décigr.	*Idem.*
	Sirop aqueux.	De 2 gros à 2 onces.	De 8 à 64 gramm.	En potion tisane.
	Sirop vineux.	De 2 gros à 2 onces.	De 8 à 64 gramm.	*Idem.*
	Teinture.	36 gra. à 2 gr.	2 à 8 gram.	En potion.

à 7, 1/3; de 7 à 14, 1/2; de 14 à 20, 2/3; de 20 à 60, la dose des adulte

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINISTRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	(1) D'après l'analyse chimique qu'on a faite du quassia, ce bois, contenant plus de parties gommeuses que de parties résineuses, on doit employer de préférence l'infusion à froid. Thompson a trouvé dans le quassia un principe particulier qu'il appelle *quassine*.
»	»	»	
De 4 gros à 2 onces.	De 16 à 64 gramm.	En décoct., pour lotion, lavem, etc.	
De 2 gros à 1 once.	De 8 à 32 gramm.	En lavement.	(2) Le nombre des espèces et variétés de quinquina est très-considérable; des auteurs l'ont porté jusqu'à vingt-quatre et plus. Les espèces les plus connues dans la pharmacologie, sont le *jaune*, le *gris* et le *rouge*. C'est le jaune qui fournit le plus de quinine; mais le rouge, contenant une quantité supérieure de *quinine* et de *cinchonine* réunies, doit être le plus efficace.
De 36 grains à 2 gros.	De 2 à 8 gramm.	*Idem.*	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	

Doses. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 3

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE. Poids anc.	Poids nouv.	MODE D'ADMINISTRATION.
	Vin (de quinquina.)	De 2 à 4 onces.	De 64 à 128 gram.	En substance.
QUINQUINA FACTICE. (1)	»	»	»	»
QUININE. *Kinina.* *Voy.* Sulfate de quinine.	»	»	«	»
RACINES APÉRITIVES. *Radices aperientes.*	En substance.	De 4 gros à 1 once.	De 16 à 32 gramm.	En décoction.
RAIFORT SAUVAGE. *Cochlearia armoracia.* Antiscorbutique, âcre (2).	Racine fraîche râpée.	»	»	»
RAISIN D'OURS. *Voy.* Arbousier.	»	»	»	»

à 7, 1/3; de 7 à 14, 1/2; de 14 à 20, 2/3; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINISTRATION.	*REMARQUES.*
Poids anc.	Poids nouv.		
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	(1) Alphonse Leroy avait proposé, sous le nom de quinquina *artificiel français*, un mélange composé de poudre d'écorce de chêne, de trochisque alhandal et de quelques autres substances insignifiantes. Les expériences qu'on a faites à l'Hôtel-Dieu de Paris, avec ce composé, n'ont eu aucun succès.
»	»	»	
Quantité indéterminée.	»	En sinapisme, comme succédané de la moutarde.	(2) Le raifort sauvage entre dans la composition du sirop et du vin antiscorbutiques; on en préparait autrefois une eau distillée, vantée contre la gravelle, mais qui est tombée en désuétude. Le raifort fait la base de l'*alcoolat de cochléaria composé.*
»	»	»	

DOSES. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 3

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE. Poids anc.	Poids nouv.	MODE D'ADMINISTRATION.
RATHANIA. *Krameria triandra.* Astringent.	Racine.	De 2 à 4 gros.	De 8 à 16 gramm.	En décoction.
	Extrait (1).	De 1 à 2 gros.	De 4 à 8 gramm.	En potion, pilules, opiat.
	Teinture.	De 36 grains à 1 gros.	De 2 à 4 gramm.	En potion.
RHUBARBE. *Rheum palmatum, rheum undulatum et rheum compactum.* Amer, purgatif (2).	Racine.	De 2 à 4 gros.	De 8 à 16 gramm.	En décoct., infusion ou macération.
	Poudre.	De 36 grains à 1 gros.	De 2 à 4 gramm.	En pilules ou opiat.
	Extrait.	De 36 grains à 1 gros.	De 2 à 4 gramm.	En pilules.
	Sirop.	De 4 gros à 1 once.	De 16 à 32 gramm.	En potion.
	Teinture.	De 36 grains à 1 gros.	De 2 à 4 gramm.	En potion.
	Vin.	De 4 gros à 1 once.	De 16 à 32 gramm.	En substance.

à 7, 1/3; de 7 à 14, 1/2; de 14 à 20, 2/3; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINISTRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
De 1 à 2 onces.	De 32 à 64 gramm.	En decoction pour injection, lavement.	
De 2 à 3 gros.	De 8 à 12 gramm.	En inject., lavement.	(1) Des médecins espagnols prescrivent d'ajouter une certaine quantité d'un acide végétal, (vinaigre), à l'extrait de rathania, pour en accroître l'efficacité; mais cette addition, conseillée aussi par quelques praticiens français, est tout-à-fait inutile.
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	(2) La *Rhubarbe rhapontic* jouit des mêmes propriétés, mais à un degré plus faible; on doit en donner des doses doubles pour obtenir les mêmes effets.
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	

Doses. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 3

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE. Poids anc.	Poids nouv.	MODE D'ADMINISTRATION.
Rhue. *Ruta graveolens.* Excitant, emménagogue (1).	Feuilles.	De 18 grains à 1 gros.	De 1 à 4 gramm.	En infusion.
	Poudre.	De 12 à 24 grains.	De 6 à 12 décigr.	En pilules, opiat.
	Eau distillée.	De 1 à 2 onces.	De 32 à 64 gramm.	En potion.
	Huile essentielle.	De 3 à 6 gouttes.	»	Sur du sucre, ou en émulsion.
	Vinaigre.	»	»	»
Rhus. *Rhus radicans vel toxicodendron.* *Voy.* Sumac.	»	»	»	»
Ricin. (Fruit du *ricinus communis.*) Purgatif, anthelmintique (2).	Huile.	De 6 gros à 2 onces.	De 24 à 64 gramm.	En potion, émulsion, ou dans des bouillons.

à 7, 1/3 ; de 7 à 14, 1/2 ; de 14 à 20, 2/3 ; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINISTRATION.	*REMARQUES.*
Poids anc.	Poids nouv.		
De 36 grains à 2 gros.	De 2 à 8 gramm.	En lavement, en fumigations.	
»	»	»	
»	»	»	(1) La rhue de montagne qui est munie de folioles linéaires aiguës, et qui ne paraît être qu'une variété de la rhue des jardins, jouit des mêmes propriétés et peut lui être substituée.
»	»		
De 4 gros à 2 onces.	De 16 à 64 gramm.	En lavement, lotion, fomentation.	
»	»	»	
De 1 à 2 onces.	De 32 à 64 gram.	En lavement.	(2) On doit employer l'huile récente ; celle qui est devenue rance par vétusté donne lieu à des irritations de la gorge, etc.

DOSES. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 33

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE. Poids anc.	Poids nouv.	MODE D'ADMINISTRATION.
RIZ. (Fruit de l'*oriza sativa*.) Mucilagineux, nutritif.	Semences.	De 4 à 6 gros.	De 16 à 24 gramm.	En décoction.
ROMARIN. *Rosmarinus officinalis.* Aromatique, tonique (1).	Sommités fleuries.	De 1 à 2 gros.	De 4 à 8 gramm.	En infusion aqueuse ou vineuse.
	Eau distillée.	De 1 à 3 onces.	De 32 à 96 gramm.	En potion.
	Huile essentielle.	De 2 à 8 gouttes.	»	Sur du sucre, en potion, en émulsion.
	Poudre.	De 36 grains à 1 gros.	De 2 à 4 gramm.	En pilules.
	Teinture.	De 1 à 2 gros.	De 4 à 8 gramm.	En potion.
	Vinaigre.	»	»	»
RONCE. *Rubus fruticosus.* Astringent.	Feuilles.	»	»	»

à 7, 1/3; de 7 à 14, 1/2; de 14 à 20, 2/3; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINISTRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
De 6 gros. à 1 once.	De 24 à 32 gramm.	En décoction, pour lavement.	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	(1) Les fleurs de romarin sont désignées dans les anciennes pharmacopées sous le nom d'*anthos* (fleur par excellence). Le calice est la partie de la plante la plus aromatique et par conséquent la plus énergique. La corolle paraît presque inerte. L'eau dite *de la Reine de Hongrie* s'obtient par la distillation des fleurs de romarin avec l'alcool.
»	»	»	
»	»	»	
De 2 à 6 gros.	De 8 à 24 gramm.	En lotion.	
De 2 à 4 gros.	De 8 à 16 gramm.	En infusion ou décoct. pour gargarisme.	

Doses. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 3

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE. Poids anc.	Poids nouv.	MODE D'ADMINISTRATION.
Rose rouge R. de Provins. *Rosa gallica.* Tonique, astringent (1).	Pétales.	De 1 à 3 gros.	De 4 à 12 gramm.	En infusion.
	Conserve.	De 1 à 6 gros.	De 4 à 24 gramm	En nature.
	Eau distillée (2).	De 1 à 2 onces.	De 32 à 64 gramm.	En potion.
	Huile volatile.	De 1 à 2 gouttes.	»	Dans des potions, les pastilles.
	Miel rosat.	»	»	»
	Suc.	De 1 à 4 gros.	De 4 à 16 gramm.	En potion ou édulcoré.
Roseau a balais. *Arundo phragmites.* Diurétique, présumé antisyphilitique(3).	Racine.	De 4 gros à 2 onces.	De 16 à 64 gramm.	En décoction.

à 7, 1/3 ; de 7 à 14, 1/2 ; de 14 à 20, 2/3 ; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINISTRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
De 4 à 6 gros.	De 16 à 24 gramm.	En décoction, pour lotion.	
»	»	»	
Quantité indéterminée.	»	Dans les collyres.	(1) Les pétales des fleurs de plusieurs autres rosiers (*R. Pallida*, *R. Alba*, *R. Canina*), jouissent à peu près des mêmes propriétés que ceux de la rose rouge.
Idem.	»	Pour aromatiser les poudres dentifrices.	
De 1 à 2 onces.	De 32 à 64 gram.	En gargarisme.	(2) L'eau distillée et l'huile essentielle, se préparent avec le *Rosa centifolia*.
»	»	»	
«	»	»	
			(3) Quelques auteurs prétendent que l'*arundo phragmites* fait partie des substances qui servent à préparer le médicament secret très connu sous le nom de *rob anti-syphilitique*.

Doses. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 3

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE. Poids anc.	Poids nouv.	MODE D'ADMINISTRATION.
SABINE. *Juniperus sabina.* Excitant emménagogue. VÉNÉNEUX (1).	Feuilles.	De 24 à 36 grains.	De 12 à 18 décigr.	En infusion.
	Poudre.	De 12 à 18 grains.	De 6 à 9 décigr.	En pilules.
	Huile essentielle.	De 1 à 2 gouttes.	»	En émulsion.
	Extrait.	De 12 à 24 grains.	De 6 à 12 décigr.	En pilules, bols.
SAFRAN. *Crocus sativus.* Excitant emménagogue, antispasmodique (2).	Stigmates.	De 18 à 36 grains.	De 1 à 2 gramm.	En infusion
	Extrait.	De 6 à 12 grains.	De 3 à 6 décigr.	En pilules.
	Poudre.	De 10 à 20 grains.	De 5 à 10 décigr.	En pilules, ou délayée.
	Sirop.	De 4 à 8 gros.	De 16 à 32 gramm.	En potion.
	Teinture.	De 18 à 36 grains.	De 9 à 18 décigr.	*Idem.*

à 7, 1/3; de 7 à 14, 1/2; de 14 à 20, 2/3; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINISTRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
»	»	»	
Quantité indéterminée.	»	Pour détruire les excroissances vénériennes, et exciter les ulcères atoniques.	(1) On doit rarement prescrire la sabine à l'intérieur; cette plante, regardée par le vulgaire comme emménagogue, a plus d'une fois produit l'avortement, des accidens plus graves et même la mort. Quand les praticiens se déterminent à faire usage de ce médicament, à l'intérieur, il convient de lui associer quelque substance mucilagineuse comme correctif.
»	»		
»	»		
»	»	»	
»	»	»	(2) Le safran a été regardé à tort comme narcotique et vénéneux; il jouit tout au plus d'une propriété antispasmodique. Ce médicament entre dans une multitude de *compositions officinales*; de ce nombre sont : la *thériaque*, la *confection d'hyacinthe*, les *pilules de Rufus*, de *cynoglosse*, le *laudanum de Sydenham*, etc.
»	»	»	
»	»	»	
De 1 à 2 gros.	De 4 à 8 gramm.	Sur des cataplasmes, en lotion.	

Doses. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 3

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE. Poids anc.	Poids nouv.	MODE D'ADMINISTRATION.
SAFRAN DE MARS. *Voy.* Oxide de fer.	»	»	»	»
SALICAIRE. *Lythrum salicaria.* Astringent.	Feuilles.	1 once.	32 gramm.	En décoction.
	Poudre.	De 18 grains à 1 gros.	De 1 à 4 gramm.	En bols, pilules.
SALSEPAREILLE. *Smilax sarsaparilla.* Mucilagineux, sudorifique (1).	Racine.	De 1 à 4 onces.	De 32 à 128 gram.	En décoction.
	Extrait.	De 1 à 2 gros.	De 4 à 8 gramm.	En bols.
	Poudre.	De 1 à 2 gros.	De 4 à 8 gramm.	En opiat.
	Sirop.	De 2 à 4 onces.	De 64 à 128 gram.	Dans les tisanes.
SANG DRAGON. (Suc sec du *dracœna draco.*) Astringent.	En substance.	De 1 à 2 gros.	De 4 à 8 gramm.	En décoction.
	Poudre.	De 18 à 36 grains.	De 1 à 2 gramm.	En pilules.

à 7, 1/3; de 7 à 14, 1/2; de 14 à 20, 2/3; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINISTRATION.	*REMARQUES.*
Poids anc.	Poids nouv.		
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	(1) La salsepareille entre dans divers médicamens réputés antisyphilitiques, comme la tisane de *Feltz*, le sirop de Mittié, le rob de *Laffecteur*, etc.
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	

Doses. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 3

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE. Poids anc.	Poids nouv.	MODE D'ADMINISTRATION.
SANTAL CITRIN. *Santalam album.* Amer, stimulant.	Bois râpé.	De 2 gros à 1 once.	De 8 à 32 gramm.	En décoction.
	Poudre.	De 18 à 36 grains.	De 1 à 2 gramm.	En bols.
SANTAL ROUGE. *Pterocarpus santalinus.* Stimulant.	Bois râpé.	De 4 gros à 2 onces.	De 16 à 64 gramm.	En décoction.
	Poudre.	De 36 grains à 1 gros.	De 2 à 4 gramm.	En bols.
SANTOLINE ou BARBOTINE. *Voy.* Semencontra.	»	»	»	»
SAPIN. *Pinus abies.* Stimulant.	Bourgeons.	De 4 gros à 1 once.	De 16 à 32 gramm.	En décoction.
SAPONAIRE. *Saponaria officinalis.* Excitant (1).	Feuilles.	De 4 gros à 1 once.	De 16 à 32 gramm.	*Idem.*
	Extrait.	De 36 grains à 1 gros.	De 2 à 4 gramm.	En bols, pilules.
	Poudre.	De 36 grains à 1 gros.	De 2 à 4 gramm.	*Idem.*
	Suc.	De 1 à 2 onces.	De 32 à 64 gramm.	En nature.

à 7, 1/3 ; de 7 à 14, 1/2 ; de 14 à 20, 2/3 ; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINISTRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
Quantité indéterminée.	»	En cataplasme.	(1) Quelques auteurs pensent que la saponaire est un médicament inerte qui devrait être banni des officines ; mais cette opinion mériterait d'être examinée. Des praticiens assurent avoir employé cette plante avec avantage comme succédané de la salsepareille.
»	»	»	
»	«	»	
»	»	»	

DOSES. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes) ; de 1 à 3, 1/6 ; de 3

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE. Poids anc.	Poids nouv.	MODE D'ADMINISTRATION.
SASSAFRAS. *Laurus sassafras.* Sudorifique. (1)	Bois râpé.	De 4 gros à 1 once.	De 16 à 32 gramm.	En infusion.
	Extrait.	De 36 grains à 1 gros.	De 2 à 4 gramm.	En bols.
	Huile essentielle.	De 2 à 5 gouttes.	»	Sur du sucre.
	Poudre.	De 36 grains à 1 gros.	De 2 à 4 gramm.	En bols.
	Teinture.	De 36 grains à 1 gros.	De 2 à 4 gramm.	En potion.
SAUGE. *Salvia officinalis.* Stimulant (2).	Feuilles.	De 1 à 2 gros.	De 4 à 8 gramm.	En infusion.
	Eau distillée.	De 2 à 4 onces.	De 64 à 128 gram.	En potion.
	Huile essentielle.	De 2 à 5 gouttes.	»	En émulsion ou sur du sucre.
	Poudre.	De 18 grains à 1 gros.	De 1 à 4 gramm.	En opiat, bols.
	Teinture.	De 1 à 2 gros.	De 4 à 8 gramm.	En potion.

7, 1/3 ; de 7 à 14, 1/2 ; de 14 à 20, 2/3 ; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINISTRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
»	»	»	
»	»	»	
«	»	»	(1) C'est le bois de la racine dont on fait usage en pharmacie.
»	»	»	
»	»	»	
uantité indéterminée.	»	En décoct., pour lotion, fomentation et bains.	
»	»		(2) L'infusion vineuse de sauge a été recommandée par Van-Swieten, contre l'engorgement des mamelles après l'allaitement. Les bains de sauge sont très-usités contre l'endurcissement du tissu cellulaire des nouveau-nés.
»	»	»	
»	»	»	
»	«	»	

DOSES. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; dè

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE. Poids anc.	Poids nouv.	MODE D'ADMINI TRATION
SAULE BLANC. *Salix alba.* Amer, astringent (1).	Écorce.	De 1 à 2 onces.	De 32 à 64 gramm.	En décocti aqueuse infusion neuse.
	Extrait.	De 1 à 2 gros.	De 4 à 8 gramm.	En bols.
	Poudre.	De 1 à 4 gros.	De 4 à 16 gramm.	En opiat, délayée.
	Vin.	De 2 à 3 onces.	De 64 à 96 gramm.	En nature
SAVON MÉDICINAL. *Sapo medicinalis.* Stimulant.	En nature.	De 18 grains à 1 gros.	De 1 à 4 gramm.	En pilules
	Teinture ou essence.	»	»	»

à 7, 1/3; de 7 à 14, 1/2; de 14 à 20, 2/3; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINISTRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
De 2 à 3 onces.	De 32 à 96 gramm.	En décoction, pour lotions.	
»	»	»	(1) Le saule marceau et le saule fragile jouissent des mêmes propriétés que le saule blanc ; ce saule contient une sorte de *tannin*, qui a beaucoup de rapport avec la matière astringente du *quinquina*.
»	»	»	
Quantité indéterminée.	»	En lotions.	
Idem.	»	Dans les cataplasmes. Dissous dans l'eau, en lotion, fomentation. En suppositoire.	
Idem.	»	Dans les linimens.	

Doses. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 3

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE. Poids anc.	Poids nouv.	MODE D'ADMINISTRATION.
SAVON DE STARKEY. *Sapo Starkeyanus.* Stimulant (1).	En nature.	De 8 à 12 grains.	De 4 à 6 décigr.	En pilules.
SAXIFRAGE. *Saxifraga granulata.* Amer, astringent.	Racine.	De 4 gros à 1 once.	De 16 à 32 gramm.	En décoction.
SCABIEUSE. *Scabiosa succisa.* Amer, tonique (2).	*Idem.*	De 1 à 2 onces.	De 32 à 64 gramm.	*Idem.*
	Feuilles.	De 1 à 2 onces.	De 32 à 64 gramm.	*Idem.*
	Fleurs.	De 1 à 2 gros.	De 4 à 8 gramm.	En infusion.
	Extrait.	De 1 à 2 gros.	De 4 à 8 gramm.	En bols.
	Poudre.	De 36 grains à 1 gros.	De 2 à 4 gramm.	En bols, pilules.

à 7, 1/3 ; de 7 à 14, 1/2 ; de 14 à 20, 2/3 ; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINISTRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
»	»	»	
»	»	»	(1) Le savon de Starkey, qui était autrefois très-usité, est abandonné de nos jours ; il est probable cependant que cette préparation n'est pas sans efficacité.
De 2 à 3 onces.	De 64 à 96 gramm.	En décoct., pour gargarisme.	
Quantité indéterminée.	»	En cataplasme.	(2) La *Scabieuse* des prés, *Scabiosa arvensis*, jouit des mêmes propriétés.
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	

Doses. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 3

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE. Poids anc.	Poids nouv.	MODE D'ADMINISTRATION.
Scammonée. *Scamonia.* Purgatif drastique (1).	Poudre.	De 6 à 18 grains.	De 3 à 9 décigr.	En pilules, en émulsion.
	Sirop.	De 1 à 4 gros.	De 4 à 16 gramm.	En potion.
	Teinture.	De 10 à 20 gouttes.	»	*Idem.*
Sceau de Salomon. *Convallaria polygonatum.* Mucilagineux.	Racine.	De 1 à 2 onces.	De 32 à 64 gramm.	En décoction.

à 7, 1/3; de 7 à 14, 1/2; de 14 à 20, 2/3; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINISTRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
»	»	»	(1) Il y a dans le commerce deux espèces de Scammonées; l'une appelée la scammonée d'*Alep* et l'autre de *Smyrne*. Celle d'Alep, d'une qualité supérieure, est grise, légère, brillante et transparente dans la cassure; celle de Smyrne est au contraire compacte, pesante, plus foncée en couleur et difficile à pulvériser. Ce qu'on appelle *diagrède* en pharmacie, est un mélange de scammonée avec quelque correctif pour en diminuer l'activité trop grande. Ainsi, il y avait des *diagrèdes* de *coing*, de *réglisse*, de *soufre*, suivant que l'une ou l'autre de ces substances avait été employée pour mitiger l'action de la scammonée. La scammomé entre dans une grande quantité d'anciennes *préparations officinales*, comme, la poudre de *Tribus*, les pilules cochées, celles de Bontius, les électuaires Hamec, Mésentérique, et l'extrait panchymagogue de Grollius.
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	

Doses. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 3

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE. Poids anc.	Poids nouv.	MODE D'ADMINISTRATION.
SCILLE. *Scilla maritima.* Diurétique, âcre, amère. VÉNÉNEUX (1).	Poudre.	De 1 à 3 grains.	De 5 à 15 centigr.	En pilules, ou délayée.
	Extrait.	De 1 à 3 grains.	De 5 à 15 centigr.	En pilules.
	Miel scillitique.	De 1 à 2 gros.	De 4 à 8 gramm.	En potion.
	Oxymel scillitique.	De 2 à 8 gros.	De 8 à 32 gramm.	*Idem.*
	Teinture alcoolique.	De 1 à 2 gros.	De 4 à 8 gramm.	*Idem.*
	Teinture éthérée.	De 10 20 gouttes.	»	*Idem.*
	Vin scillitique.	De 4 gros à 1 once.	De 16 à 32 gramm.	*Idem.*
	Vinaigre scillitique.	»	»	»

à 7, 1/3; de 7 à 14, 1/2; de 14 à 20, 2/3; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINISTRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
»	»	»	Le *Convolvulus althoïdes* est le succédané le plus efficace de la scammonée. Les *antidotes* de cette plante sont les mêmes que pour les plantes âcres, telle que la gomme gutte.
»	»	»	
De 1 à 2 onces.	De 32 à 64 gramm.	En lavement.	(1) Suivant *Vogel*, c'est à un principe qu'il a appelé *Scillitine*, que la scille est redevable d'une grande partie de ses propriétés; c'est sans doute pour diminuer l'activité dangereuse de cette racine que les anciens la faisaient cuire dans de la pâte avant de la préparer.
»	»	»	
»	»	»	
De 1 à 2 gros.	De 4 à 8 gramm.	En frictions.	
»	»	»	Les compositions magistrales de la scille sont nombreuses; on prépare des poudres, des pilules, des mixtures scillitiques; on l'associe à de la gomme, à des aromates, pour modérer son activité. La scille entre dans la thériaque, l'emplâtre diachyllum, l'emplâtre de ciguë. Dans quelques provinces on remplace la scille avec l'oignon du *pancratium maritimum*, encore appelé petite scille.
De 1 à 2 gros.	De 4 à 8 gramm.	En frictions.	

Doses. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 33

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE. Poids anc.	Poids nouv.	MODE D'ADMINISTRATION.
SCOLOPENDRE. *Scolopendrium officinarum.* Excitant.	Feuilles.	De 4 gros à 1 once.	De 16 à 32 gramm.	En infusion.
SCORDIUM. *Teurium scordium.* Tonique, excitant (1).	Feuilles.	De 1 à 2 onces.	De 32 à 64 gramm.	En décoction.
	Extrait.	De 1 à 2 gros.	De 4 à 8 gramm.	En bols.
	Poudre.	De 1 à 2 gros.	De 4 à 8 gramm.	En bols ou opiat.
	Sirop.	De 1 à 2 onces.	De 32 à 64 gramm.	En potion.
	Suc.	De 2 à 3 onces.	De 64 à 96 gramm.	En nature.
SCORSONÈRE. *Scorzonera hispanica.* Mucilagineux, diurétique.	Racine.	De 1 à 2 onces.	De 32 à 64 gramm.	En décoction.
	Extrait.	De 1 à 2 gros.	De 4 à 8 gramm.	En bols.

à 7, 1/3 ; de 7 à 14, 1/2 ; de 14 à 20, 2/3 ; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINISTRATION.	*REMARQUES.*
Poids anc.	Poids nouv.		
»	»	»	
Quantité indéterminée.	»	En cataplasme.	
»	»	»	(1) Le *Scordium* est une de ces plantes nombreuses, jadis louées avec enthousiasme et aujourd'hui presque inusitées, quoiqu'il ne mérite pas cet abandon. C'est cette plante, qui a donné son nom au fameux électuaire *Diascordium*.
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
De 2 à 4 onces.	De 64 à 128 gram.	En décoct., pour lotions.	
»	»	»	

Doses. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes) ; de 1 à 3, 1/6 ; de 3

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE. Poids anc.	Poids nouv.	MODE D'ADMINISTRATION.
Scrophulaire (Grande). *Scrofularia nodosa.* Amer, stimulant.	Racine.	De 4 gros à 1 once.	De 16 à 32 gramm.	En décoction.
	Feuilles.	»	»	»
Seigle ergoté. *Secalæ cornutum.* Stimulant regardé comme agissant spécialement sur l'utérus (1).	Concassé.	De 30 à 50 grains.	De 15 à 25 décigr.	En infusion, décoct. dans 6 onc. d'eau.
	Poudre.	De 20 à 30 grains. En 2 ou 3 prises.	De 10 à 15 décigr.	En potion, en pilules.
Sel de Guindre (2).	»	»	»	»

à 7, 1/3 ; de 7 à 14, 1/2; de 14 à 20, 2/3 ; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR D'ADULTE.		MODE D'ADMINISTRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
»	»	»	(1) On doit cesser l'administration du seigle ergoté aussitôt qu'on a obtenu l'effet désiré. Ce médicament a été associé au girofle, à une huile essentielle, de menthe, de muscade; M. Goupil s'est servi de la formule suivante : Pr. seigle ergoté pulvérisé, un gros ; sirop simple, une once quatre gros; esprit de menthe, trois gouttes, mêlez dans un mortier, donnez par cuillerée toutes les dix minutes. M. Villeneuve, dans sa monographie sur le seigle ergoté, parle d'un *sirop*, d'une *teinture*, d'un *extrait* alcoolique dont il n'indique point les doses.
Quantité indéterminée.	»	En cataplasme.	
2 gros dans une chopine d'eau.	8 grammes dans 500 gr. d'eau.	En lavement.	
»	»	«	
»	»	»	(2) Ce sel qui est purgatif se donne par doses ; chacune contient : sulfate de soude effleuri à l'air, 6 gros ; nitrate de potasse, 12 grains ; émétique, 1/2 grain.

Doses. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 3

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE. Poids anc.	Poids nouv.	MODE D'ADMINISTRATION.
SEMENTINE SEMEN-CONTRA. *Artemisia Semen-contra.* Vermifuge. (1).	Semences.	De 1 à 3 gros.	De 4 à 12 gramm.	En infusion.
	Huile volatile.	De 5 à 8 gouttes.	»	Sur du sucre.
	Poudre.	De 18 grains à 1 gros.	De 1 à 4 gramm.	En opiat, bols.
	Teinture.	De 1 à 2 gros.	De 4 à 8 gramm.	En potion.
SÉNÉ. *Cassia senna.* Purgatif (2).	Feuilles.	De 2 à 4 gros.	De 8 à 16 gramm.	En infusion pour potion.
	Poudre.	De 18 à 36 grains.	De 1 à 2 gramm.	En bols.
	Extrait.	De 6 à 18 grains.	De 3 à 9 décigr.	En pilules.
	Teinture.	De 1 à 2 gros.	De 4 à 8 gramm.	En potion.
	Follicules.	De 3 à 6 gros.	De 12 à 24 gramm.	En infusion, pour potion.

à 7, 1/3 ; de 7 à 14, 1/2 ; de 14 à 20, 2/3 ; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINISTRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
De 2 à 6 gros.	De 8 à 24 gramm.	En décoction pour lavement.	
»	»		
»	»	»	(1) Le semen-contra, qu'on trouve dans le commerce, est quelquefois falsifié aveé l'*artemisia judaica* et avec les fleurs de l'*artemisia campestris*.
»	»	»	
De 4 à 6 gros.	De 16 à 24 gramm.	En infusion, décoction, pour lavement.	
»	»		
»	»	»	(2) MM. Prévost et *Huissem.* ainsi que MM. Fée et Guibourt, ont constaté la sophistication des feuilles de séné par celles du Redoul (*Coriaria mirtyfolia*) qui sont très-vénéneuses ; on a déjà observé plusieurs empoisonnemens causés par cette coupable falsification.
De 2 à 4 gros.	De 8 à 16 gramm.	En lavement.	
De 4 gros à 1 once.	De 16 à 32 gramm.	*Idem.*	

Doses. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 3

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE. Poids anc.	Poids nouv.	MODE D'ADMINISTRATION.
SERPENTAIRE DE VIRGINIE. *Aristolochia serpentaria.* Tonique, stimulant.	Racine.	De 2 à 4 gros.	De 8 à 16 gramm.	En infusion aqueuse ou vineuse.
	Extrait.	De 18 à 36 grains.	De 1 à 2 gramm.	En bols.
	Poudre.	De 1 à 2 gros.	De 4 à 8 gramm.	En bols, opiat.
SERPOLET. *Thymus serpillum.* Aromatique, stimulant	Sommités fleuries.	De 2 à 4 gros.	De 4 à 8 gramm.	En infusion.
	Huile essentielle.	De 5 à 8 gouttes.	. .	Sur du sucre, en émulsion.
	Poudre.	De 18 à 36 grains.	De 1 à 2 gramm.	En bols, opiat.
SIMAROUBA. *Quassia simaruba.* Amer, astringent (1).	Écorce.	De 1 à 4 gros.	De 4 à 16 gramm.	En décoction.
	Extrait.	De 36 grains à 1 gros.	De 2 à 4 gramm.	En bols.
	Poudre.	De 18 à 36 grains.	De 1 à 2 gramm.	En bols, opiat.
	Teinture.	De 1 à 2 gros.	De 4 à 8 gram.	En potion.

à 7, 1/3 ; de 7 à 14, 1/2 ; de 14 à 20, 2/3 ; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINISTRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
De 2 à 4 gros.	De 8 à 16 gramm.	d é coct. . pour gargarisme.	
»	»	»	
»	»	»	
De 4 gros à 1 once.	De 16 à 32 gramm.	Pour lotions, fomentations, bains.	(1) On a beaucoup de peine à pulvériser cette écorce, à cause de la texture molle et pliante de ses parties ; mais on en vient à bout en la faisant dessécher ; c'est sans doute pour ce motif qu'on emploie la décoction de simarouba de préférrence à la poudre. Ce médicament ne produit point à l'instant de son administration des phénomènes de réaction bien sensibles ; son action n'est que secondaire et éloignée.
Quantité indéterminée.	»	Contre la carie des dents.	
»	»	»	
De 2 à 6 gros.	De 8 à 24 gramm.	En décoction, pour lavement.	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	

DOSES. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 3

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE. Poids anc.	Poids nouv.	MODE D'ADMINISTRATION.
SIROP ANTI-SCORBUTIQUE. *Sirupus anti-scorbuticus.*	En substance.	De 4 gros à 2 onces.	De 16 à 64 gramm.	Pur ou en tisane.
SIROP D'ARMOISE COMPOSÉ. *Sirupus de artemisiâ compositus.* Stimulant.	*Idem.*	De 4 gros à 1 once.	De 16 à 32 gramm.	En potion, tisane.
SIROP DE BELET. *Sirupus dictus de Belet.* Anti-syphilitique (1).	*Idem.*	De 2 à 6 gros.	De 8 à 24 gramm.	Pur, ou mêlé au sirop anti-scorbutique.
SIROP DE CHICORÉE COMPOSÉ. *Sirupus de cichorio compositus.* Purgatif.	*Idem.*	De 4 gros à 2 onces.	De 16 à 64 gramm.	En potion.

à 7, 1/3; de 7 à 14, 1/2; de 14 à 20, 2/3 ; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINISTRATION.	*REMARQUES.*
Poids anc.	Poids nouv.		
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	(1) Il y a plusieurs procédés pour composer ce sirop qui est d'ailleurs un médicament infidèle : préparé depuis peu de temps il agit avec énergie. Préparé depuis longtemps, il n'agit pas de la même manière. On a des exemples d'accidens graves résultant de l'emploi de cette préparation.
»	»	»	

Doses. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 3

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE. Poids anc.	Poids nouv.	MODE D'ADMINISTRATION.
SIROP DES CINQ RACINES. *Sirupus è quinque radicibus.* Diurétique.	En substance.	De 4 gros à 2 onces.	De 16 à 64 gramm.	En tisane, potion.
SIROP DE CUISINIER. *Sirupus sarsaparillâ et sennâ compositus.* Sudorifique (1).	*Idem.*	De 1 à 3 onces.	De 32 à 96 gramm.	En tisane.
SIROP D'ÉRYSIMUM COMPOSÉ. *Sirupus de erysimo compositus.* Expectorant.	*Idem.*	De 4 gros à 2 onces.	De 16 à 64 gramm.	*Idem.*
SIROP DE MOU DE VEAU. *Sirupus è pulmonibus vitulinis.* Adoucissant, pectoral.	*Idem.*	De 1 à 3 onces.	De 32 à 96 gram.	*Idem.*

à 7, 1/3; de 7 à 14, 1/2; de 14 à 20, 2/3; de 20 à 60, le dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINISTRATION.	*REMARQUES.*
Poids anc.	Poids nouv.		
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	(1) Le sirop de Cuisinier est souvent additionné de perchlorure de mercure; mais lorsque cette addition est faite depuis un certain temps, le perchlorure passe à l'état de protochlorure qui se dépose au fond du vase contenant le liquide : ce sirop n'agit plus alors de la même manière.
»	»	»	

Doses. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 33

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE. Poids anc.	Poids nouv.	MODE D'ADMINISTRATION.
Sirop de pommes composé. *Sirupus de pommis compositus.* Purgatif.	En substance.	De 1 à 3 onces.	De 32 à 96 gramm.	En tisane.
Sirop de stoechas composé. *Sirupus de stœchade compositus.* Stimulant.	*Idem.*	De 4 gros à 2 onces.	De 16 à 64 gramm.	*Idem.*
Soldanelle. *Convolvulus soldanella.* Purgatif (1λ	Feuilles.	De 3 à 4 gros.	De 12 à 16 gramm.	En décoction.
	Poudre de la racine.	De 18 grains à 1 gros.	De 1 à 4 gramm.	En bols.
	Résine.	De 18 à 24 grains.	De 9 à 12 décigr.	En pilules.
	Teinture.	De 36 grains à 1 gros.	De 2 à 4 gramm.	En potion.

à 7, 1/3; de 7 à 14, 1/2; de 14 à 20, 2/3; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINISTRATION.	*REMARQUES.*
Poids anc.	Poids nouv.		
»	»	»	
»	«	»	
»	«	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	(1) La Soldanelle ou chou marin, purgative selon M. Loiseleur Deslongchamps, a été analysée par M. Planche, qui y a trouvé 24 pour 100 d'une résine verte purgative, de l'extrait gommeux, de l'amidon, du ligneux, des sels.

Doses. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes) ; de 1 à 3, 1/6 ; de 3

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE. Poids anc.	Poids nouv.	MODE D'ADMINISTRATION.
Son. *Furfur.* Émollient, adoucissant.	En nature.	De 4 gros à 1 once.	De 16 à 32 gramm.	En décoction.
Solution de Fowler. *Solutio arsenicalis (Fowler).* Stimulant. Vénéneux (1).	En substance.	De 10 à 20 gouttes.	»	En potion.
Solution de Pearson. *Solutio arsenicalis (Pearson)* Stimulant Vénéneux (2).	*Idem.*	De 24 à 36 grains.	De 12 à 18 décigr.	*Idem.*
Souchet. *Cyperus longus.* Stimulant.	Racine.	De 4 gros à 1 once.	De 16 à 32 gramm.	En infusion aqueuse ou vineuse.
Soufre sublimé. *Sulfur.* Diaphorétique, expectorant, anti-psorique (3).	Poudre.	De 12 à 36 grains.	De 6 à 18 décigr.	En opiat.
	Pastilles.	De 4 gros à 1 once.	De 16 à 32 gramm.	En nature.

7, 1/3 ; de 7 à 14, 1/2 ; de 14 à 20, 2/3 ; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINISTRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
De 1 à 3 onces.	De 32 à 96 gramm	En décoction, pour lavement.	(1) Cette solution contient quatre grains de protoxide d'arsenic par once, par conséquent, les doses de dix et de vingt gouttes contiennent, l'une un 14e de grain et l'autre un 7e. Cette préparation, comme la suivante, ne doit être donnée qu'avec les plus grandes précautions.
»	»	»	
»	»	»	(2) La dose de 24 grains, que nous indiquons ici, contient à peu près un 24e de grain d'arséniate de soude ; cependant cette dose si minime cause souvent des coliques qui forcent à suspendre le médicament, ainsi que l'un de nous (M. Bricheteau) l'a observé.
»	»	»	
»	»	»	(3) Le soufre, administré à la dose d'un gros et plus, agit comme purgatif. Ce médicament est donné, 1° tel qu'on l'obtient par la sublimation (il retient alors un peu d'acide, et, selon les auteurs, il agit mieux dans les pommades) ; 2° lavé ; c'est à cet état qu'on le donne à l'intérieur.
Quantité indéterminée.	»	En pommade.	
»	»	«	

DOSES. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 33

MOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE. Poids anc.	Poids nouv.	MODE D'ADMINISTRATION.
SQUINE. *Smilax china.* Sudorifique.	Racine.	De 2 à 3 onces.	De 64 à 96 gramm.	En décoction.
	Extrait.	De 1 à 2 gros.	De 4 à 8 gramm.	En bols.
STAPHYSAIGRE *Delphinium staphysagria.* Éméto-cathartique. VÉNÉNEUX (1).	Semences en poudre.	»	»	»
STOECHAS. *Gnaphalium stœchas.* Stimulant.	Fleurs.	De 2 à 4 gros.	De 8 à 16 gramm.	En infusion.
	Poudre.	De 18 à 36 grains.	De 1 à 2 gramm.	En pilules.
	Sirop.	De 4 gros à 2 onces.	De 16 à 64 gramm.	En potion, tisane.

à 7, 1/3 ; de 7 à 14, 1/2 ; de 14 à 20, 2/3 ; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINISTRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
»	»	»	
»	»	»	
Quantité indéterminée.	»	En poudre et en pommade, pour tuer les insectes.	
»	»	»	(1) La semence de staphysaigre est une substance dangereuse qu'on ne doit pas administrer à l'intérieur, quoiqu'elle ait été quelquefois prescrite. Ce n'est même pas sans inconvénient qu'on l'emploie comme masticatoire pour produire un effet dérivatif. Cette semence est aussi appelée Herbe-aux-Poux.
»	»	»	
»	»	»	

ses. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 3

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE. Poids anc.	Poids nouv.	MODE D'ADMINISTRATION.
STRAMOINE. *Datura stramonium.* Narcotique. VÉNÉNEUX (1).	Poudre des feuilles et tiges.	De 2 à 6 grains.	De 10 à 30 centigr.	En pilules.
	Extrait des feuilles et tiges.	De 1 à 4 grains.	De 5 à 20 centigr.	*Idem.*
	Extrait des semences.	De 1 à 2 grains.	De 5 à 10 centigr.	*Idem.*
	Teinture des semences.	De 6 à 10 gouttes.	»	Dans les potions.
SUBLIMÉ CORROSIF. *Deuto-chloruretum hydrargyri.* Anti-syphilitique. VÉNÉNEUX.	Poudre.	1/12 à 1/8 de grain.	»	En pilules.
	Liqueur (ou liqueur Vanswieten) (2).	De 1 à 2 cuillerées à bouche.	«	Dans de l'eau de gomme, etc.

à 7, 1/3; de 7 à 14, 1/2; de 14 à 20, 2/3; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINISTRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
»	»	»	
»	»	»	(1) Stork avait singulièrement exagéré l'activité du *Stramonium;* des expériences postérieures aux siennes, notamment celles de M. *Barbier*, ont donné une idée plus exacte du mode d'action de ce médicament.
»	»	»	
Quantité indéterminée.	»	En frictions.	*Antidotes.* Vomitifs, boissons acidulées, excitans, derivatifs, etc.
Idem.	»	En pommade, lotions, bains, pédiluves.	(2) La liqueur de Van-Swieten peut se préparer d'après la formule suivante, qui est celle de M. Lagneau :
Idem.	»	En lotion.	Sublimé corrosif. 16 grains Alcool de vin. . . 1 gros. Eau distillée. . . 4 livres. Cette formule diffère de celle du Codex, qui nous a paru contenir une trop grande quantité de sublimé. *Antidotes.* Blancs d'œufs délayés, lait, gluten délayé, eau de guimauve, saignée, etc.

Doses. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 3

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE. Poids anc.	Poids nouv.	MODE D'ADMINISTRATION.
Succin. *Electrum.* Stimulant.	Poudre.	»	»	»
	Huile essentielle.	De 4 à 12 gouttes.	»	En potion.
	Sirop (dit de karabé).	De 2 gros à 1 once.	De 8 à 32 gramm.	*Idem.*
	Teinture.	De 18 à 36 grains.	De 1 à 2 gramm.	*Idem.*
Sulfate d'alumine et de potasse, alun. *Sulfas aluminæ et potassæ.* Astringent, stiptique (1).	Poudre.	De 6 à 12 grains.	De 3 à 6 décigr.	En pilules, tisane, potion.
	Calciné (alun).	»	»	»
Sulfate de cinchonine. *Voy.* Cinchonine.	»	»	»	»

à 7, 1/3; de 7 à 14, 1/2; de 14 à 20, 2/3; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINISTRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
De 4 gros à 1 once.	De 16 à 32 gramm.	En fumigation.	
Quantité indéterminée.	»	Mêlée à de l'huile pour frictions.	
»	»	»	
»	»	»	
De 18 grains à 1 gros.	De 1 à 4 gramm.	En gargarisme, lotions, injections, bain local, pommade, etc.	
Quantité indéterminée.	»	Comme cathérétique.	(1) Le sulfate d'alumine simple est employé depuis quelque temps dans les mêmes cas et aux mêmes doses que le sulfate d'alumine et de potasse (l'alun) : ce dernier sel est quelquefois à base d'alumine et d'ammoniaque.
»	»		

DOSES. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 3

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE. Poids anc.	Poids nouv.	MODE D'ADMINISTRATION.
SULFATE DE CUIVRE. *Sulfas cupri.* Anti-spasmodique, VENÉNEUX (1).	Poudre.	D'un quart à un 1/2 grain.	»	En pilules, ou dans une boisson mucilagineuse.
SULFATE DE FER. *Sulfas ferri.* Tonique, excitant, fébrifuge (2).	Poudre.	De 6 à 16 grains.	De 3 à 8 décigr.	Dans les potions.
SULFATE DE MAGNÉSIE. *Sulfas magnesiæ.* Purgatif.	En substance.	De 4 gros à 2 onces.	De 16 à 46 gramm.	En solution aqueuse.
SULFATE DE POTASSE. *Sulfas potassæ.* Purgatif.	*Idem.*	De 4 gros à 1 once.	De 16 à 32 gramm.	*Idem.*

à 7, 1/3 ; de 7 à 14, 1/2 ; de 14 à 20, 2/3 ; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINISTRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
De 18 à 36 grains.	De 1 à 2 gr. dans 1 livre d'eau.	Pour injections, lotions.	
De 12 à 18 grains.	De 6 à 9 décigr.	Dissous dans les collyres.	(1) La limaille de fer peut être donnée comme antidote du sulfate de cuivre. Le sulfate de cuivre ammoniacal se donne aux mêmes doses que le sulfate simple.
»	»	»	(2) On administre ce sel comme fébrifuge, à la dose d'un gros, divisé en 4 doses, que l'on prend dans la journée.
»	»	»	

Doses. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 33

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE. Poids anc.	Poids nouv.	MODE D'ADMINISTRATION.
SULFATE DE QUININE. *Sulfas quininæ.* Fébrifuge, tonique.	Alcool.	Est employé pour faire le vin de quinine (1).	»	»
	Sirop.	De 4 gros à 1 once.	De 16 à 32 gramm.	Plusieurs fois par jour.
	En substance.	De 6 à 8 grains.	De 3 à 4 décigr.	En pilules, ou dissous.
	Vin.	De 2 à 4 onces.	De 64 à 128 gram.	En substance.
SULFATE DE SOUDE. *Sulfas sodæ.* Purgatif (2).	En substance.	De 4 gros à 2 onces.	De 16 à 64 gramm.	En solution aqueuse.
SULFATE DE ZINC. *Sulfas zinci.* Astringent, émétique. VÉNÉNEUX.	*Idem.*	De 1 à 4 grains.	De 5 à 20 centigr.	En pilules, ou potion.
SULFURE DE CHAUX. *Sulfuretum calcis.* Anti-herpétique.	*Idem.*	»	»	»

à 7, 1/3 ; de 7 à 14, 1/2 ; de 14 à 20, 2/3 ; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINISTRATION.	*REMARQUES.*
Poids anc.	Poids nouv.		
»	»	»	
»	»	»	(1) L'alcool de quinine se prépare avec sulfate de quinine, 6 grains; alcool à 34°, 1 once.
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
De 18 grains à 1 gros.	De 1 à 4 gramm.	En injection, collyres, pommade.	(2) Le sulfate de soude est aussi connu sous les noms de *sel de glauber*, *sel d'epsum de Lorraine*. On ne doit pas confondre le sel *d'epsum de Lorraine* avec le sulfate de magnésie, connu sous le nom de sel d'epsum d'Angleterre.
De 2 à 4 gros.	De 8 à 16 gramm.	Délayé dans l'huile, pour frictions.	

Doses. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 3

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE. Poids anc.	Poids nouv.	MODE D'ADMINISTRATION.
SULFURE DE POTASSE. *Sulfuretum potassæ.* Stimulant anti-herpétique. VÉNÉNEUX.	En substance.	De 2 à 6 grains.	De 1 à 3 décigr.	Dans une pinte d'eau (1).
	Sirop de sulfure de potasse.	De 4 gros à 1 once.	De 16 à 32 gramm.	En potion.
SULFURE DE SOUDE.	S'emploie aux mêmes doses et dans les mêmes cas que le précédent.	»	»	»
SUMAC VÉNÉNEUX. *Rhus toxicodendron et radicans.* Stimulant. VÉNÉNEUX.	Feuilles.	De 1 à 2 gros.	De 4 à 8 gramm.	En décoction.
	Extrait des feuilles obtenu par décoction.	De 14 à 20 grains.	De 7 à 10 décigr.	En pilules.

à 7, 1/3; de 7 à 14, 1/2; de 14 à 20, 2/3; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINISTRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
De 2 à 4 onces.	De 64 à 128 gram	Pour un bain (2).	(1) MM. Chevallier et Rayer ont indiqué l'emploi de cette solution pour combattre les accidens dont sont affectés les ouvriers qui travaillent le plomb, ses oxides et ses sels.
»	»	»	
»	»	»	(2) On emploie principalement contre la gale la pommade de Jadelot, préparé avec sulfure de potasse, 6 onces; savon blanc du commerce, 2 livres; huile de pavot, 4 livres, et huile volatile de thym, 2 gros. Le sulfure de potasse dissous dans l'eau, incorporé dans des graisses, sert aussi à faire des solutions pour lotions, des pommades, etc.
»	»	»	
»	»	»	

Doses. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 3

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE. Poids anc.	Poids nouv.	MODE D'ADMINISTRATION.
Sureau. *Sambucus nigra.* Diaphorétique.	Deuxième écorce.	De 2 gros à 1 once.	De 8 à 32 gramm.	En décoction.
	Fleurs.	De 1 à 2 gros.	De 4 à 8 gramm.	En infusion.
	Eau distillée.	»	»	»
	Poudre de fleurs.	De 1 à 2 gros.	De 4 à 8 gramm.	En opiat, bols.
	Rob.	De 4 gros à 2 onces.	De 16 à 64 gramm.	En nature.
	Suc de l'écorce.	De 1 à 4 gros.	De 4 à 16 gramm.	*Idem.*
	Vinaigre.	»	»	»
Tabac. *Nicotiana tabacum.* Émétique, drastique. Vénéneux (1).	Feuilles.	De 12 à 24 grains.	De 6 à 12 décigr.	En décoction.
	Poudre.	De 1 à 2 grains.	De 5 à 10 centigr.	En pilules.

à 7, 1/3 ; de 7 à 14, 1/2 ; de 14 à 20, 2/3 ; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINISTRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
»	»	»	
De 4 gros à 1 once.	De 16 à 32 gramm.	En décoct., pour lotions, fomentations et bains.	
De 2 à 4 onces.	De 64 à 128 gram.	En collyre.	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	(1) Le tabac est un médicament extrêmement dangereux, qu'on ne doit administrer qu'avec la plus grande circonspection : on a dernièrement proposé de l'employer en fomentation sur le ventre ; mode d'application qui permet de doser, en quelque sorte, son degré d'action.
De 4 gros à 1 once.	De 16 à 32 gramm.	En lotion.	
De 18 grains à 1 gros.	De 1 à 4 gramm.	En décoct., pour lavement.	
Quantité indéterminée.	»	En pomm., en onguent, ou pour détruire les poux.	*Antidotes.* Vomitifs, purgatifs, s'il s'est écoulé quelque temps depuis l'ingestion du poison, s'il y a narcotisme, saignée et boissons acidulées.

Doses. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 3

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE. Poids anc.	Poids nouv.	MODE D'ADMINISTRATION.
TABLETTES ANTIMONIALES DE KUNKEL (1).	En substance.	De 4 à 8.	»	Dans le courant de la journée.
TABLETTES DE CITRO. (Tablettes de scammonée et de séné composées.) Purgatif.	*Idem.*	De 2 à 6 gros.	De 8 à 24 gramm.	»
TABLETTES DE SOUFRE COMPOSÉES. *Tabellæ de sulfure compositæ.* Expectorant.	*Idem.*	De 3 à 4 par jour.	»	»
TABLETTES D'ÉMÉTINE. *Tabellæ de emetina.* Émétique (2)	*Idem.*	De 8 à 12.	»	»

à 7, 1/3; de 7 à 14, 1/2; de 14 à 20, 2/3; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINISTRATION.	*REMARQUES.*
Poids anc.	Poids nouv.		
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	(1) Nous n'avons parlé que des tablettes composées indiquées dans le codex. *Voy.* pour les autres tablettes les substances qui en font la base. (2) Ces tablettes remplacent très-bien les pastilles d'ipécacuanha.
»	»	»	

Doses. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes) ; de 1 à 3, 1/6; de 3

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MODE D'ADMINISTRATION.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE. Poids anc	Poids nouv.	MODE D'ADMINISTRATION.
TAMARIN. *Tamarindus indica.* Laxatif (1).	Pulpe.	De 4 gros à 2 onces.	De 16 à 64 gramm.	En décoction.
TAMARISC. *Tamarix gallica.* Astringent.	Écorce.	De 4 gros à 1 once.	De 16 à 32 gramm.	*Idem.*
	Extrait.	De 1 à 2 gros.	De 4 à 8 gramm.	En pilules.
	Poudre.	De 18 grains à 1 gros.	De 1 à 4 gramm.	*Idem.*
TANAISIE. *Tanacetum vulgare.* Amer, anthelmintique.	Sommités.	De 1 à 2 poignées.	»	En infusion aqueuse ou vineuse.
	Semences.	De 2 à 4 gros.	De 8 à 16 gramm.	En infusion.
	Poudre des sommités.	De 36 grains à 2 gros.	De 1 à 8 gramm.	En pilules.
	Poudre des semences.	De 12 à 24 grains.	De 6 à 12 décigr.	*Idem.*
	Huile volatile.	De 2 à 8 gouttes.	»	Sur du sucre ou en émuls.

7, 1/3 ; de 7 à 14, 1/2 ; de 14 à 20, 2/3 ; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINISTRATION.	REMARQUES.
oids anc.	Poids nouv.		
»	»	»	
De 6 gros à 2 onces.	De 24 à 64 gramm.	En décoction, pour lotions, fomentations.	(1) La pulpe de tamarin qu'on trouve dans le commerce contient quelquefois du cuivre.
»	»		
»	»	»	
»	»	»	
»	»	«	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	

Doses. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 3

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE. Poids anc.	Poids nouv.	MODE D'ADMINISTRATION.
TANNIN. Astringent (1).	En substance.	De 8 à 24 grains.	De 4 à 12 decigr.	En pilules.
TARTRATE ACIDULE DE POTASSE. *Voy.* Crême de tartre.	»	»	»	»
TARTRATE NEUTRE DE POTASSE. (Sel végétal.) *Tartras potassæ.* Purgatif.	En substance.	De 4 gros à 2 onces.	De 16 à 64 gramm.	En solution aqueuse ou dans du bouillon.
TARTRATE DE POTASSE ET DE FER. (Tartre martial chalibé.) *Tartras potassæ et ferri.* Tonique, astringent (2).	*Idem.*	De 18 grains à 1 gros.	De 1 à 4 gramm.	En pilules.

à 7, 1/3; de 7 à 14, 1/2; de 14 à 20, 2/3; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINISTRATION.	*REMARQUES.*
Poids anc.	Poids nouv.		
»	»	»	
»	»	»	(1) Le tannin a été récemment employé avec succès, par le docteur Porta, contre la métrorrhagie.
»	»	»	
En quantité indéterminée, et dissous dans l'eau.	»	En lotions.	(2) Une plus ancienne préparation dans laquelle entrent le tartrate de potasse et l'oxide de fer, et dont l'usage n'est pas encore abandonné, est connue sous les noms de *boules de Mars* et de *boules de Nancy*; la solution qu'on prépare avec ce médicament a reçu le nom d'*eau de boule*.

Doses. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 3

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS. médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE. Poids anc.	Poids nouv.	MODE D'ADMINISTRATION.
TARTRATE DE POTASSE ET DE FER LIQUIDE. (Teinture de mars tartarisée.) *Tartras potassæ et ferri liquidus.* Tonique, astringent.	En substance.	De 20 à 50 gouttes.	»	En potion.
TARTRATE DE POTASSE ET DE SOUDE. *Tartras potassæ et sodæ.* Laxatif.	*Idem.*	De 4 gros à 2 onces.	De 16 à 64 gramm.	En solution dans un liquide approprié.
TARTRE STIBIÉ. *Voy.* Émétique.	»	»	»	»
TEINTURES (1).				
TEINTURE DE BESTUCHEFF OU DE KLAPROTH. Anti-spasmodique.	En substance.	De 18 à 36 gouttes.	»	Dans un véhicule aqueux.

7, 1/3; de 7 à 14, 1/2; de 14 à 20, 2/3; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINISTRATION.	*REMARQUES.*
Poids anc.	Poids nouv.		
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	(1) Nous avons parlé des teintures à chacune des substances qui servent à leur préparation. La suivante fait exception.

Doses. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 3

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE. Poids anc.	Poids nouv.	MODE D'ADMINISTRATION.
TÉRÉBENTHINE. *Terebenthina.* Astringent, stimulant (1).	En substance.	De 18 grains à 2 gros.	De 1 à 8 gramm.	En pilules ou émulsion.
	Cuite.	De 18 grains à 2 gros.	De 1 à 8 gramm.	En pilules.
	Huile essentielle.	De 6 à 12 gouttes.	»	Sur du sucre ou en émulsion.
TERRE DU JAPON. *Voy.* Cachou.	»	»	»	»
TERRE FOLIÉE DE TARTRE. *Voy.* Acétate de potasse.	»	»	»	»
THÉ. *Thea boea.* Tonique, aromatique.	Feuilles.	De 1 à 2 gros.	De 4 à 8 gramm.	En infusion
THÉRIAQUE. *Theriaca.* Excitant.	En substance.	De 18 grains à 2 gros.	De 1 à 8 gramm.	En potion, opiat.

à 7, 1/3; de 7 à 14, 1/2; de 14 à 20, 2/3; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE, DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINISTRATION.	*REMARQUES.*
Poids anc.	Poids nouv.		
uantité indéterminée.	»	Dans les pommades, onguens, emplâtres.	
»	»		(1) L'essence de térébenthine a été administrée à haute dose, dans plusieurs maladies et particulièrement contre le tœnia; les médecins anglais l'ont donnée à la dose de plusieurs onces. On a administré ce médicament avec succès contre les névralgies.
uantité indéterminée.	»	Dans des linimens.	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
uantité indéterminée	»	En épithême.	

Doses. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE. Poids anc.	Poids nouv.	MODE D'ADMINISTRATION.
THYM. *Thymus vulgaris.* Aromatique, excitant.	Sommités.	De 1 à 4 gros.	De 4 à 16 gramm.	En infusion
	Eau distillée.	De 2 à 3 onces.	De 64 à 96 gramm.	En potion.
	Huile volatile.	De 6 à 10 gouttes.	»	Sur du sucre, en émulsion.
	Poudre.	De 1 à 2 gros.	De 4 à 8 gramm.	En opiat, bols.
THYMÉLÉE. *Voy.* Garou.	»	»	»	»
TILLEUL. *Tilia europæa.* Anti-spasmodique.	Fleurs mondées.	De 2 à 4 gros.	De 8 à 16 gramm.	En infusion.
	Eau distillée.	De 2 à 4 onces.	De 64 à 128 gram.	En potion.
TORMENTILLE. *Tormentilla erecta.* Astringent (1).	Racine.	De 2 gros à 1 once.	De 8 à 32 gramm.	En décoction.
	Extrait.	De 18 à 36 grains.	De 1 à 2 gramm.	En pilules.
	Poudre.	De 36 grains à 1 gros.	De 2 à 4 gramm.	En bols.

à 7, 1/3 ; de 7 à 14, 1/2 ; de 14 à 20, 2/3 ; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINISTRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
De 1 à 2 onces.	De 32 à 64 gramm.	En décoction, pour lotions, fomentations, injections, bain.	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
De 1 à 2 onces.	De 32 à 64 gramm.	En décoction, pour lotions, fomentations, gargarisme.	
»	»	»	(1) La tormentille pourrait dans presque tous les cas remplacer la noix de galles, qui nous vient de l'étranger.
»	»	»	

Doses. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 3

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE. Poids anc.	Poids nouv.	MODE D'ADMINISTRATION.
TOXICODENDRON. *Voy.* Sumac.	»	»	»	»
TRÈFLE D'EAU. *Menyanthes trifoliata.* Amer, fébrifuge (1).	Feuilles.	De 4 gros à 1 once.	De 16 à 32 gramm.	En décoction.
	Extrait.	De 18 grains à 1 gros.	De 1 à 4 gramm.	En bols.
	Poudre.	De 18 grains à 1 gros.	De 1 à 4 gramm.	En opiat.
	Suc.	De 1 à 3 onces.	De 32 à 96 gramm.	En nature.
TURBITH VÉGÉTAL. *Convolvulus turpethum.* Purgatif.	Racine.	De 1 à 4 gros.	De 4 à 16 gramm.	En décoction.
	Poudre.	De 18 grains à 1 gros.	De 1 à 4 gramm.	En bols.
TUSSILAGE. *Tussilago farfara.* Adoucissant.	Fleurs.	De 1 à 4 gros.	De 4 à 16 gramm.	En infusion.
	Sirop.	De 1 à 3 onces.	De 32 à 96 gramm.	En tisane, potion.
TUTHIE. *Voy.* Oxide de zinc.	»	»	»	»

à 7, 1/3; de 7 à 14, 1/2; de 14 à 20, 2/3; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINISTRATION.	*REMARQUES.*
Poids anc.	Poids nouv.		
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	(1) Des recherches sur le principe amer de cette plante ne seraient pas sans intérêt ; en effet, dans quelques cas, la poudre de trèfle d'eau a été employée avec succès comme fébrifuge.
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	

Doses. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes) ; de 1 à 3, 1/6 ; de 3

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE. Poids anc.	Poids nouv.	MODE D'ADMINISTRATION.
Ura ursi. *Voy.* Busserole.	»	»	»	»
Urée. *Urea.* Diurétique (1).	En substance.	De 12 grains à 36 gramm.	De 6 à 18 décigr.	En potion, pilules.
Valériane. *Valeriana officinalis.* Anti-spasmodique (2).	Racine.	De 2 à 4 gros.	De 8 à 16 gramm.	En infusion.
	Poudre.	De 18 grains à 1 gros.	De 1 à 4 gramm.	En opiat.
	Extrait.	De 18 grains à 1 gros.	De 1 à 4 gramm.	*Idem.*
	Huile volatile.	De 5 à 10 gouttes.	»	Sur du sucre.
	Teinture.	De 36 grains à 1 gros.	De 2 à 4 gramm.	En potion.
Vanille. *Epidendrum vanilla.* Excitant (3).	Silique.	De 36 grains à 2 gros.	De 2 à 8 gramm.	En infusion.
	Poudre.	De 18 à 36 grains.	De 1 à 2 gramm.	En pilules.

à 7, 1/3 ; de 7 à 14, 1/2 ; de 14 à 20, 2/3 ; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINISTRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
»	»	»	(1) On a employé depuis peu de temps avec et quelque succès l'urée, pour exciter la sécrétion des urines, particulièrement dans les hydropisies. L'un de nous (M. Richeteau) a observé des effets fort remarquables de ce médicament chez une femme hydropique, dont il paraît avoir déterminé la guérison.
»	»	»	
De 4 gros. à 1 once.	De 16 à 32 gramm.	En décoction pour lavement.	
»	»		(2) Ruiz et Pavon ont retrouvé au Pérou cette plante de nos montagnes.
De 2 à 4 gros.	De 8 16 gramm.	Délayé dans l'eau, pour lavement.	
»	»	»	(3) L'un de nous a rencontré dans la racine de canne une substance aromatique qui a l'odeur de la vanille. M. Vauquelin avait déjà reconnu un principe odorant analogue à celui de la vanille, dans l'*avena sativa*.
De 1 à 3 gros.	De 4 à 12 gramm.	Dans un lavement.	
»	»	»	
»	»	»	

Doses. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 3

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE. Poids anc.	Poids nouv.	MODE D'ADMINISTRATION.
VÉRONIQUE. *Veronica becabunga.* Anti-scorbutique.	Suc de l'herbe.	De 2 à 4 onces.	De 64 à 128 gram.	En substance.
VÉRONIQUE OFFICINALE. *Veronica officinalis.* Amer, astringent.	Feuilles.	De 4 à 6 gros.	De 16 à 24 gramm.	En infusion.
	Extrait.	De 18 grains à 1 gros.	De 1 à 4 gramm.	En pilules.
	Poudre.	De 18 grains à 1 gros.	De 1 à 4 gramm.	En opiat.
	Suc.	De 2 à 4 onces.	De 64 à 128 gram.	En nature.
VERVEINE. *Verbena officinalis.* Faible astringent (1).	Sommités.	De 4 à 6 gros.	De 16 à 24 gram.	En infusion.
VIGNE. *Vitis vinifera.* Anti-spasmodique.	Feuilles.	De 4 gros à 1 once.	De 16 à 32 gramm.	En décoction.

7, 1/3 ; de 7 à 14, 1/2 ; de 14 à 20, 2/3 ; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINISTRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv		
»	»	»	
De 2 à 4 onces.	De 64 à 128 gram.	En décoction pour fomentation.	
»	»		
»	»	»	
»	»	»	
uantité indéterminée.	»	En cataplasme.	
«	»	»	(1) On a proposé l'infusion des feuilles du *verbena triphylla* (verveine à odeur de citron), pour remplacer le thé.

DOSES. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 3

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE. Poids anc.	Poids nouv.	MODE D'ADMINISTRATION.
VINS (1).				
VIN ANTI-SCORBUTIQUE. *Vinum anti-scorbuticum.*	En substance.	De 2 à 4 onces.	De 64 à 128 gram.	En nature.
VIN AROMATIQUE. *Vinum aromaticum.* Tonique.	*Idem.*	»	»	»
VIN DIURÉTIQUE AMER. *Vinum diureticum amarum.*	*Idem.*	De 1 à 3 onces.	De 32 à 96 gramm.	*Idem.*
VIN DE QUINQUINA COMPOSÉ. *Vinum de kina kiná compositum.* Tonique.	*Idem.*	De 1 à 3 onces.	De 32 à 96 gramm.	*Idem.*

7, 1/3; de 7 à 14, 1/2; de 14 à 20, 2/3; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINISTRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
»	»	»	(1) Parmentier a conseillé de préparer les vins en se servant des teintures alcooliques; mais ce procédé a l'inconvénient de fournir un vin qui contient, outre l'alcool qui lui est propre, l'alcool qui a servi à préparer la teinture.
Quantité indéterminée.	»	En injection, lotion, fomentation.	
»	»	»	
»	»	»	

Doses. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 3

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE. Poids anc.	Poids nouv.	MODE D'ADMINISTRATION.
VIN MARTIAL. (Vin chalibé). *Vinum chalibeatum.* Tonique.	En substance.	De 2 à 4 onces.	De 64 à 128 gram.	En nature.
VIN DE SÉGUIN. *Vinum dictum de Seguin.* Tonique (1).	*Idem.*	De 1 à 3 onces.	De 32 à 96 gramm.	*Idem.*
VINAIGRE. *Acetum.* Tonique, astringent.	*Idem.*	De 4 gros à 1 once.	De 16 à 32 gramm.	En limonade.
	Sirop.	De 2 à 4 onces.	De 64 à 128 gram.	En tisane, potion.
VINAIGRE RADICAL. *Acidum aceticum.* Stimulant.	En substance.	»	»	»
	Sirop.	*Idem.*	*Idem.*	*Idem.*
VIOLETTE. *Viola odorata.* Mucilagineux. (2).	Feuilles.	»	»	»
	Fleurs.	De 2 à 4 gros.	De 8 à 16 gramm.	En infusion.
	Sirop.	De 1 à 3 onces.	De 32 à 96 gramm.	En tisane, potion.
	Conserve.	De 1 à 2 onces.	De 32 à 64 gramm.	En nature.

à 7, 1/3; de 7 à 14, 1/2; de 14 à 20, 2/3; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINISTRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
»	»	»	
»	»	»	
Quantité indéterminée.	»	En gargarisme, lavement, fomentation.	(1) La formule du vin de *Seguin* est, dit-on, la suivante :
»	»		Quinquina jaune, Ecorce sèche d'orange, Racine de gentiane, Fleurs de camomille — de chaque 5 gros 18 grains.
Quantité indéterminée.	»	En vapeurs dans les cas de syncope.	Vin d'Espagne. . . . 2 livres. Alcool à 20°. . . . . 1 once.
»	»	»	(2) La violette contient un principe analogue à l'émétine; ce principe, qui a été isolé par M. Boulay, pharmacien de Paris, existe dans les racines, les feuilles et les fleurs de cette plante. On a donné à ce principe les noms d'*émétine indigène* et de *violine*.
Idem.	»	En cataplasmes.	
»	»	»	
»	»	»	

DOSES. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6 ; de 3

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE. Poids anc.	Poids nouv.	MODE D'ADMINISTRATION.
VITRIOL. *Voy.* Sulfate.	»	»	»	»
YEUX D'ÉCREVISSE. *Occuli cancrorum.* Absorbant (1).	Poudre.	De 18 à 36 grains.	De 1 à 2 gramm.	Délayée dans l'eau sucrée.
	Tablettes.	De 36 grains à 2 gros.	De 2 à 8 gramm.	En substance.
ZÉDOAIRE. *Kempferia rotunda.* Stimulant (2).	Racine.	De 2 à 4 gros.	De 8 à 16 gramm.	En infusion.
	Extrait.	De 18 à 36 grains.	De 1 à 2 gramm.	En bols.
	Poudre.	De 36 grains à 1 gros.	De 2 à 4 gramm.	En bols, opiat.
	Teinture.	De 36 grains à 2 gros.	De 2 à 8 gramm.	En potion.
ZINC. *Voy.* Oxide de zinc.	»	»	»	»

7, 1/3; de 7 à 14, 1/2; de 14 à 20, 2/3; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINISTRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	(1) On a donné mal à propos le nom d'*yeux d'ecrevisse* à des concrétions calcaires que l'on trouve dans l'épaisseur des membranes de l'estomac du *cancer astacus*.
»	»	»	
»	»	»	(2) On trouve quelquefois mêlés aux racines de zédoaire, des fragmens d'une racine jaune que quelques personnes appellent zédoaire jaune; rien ne prouve que ces racines appartiennent au genre *kempferia*.
»	»	»	
»	»	»	

ERRATA.

Page VIII (de l'introduction), ligne 15, supprimez *le point et la virgule*, et ajoutez *un point*, après *échappées*.
Page 3, ligne 4 (du mode d'administration), *lisez* topique *au lieu de* topiques.
Page 32, dernière ligne (poids nouv.), *lisez* 4 gramm. *au lieu de* 2.
Page 52, ligne 2 (poids nouv.), *lisez* 8 grammes *au lieu de* 18.
Ibid. dernière ligne (poids anc.), *lisez* 2 gros *au lieu de* 1.
Page 64, ligne 5 (poids nouv.), *lisez* 1 *an lieu de* 2 grammes.
Page 68, ligne première (poids nouv.), *lisez* 8 *au lieu de* 6 grammes.
Page 78, ligne 3 (mode d'adm.), *lisez* potion *au lieu de* potions.
Page 82, dernière ligne (*ibid.*), *idem*, *idem*.
Page 87, ligne 4 (mode d'adm.), *supprimez* étendue d'eau.
Page 160, ligne 4 (poids nouv.), *lisez* de 8 à 16 *au lieu de* 4 à 8 grammes.
Page 168, ligne dernière (mode d'adm.), *lisez* dans les potions.
Page 174, ligne première (poids nouv.), *lisez* 32 au lieu de 16 grammes.
Page 277, ligne première (poids nouv.), *lisez* 256 grammes.
Page 322, ligne 6 (poids nouv.), *au lieu de* 16 *lisez* 32 grammes.
Page 323, lignes 3 et 4 (poids nouv.), *au lieu de* 32 à 64, *lisez* de 16 à 32.
Page 330, ligne 4 (poids nouv.), *lisez* 64 *au lieu de* 128.
Page 356, ligne 3 (poids nouv.), *lisez* de 4 à 16.
Ibid., ligne 8 (poids nouv.), *lisez* grammes *au lieu de* gros.
Page 462, ligne 4 (poids nouv.), *lisez* 64 *au lieu de* 46.
Page 490, *Vinaigre radical*, supprimez *sirop*.
Page 491, ligne dernière (mode d'adm.), rapportez le cataplasme indiqué à l'article *Feuilles*.